Plant Varieties Journal

Bulletin des variétés végétales

Plant Breeders' Rights Office

Bureau de la Protection des Obtentions Végétales

October / Octobre 2001

Number/Numéro 41

Government of Canada / Gouvernement du Canada

Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d'inspection des aliments

© Canadian Food Inspection Agency 2001

Catalogue No. A27-13/41
ISSN: 1188-1534

Cover page
Alstroemeria

© Agency canadienne d'inspection des aliments 2001

N° de catalogue A27-13/41
ISSN: 1188-1534

Page de couverture
Alstroemère

Plant Varieties Journal

THE PLANT BREEDERS' RIGHTS OFFICE

Correspondence with the PBRO should be addressed to:

The Plant Breeders' Rights Office
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
K1A 0Y9

General inquiries on Plant Breeders' Rights should be directed to the staff of the PBRO. They can be contacted by facsimile at (613) 228-6629, by e-mail, or by telephone at (613) 225-CFIA (225-2342) at the extension numbers indicated.

Visit our website at:
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pbrpov/pbrpove.shtml

Staff of the Plant Breeders' Rights Office		Extension #
Commisioner, Plant Breeders' Rights	Valerie Sisson (vsisson@inspection.gc.ca)	4384
PBR Examiners	Elizabeth Prentice-Hudson (eprentice@inspection.gc.ca)	4393
	Christine Irving (cirving@inspection.gc.ca)	4394
	Sandy Marshall (smarshall@inspection.gc.ca)	4392
	Michel Cormier (mcormier@inspection.gc.ca)	4391
Project Coordinator	Bill Hanson (bhanson@inspection.gc.ca)	4388

TABLE OF CONTENTS

1. Grants of Rights 1
- Apple 1
- Begonia 1
- Bouvardia 1
- Impatiens 2
- Juniper 4
- Pea 4
- Petunia 5
- Poinsettia 5
- Rose 5
- Strawberry 6
- Verbena 6

2. Applications Accepted for Filing 7
- Alstroemeria 7
- Apple 7
- Argyranthemum 7
- Barley 8
- Blue Grama 8
- Bluegrass 8
- Canola 8
- Cherry 8
- Corn 9
- Dahlia 9
- Impatiens 9
- Kalanchoe 10
- Pea 10
- Pelargonium 10
- Poinsettia 11
- Potato 12
- Prairie Junegrass 12
- Rose 12
- Soybean 13
- Verbena 14
- Wheat 14

3. Applications Under Examination 15
- Ash 15
- Brachycome 16
- Canola 20
- Flax 23
- Impatiens 24
- Lilac 26
- Oat 27
- Pea 27
- Pelargonium 28
- Potato 30
- Rose 36
- Soybean 64
- Vinca 67

4. Applications Abandoned 68
5. Applications Withdrawn 69
6. Rights Surrendered 71
7. Rights Revoked 73
8. Change of Denomination 74
9. Change of Applicant 77
10. Change of Holder 79
11. Errata 79
12. Cost of Protection 79

DEADLINE FOR JANUARY 2002 ISSUE IS NOVEMBER 19, 2001

DEADLINE FOR APRIL 2002 ISSUE IS FEBRUARY 8, 2002

1. GRANTS OF RIGHTS

APPLE
(*Malus pumila* Mill.)

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, St-Jean-sur-Richelieu, Quebec
Certificate number: 1013
Date granted: 2001/08/20
Application number: 00-2210
Application date: 2000/04/25
Approved denomination: **'MacExcel'**

APPLE
(*Malus species* Mill.)

➤ **Holder:** Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Ridout & Maybee, Toronto, Ontario
Certificate number: 1007
Date granted: 2001/08/10
Application number: 94-316
Application date: 1994/03/10
Approved denomination: **'Honeycrisp'**

BEGONIA
(*Begonia elatior hybridae*)

➤ **Holder:** Benary Samenzucht GmbH, Hann.Münden, Germany
Agent in Canada: Norseco Inc., Laval, Quebec
Certificate number: 1008
Date granted: 2001/08/13
Application number: 99-2015
Application date: 1999/12/20
Approved denomination: **'Beman Hellrosa'**
Tradename: **Solenia Light Pink**

➤ **Holder:** Benary Samenzucht GmbH, Hann.Münden, Germany
Agent in Canada: Norseco Inc., Laval, Quebec
Certificate number: 1009
Date granted: 2001/08/13
Application number: 99-2016
Application date: 1999/12/20
Approved denomination: **'Beman Orange'**
Tradename: **Solenia Orange**

BOUVARDIA
(*Bouvardia* species Salisb.)

➤ **Holder:** Bouvardiakwekerij de Jong vof, Roelofarendsveen, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1002
Date granted: 2001/07/27
Application number: 99-1674
Application date: 1999/05/20
Approved denomination: **'Royal Janette'**

➤ **Holder:** Bouvardiakwekerij de Jong vof, Roelofarendsveen, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1003
Date granted: 2001/07/27
Application number: 99-1676
Application date: 1999/05/20
Approved denomination: **'Royal Daphne'**

IMPATIENS
(*Impatiens hawkerii* Bull.)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0975
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1709
Application date: 1999/06/15
Approved denomination: **'Kiascia'**
Tradename: **Ascia - Light Purple**
Synonym: **Ascia**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0976
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1710
Application date: 1999/06/15
Approved denomination: **'Kilogia'**
Tradename: **Logia - Violet**
Synonym: **Logia**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0977
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1712
Application date: 1999/06/15
Approved denomination: **'Kibarbu'**
Tradename: **Barbuda - Apricot**
Synonym: **Barbuda**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0978
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1713
Application date: 1999/06/15
Approved denomination: **'Kizia'**
Tradename: **Zizola - Orange on Orange**
Synonym: **Zizola**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0979
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1714
Application date: 1999/06/15
Approved denomination: **'Kicap'**
Tradename: **Capila - Purple on Lilac**
Synonym: **Capila**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0980
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1715
Application date: 1999/06/15
Approved denomination: **'Kizeg'**
Tradename: **Zegris - Salmon Pink**
Synonym: **Zegris**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0984
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1580
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kipablo'**
Tradename: **Pablo - Salmon**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0985
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1581
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kiram'**
Tradename: **Ramon - Cherry Rose**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0986
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1582
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kiped'**
Tradename: **Pedro - Rose**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0987
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1583
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kirau'**
Tradename: **Raul - Scarlet Red**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0988
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1585
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kicarl'**
Tradename: **Carlos - Purple**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0989
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1586
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kisaul'**
Tradename: **Saul - Orange**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0990
Date granted: 2001/06/15
Application number: 99-1587
Application date: 1999/03/25
Approved denomination: **'Kijuan'**
Tradename: **Juan - Light Pink**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0992
Date granted: 2001/06/15
Application number: 00-2123
Application date: 2000/02/18
Approved denomination: **'Kimpdel'**
Tradename: **Imp. Delias - Light Rose**

IMPATIENS
***(Impatiens* hybrida)**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0991
Date granted: 2001/06/15
Application number: 00-2122
Application date: 2000/02/18
Approved denomination: **'Kibetio'**
Tradename: **Betio - Candy Kiss**

IMPATIENS
***(Impatiens walleriana* Hook.f.)**

➤ **Holder:** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0993
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1609
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiLav'**

➤ **Holder:** Tinga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0996
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1610
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiTag'**

➤ **Holder:** Tinga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0997
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1611
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiPoc'**

➤ **Holder:** Tinga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0998
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1613
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiChev'**

➤ **Holder:** Tinga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0999
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1615
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiHop'**

➤ **Holder:** Tinga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1000
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1616
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiLip'**

➤ **Holder:** Tinga Genetics, Broadbent, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1001
Date granted: 2001/07/16
Application number: 99-1617
Application date: 1999/03/30
Approved denomination: **'TiRo'**

JUNIPER
***(Juniperus horizontalis* Moench)**

➤ **Holder:** Casey Van Vliet, Pitt Meadows, British Columbia
Agent in Canada: MacKenzie Fujisawa Brewer Stevenson, Vancouver, British Columbia
Certificate number: 1014
Date granted: 2001/08/27
Application number: 99-2018
Application date: 1999/12/21
Approved denomination: **'Blue Prince'**

PEA
***(Pisum sativum* L. sensu lato)**

➤ **Holder:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Performance Seeds Canada Ltd., Regina, Saskatchewan
Certificate number: 1016
Date granted: 2001/08/30
Application number: 99-1634
Application date: 1999/09/14
Approved denomination: **'Eclipse'**

PETUNIA
(Petunia x hybrida Vilm.)

➤ **Holder:** John Allbrick, Studley, Warwickshire, United Kingdom
Agent in Canada: Norseco Inc., Laval, Quebec
Certificate number: 1010
Date granted: 2001/08/13
Application number: 99-1967
Application date: 1999/12/16
Approved denomination: **'Limelight'**

➤ **Holder:** Priscilla Grace Kerley, Cambridge, United Kingdom
Agent in Canada: Norseco Inc., Laval, Quebec
Certificate number: 1011
Date granted: 2001/08/13
Application number: 99-1936
Application date: 1999/12/03
Approved denomination: **'Kavese'**
Tradename: **Coral Plume**

➤ **Holder:** Priscilla Grace Kerley, Cambridge, United Kingdom
Agent in Canada: Norseco Inc., Laval, Quebec
Certificate number: 1012
Date granted: 2001/08/13
Application number: 99-1907
Application date: 1999/12/03
Approved denomination: **'Kerjul'**
Tradename: **Julia**

➤ **Holder:** Ball FloPlant, West Chicago, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albertta Alberta
Certificate number: 1015
Date granted: 2001/08/30
Application number: 99-2039
Application date: 1999/12/21
Approved denomination: **'Balrefvein'**
Tradename: **Balfle™ Plum Veined**

POINSETTIA
(Euphorbia pulcherrima Willd. ex. Klotzsch)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0981
Date granted: 2001/06/06
Application number: 99-1725
Application date: 1999/08/17
Approved denomination: **'Eckesley'**
Tradename: **Holly Point**

ROSE
(Rosa species L.)

➤ **Holder:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0993
Date granted: 2001/07/06
Application number: 99-1678
Application date: 1999/05/25
Approved denomination: **'Radrum'**
Tradename: **Knock Out**

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS., Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Morvan, Montreal, Quebec
Certificate number: 1004
Date granted: 2001/08/02
Application number: 97-1113
Application date: 1997/07/23
Approved denomination: **'POULzuzu'**
Tradename: **Scarlet Parade®**

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1005
Date granted: 2001/08/02
Application number: 97-1122
Application date: 1997/07/23
Approved denomination: **'POULweno'**
Tradename: **Bronze Parade®**

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1006
Date granted: 2001/08/02
Application number: 97-1130
Application date: 1997/08/08
Approved denomination: **'POULdacen'**
Tradename: **Sundance Palace®**

STRAWBERRY
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Holder:** S.C. Darbonne, Milly La Foret, France
Agent in Canada: Fetherstonhaugh & Co., Vancouver, British Columbia
Certificate number: 0994
Date granted: 2001/07/13
Application number: 97-1063
Application date: 1997/05/07
Approved denomination: **'Darselect'**

VERBENA
(*Verbena x hybrida* Voss)

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Certificate number: 0982
Date granted: 2001/06/12
Application number: 99-1643
Application date: 1999/04/22
Approved denomination: **'Tort Peachy'**
Tradename: **Tortuga Peachy**

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Certificate number: 0983
Date granted: 2001/06/12
Application number: 99-1645
Application date: 1999/04/22
Approved denomination: **'Tort White'**
Tradename: **Tortuga White**

2. APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING

ALSTROEMERIA
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Applicant:** Van Staaveren B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 01-2802
Application date: 2001/08/09
Proposed denomination: **'Stariana'**

➤ **Applicant:** Koninklijke van Zanten B.V., Rijsenhout, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 01-2803
Application date: 2001/08/09
Proposed denomination: **'Ossorio'**

➤ **Applicant:** Koninklijke van Zanten B.V., Rijsenhout, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 01-2804
Application date: 2001/08/09
Proposed denomination: **'Zanair'**

➤ **Applicant:** Koninklijke van Zanten B.V., Rijsenhout, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 01-2805
Application date: 2001/08/09
Proposed denomination: **'Zanena'**

APPLE
(*Malus domestica* Borkh.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia
Agent in Canada: okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland, British Columbia
Application number: 01-2764
Application date: 2001/06/19
Proposed denomination: **'S-69-23'**

➤ **Applicant:** William A Cox., Cleveland, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Bereskin & Parr, Toronto, Ontario
Application number: 01-2800
Application date: 2000/08/03 (priority claimed)
Proposed denomination: **'Stella Minnesota'**
Protective direction granted: 2001/08/02

ARGYRANTHEMUM
(*Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2750
Application date: 2001/06/04
Proposed denomination: **'Supalight'**

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2751
Application date: 2001/06/04
Proposed denomination: **'Supaglow'**

APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2752
Application date: 2001/06/04
Proposed denomination: **'Supamarg'**

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2753
Application date: 2001/06/04
Proposed denomination: **'Cobeer'**
Tradename: **Sugar Cheer**

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Agriculture and Agri-Food Canada, Brandon, Manitoba
Application number: 01-2813
Application date: 2001/08/28
Proposed denomination: **'TR256'**

BLUE GRAMA
(*Bouteloua gracilis* (H.B.K.) Lag. ex. Steud.)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Ducks Unlimited Canada, Brandon, Manitoba
Application number: 01-2807
Application date: 2001/08/07
Proposed denomination: **'BG-MB'**
Protective direction granted: 2001/08/07

BLUEGRASS
(*Poa arachnifera x Poa pratensis*)

➤ **Applicant:** Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, U.S.A.
Agent in Canada: Borden Ladner Gervais LLP, Ottawa, Ontario
Application number: 01-2786
Application date: 2001/07/13
Proposed denomination: **'Reveille'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** The Governors of the University of Alberta, Edmonton, Alberta
Application number: 01-2762
Application date: 2001/06/12
Proposed denomination: **'A00-57 NDA'**

➤ **Applicant:** The Governors of the University of Alberta, Edmonton, Alberta
Application number: 01-2763
Application date: 2001/06/12
Proposed denomination: **'A00-66 NDA'**

CHERRY
(*Prunus avium* L.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia
Agent in Canada: okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland, British Columbia
Application number: 01-2765
Application date: 2001/06/19
Proposed denomination: **'Sumste'**
Tradename: **Samba**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia
Agent in Canada: okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland, British Columbia
Application number: 01-2766
Application date: 2001/06/19
Proposed denomination: **'Sumele'**
Tradename: **Satin**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia
Agent in Canada: okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland, British Columbia
Application number: 01-2767
Application date: 2001/06/19
Proposed denomination: **'13N-7-70'**

CORN
(*Zea mays* L.)

➤ **Applicant:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois U.S.A.
Agent in Canada: DELALB Canada Inc., Chatham, Ontario
Application number: 01-2808
Application date: 2001/08/21
Proposed denomination: **'I014738'**

➤ **Applicant:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois U.S.A.
Agent in Canada: DELALB Canada Inc., Chatham, Ontario
Application number: 01-2809
Application date: 2001/08/21
Proposed denomination: **'I181664'**

➤ **Applicant:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois U.S.A.
Agent in Canada: DELALB Canada Inc., Chatham, Ontario
Application number: 01-2810
Application date: 2001/08/21
Proposed denomination: **'I325350'**

DAHLIA
(*Dahlia* species Cav.)

➤ **Applicant:** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 01-2793
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'Margaret Improved'**

IMPATIENS
(*Impatiens hawkerii* Bull.)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2784
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Lasting Impression Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2785
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Ovation Blush Rose'**

IMPATIENS
(*Impatiens wallerana* Hook.f.)

➤ **Applicant:** Floranova Limited, Dereham, Norfolk, United Kingdom
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2798
Application date: 2001/07/23
Proposed denomination: **'Cameo Pink Surprise'**

APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING

➤ **Applicant:** Floranova Limited, Dereham, Norfolk, United Kingdom
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2799
Application date: 2001/07/23
Proposed denomination: **'Cameo Red Surprise'**

KALANCHOE
(*Kalanchoe blossfeldiana* Poelln.)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2783
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Axsunyell'**
Tradename: **'Maxi Sunray Yellow'**

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum, The Netherlands
Agent in Canada: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan
Application number: 01-2770
Application date: 2001/07/06
Proposed denomination: **'Madoc'**
Protective direction granted: 2001/07/06

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Applicant:** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 01-2792
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'Balcolbure'**
Tradename: **Colorcade™ Burgundy Ice**

PELARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L. H. Bailey)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2773
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Bravo'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2774
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Elegance Purple Bicolor'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2775
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Elegance Raspberry Swirl'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2776
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Elegance Rose Bicolor'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2777
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Jewel'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2778
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Royalty White'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium x hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2779
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Candy Light Salmon'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2780
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Patriot Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2781
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Stardom Pink and White'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2782
Application date: 2001/07/12
Proposed denomination: **'Stardom Red'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., Ottawa, Ontario
Application number: 01-2811
Application date: 2001/08/23
Proposed denomination: **'KLEP01007'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., Ottawa, Ontario
Application number: 01-2812
Application date: 2001/08/23
Proposed denomination: **'KLEP01012'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex. Klotzsch)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2768
Application date: 2001/06/25
Proposed denomination: **'Eckalveen'**
Synonym: **1-99**

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2769
Application date: 2001/06/25
Proposed denomination: **'Eckalysa'**
Synonym: **T-19B**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:** SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hamburg, Germany
Agent in Canada: Solanum International Inc., Edmonton, Alberta
Application number: 01-2787
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'HO 2000'**
Protective direction granted: 2001/07/19

PRAIRIE JUNEGRASS
(*Koeleria macrantha* (Ledeb.) J.A. Schultes)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Ducks Unlimited Canada, Brandon, Manitoba
Application number: 01-2806
Application date: 2001/08/07
Proposed denomination: **'PG-MB'**
Protective direction granted: 2001/08/07

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2754
Application date: 2001/06/05
Proposed denomination: **'POULbrido'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2788
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'POULra014'**
Tradename: **Julie Parade®**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2789
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'POULra015'**
Tradename: **Denise Parade®**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2790
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'POULra016'**
Tradename: **Sterling Parade®**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2794
Application date: 2001/07/25
Proposed denomination: **'POULhi005'**
Tradename: **Valentina Hit®**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2795
Application date: 2001/07/25
Proposed denomination: **'POULhi009'**
Tradename: **Cinderella Hit®**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2796
Application date: 2001/07/25
Proposed denomination: **'POULhi008'**
Tradename: **Tiffany Hit®**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 01-2797
Application date: 2001/07/25
Proposed denomination: **'POULgo006'**
Tradename: **Pink Pagode**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Adams Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 01-2801
Application date: 2001/08/03
Proposed denomination: **'KORpusiro'**
Tradename: **Purple Roxy**

SOYBEAN (*Glycine max* L. Merrill)

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2755
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'CL970321'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2756
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'CL970331'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2757
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'CL970333'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2758
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'CL970335'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2759
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'J557707'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2760
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'L400403'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 01-2761
Application date: 2001/06/08
Proposed denomination: **'L400498'**
Protective direction granted: 2001/06/08

➤ **Applicant:** Hyland Seeds, Blenheim Ontario
Application number: 01-2814
Application date: 2001/08/29
Proposed denomination: **'Cascade'**

VERBENA
(*Verbena x hybrida* Voss)

➤ **Applicant:** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 01-2791
Application date: 2001/07/19
Proposed denomination: **'Balazwhit'**
Tradename: **Aztec™ White**

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** United Grain Growers Limited, Winnipeg, Manitoba
Application number: 01-2771
Application date: 2001/07/10
Proposed denomination: **'5601HR'**

➤ **Applicant:** United Grain Growers Limited, Winnipeg, Manitoba
Application number: 01-2772
Application date: 2001/07/10
Proposed denomination: **'5701PR'**

3. APPLICATIONS UNDER EXAMINATION

Any objections to the following applications must be submitted in writing to the Commissioner of Plant Breeders' Rights within six months from the date of publication of this issue, along with the appropriate fee.

Unless otherwise indicated, all colour measurements were determined by using the Royal Horticultural Society (RHS) colour chart.

The following provides detailed descriptions of the characteristics of the candidate varieties. The summaries compare the distinguishing characteristics of the candidate varieties to the reference varieties.

All photographs are supplied by the applicants. Where photographs do not adequately show distinctness, they may not be published.

ASH
(*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.)

Proposed denomination: **'Heuver'** (see figure 1)
Trade name: **Foothills**
Application number: 99-1776
Application date: 1999/08/27
Applicant: Henry Heuver, Calgary, Alberta
Agent in Canada: John Byland, Kelowna, B.C.

Variety used for comparison: 'Patmore'

Summary: *'Heuver' is a seedless, green ash variety which produces symmetrical trees with a dense, rounded canopy, whereas the reference variety 'Patmore' has more irregularly shaped trees and a smaller angle between the branches and the trunk. The branches of 'Heuver' are significantly thicker and stronger than 'Patmore'. 'Patmore' grows longer into the fall, which makes the variety more susceptible to winter injury, while 'Heuver' is a more winter hardy variety. The bark of 'Heuver' is grey and smooth with few fissures, compared with 'Patmore' which has rougher bark that is grey with a bronze tinge. The leaflets of 'Patmore' are darker green, more glossy and more deeply serrated than those of 'Heuver'. The petiole of 'Patmore' is pubescent in the furrow, especially at the point of attachment of the basal leaflets, while 'Heuver' is a non-pubescent variety.*

Description: 'Heuver' is a green ash variety which has an oval to rounded growth habit with a dense canopy and a very symmetrical branching structure. The branches are strong and form wide angles with the main trunk. The rate of growth is moderate. One year old shoots are light brown in colour and moderately thick, with no pubescence. In cross section the shoots are round. The vascular bundles at the leaf scar form an open 'C' shape. The bark of 'Heuver' is grey and smooth and the vegetative buds are medium to large sized, broadly ovate in shape and medium brown in colour. The buds are set above the leaf scar and are pubescent and valvate (no overlapping of scales).

The leaves of 'Heuver' are pinnately compound and the terminal leaflet is broadly elliptic in shape, with a broad cuneate base and acuminate apex. The leaflet margins are serrate. There is no pubescence on upper or lower leaflet blade surfaces but there is some sparse pubescence along the mid-rib on the lower surface. The upper side of the leaflet blade is moderately glossy and light to medium green in colour and the lower side is green with moderate to strong glaucosity. The petiole of 'Heuver' is shallowly furrowed with no wings and no pubescence.

'Heuver' is a dioecious variety which produces panicle type inflorescences on old wood just below new shoots. The calyx is present but there is no corolla. The flowers are small to medium in size and have no scent. 'Heuver' flowers early in the season. 'Heuver' ash produces no seeds.

Origin and Breeding: 'Heuver' green ash was a selection from a group of seedlings which originated from a hardy seed source in Montana in the late 1970's. The green ash seed had been collected from a high elevation source in Montana that was subject to severe weather extremes. The seedlings were grown into large trees over several years at Foothills Nursery in Calgary, Alberta. In August 1987 several selections were made from these trees, based on growth habit, freedom from seed, winter hardiness, leaf glossiness and overall tree shape. Subsequent selections occurred with the final selection becoming the variety 'Heuver'.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Heuver' were conducted at the Glenmore Farm of Foothills Nursery, Calgary, Alberta during 1999 and 2000. Fifteen trees of each variety were included in the trials. The spacing between the trees in each row was 10 feet and the rows were 10 feet apart. Measured characteristics were based on 40 measurements per variety.

Table 1: Comparison table for 'Heuver'

	'HEUVER'	'PATMORE'*
Length of terminal leaflet (cm)		
mean	17.4	13.5
std. deviation	2.5	1.9
Width of terminal leaflet (cm)		
mean	19.2	15.3
std. deviation	2.7	2.1
Length of petiole (cm)		
mean	5.9	4.2
std. deviation	0.8	0.8

* reference variety

BRACHYCOME
(*Brachycome* species)

Proposed denomination: **'Jumbo Misty Pink'** (see figure 2)
Application number: 99-2004
Application date: 1999/12/20
Applicant: Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'City Lights' (see table 2 on page 17)

Summary: *'Jumbo Misty Pink' has slightly larger leaves with lobed margins while 'City Lights' has pinnatifid leaf margins. 'Jumbo Misty Pink' has pink ray florets which fade to white while 'City Lights' has light blue-violet ray florets.*

Description: 'Jumbo Misty Pink' has a spreading/trailing growth habit with dense branching and moderate length internodes. The leaves are spatulate in shape with lobed margins. The colour of the upper side is medium green.

'Jumbo Misty Pink' has small involucral bracts which have no pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a medium to high number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is rounded in shape. The ray florets are pink in colour, fading to white as they age. 'Jumbo Misty Pink' begins flowering early and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Jumbo Misty Pink' originated from a chance seedling discovered in the garden of Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., Wandin North, Victoria, Australia in 1994. The seedling was presumed to be the result of an open-pollination of *B. segmentosa* and a pink flowered *Brachycome* species or hybrid. A number of spontaneous seedlings of similar foliage appearance were assessed for superior and/or distinctive characteristics. 'Jumbo Misty Pink' was found to be distinct from the other seedlings.

Tests and Trials: 'Jumbo Misty Pink' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Proposed denomination: **'Jumbo Misty Lilac'** (see figure 3)
Application number: 99-2005
Application date: 1999/12/20
Applicant: Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'City Lights'

Summary: *'Jumbo Misty Lilac' has a taller plant height than 'City Lights'. 'Jumbo Misty Lilac' has lobed leaf margins while 'City Lights' has pinnatifid leaf margins. 'Jumbo Misty Lilac' has violet ray florets while 'City Lights' has light blue-violet ray florets. 'Jumbo Misty Lilac' has a larger disc diameter than 'City Lights'.*

Description: 'Jumbo Misty Lilac' has a spreading/trailing growth habit with dense branching and moderate length internodes. The leaves are spatulate in shape with lobed margins. The colour of the upper side is medium green.

'Jumbo Misty Lilac' has small involucral bracts which have no pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a medium to high number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is rounded in shape. The ray florets are violet in colour. 'Jumbo Misty Lilac' begins flowering early and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Jumbo Misty Lilac' originated from a chance seedling discovered in the garden of Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., Wandin North, Victoria, Australia in

1994. The seedling was presumed to be the result of an open-pollination of *B. segmentosa* and a mauve flowered *B. multifida*. A number of spontaneous seedlings of similar foliage appearance were assessed for superior and/or distinctive characteristics. 'Jumbo Misty Lilac' was found to be distinct from the other seedlings.

Tests and Trials: 'Jumbo Misty Lilac' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 2: Comparison table for 'Jumbo Misty Pink' and 'Jumbo Misty Lilac'

	'JUMBO MISTY PINK'	'JUMBO MISTY LILAC'	'CITY LIGHTS'*
Plant height (cm)			
mean	15.14	14.60	11.17
std. deviation	0.90	1.14	0.75
Leaf blade length (cm)			
mean	3.83	3.40	2.58
std. deviation	0.24	0.64	0.17
Leaf blade width (cm)			
mean	2.10	1.48	1.70
std. deviation	0.46	0.33	0.20
Colour of upper side of ray floret (RHS)	55D/white	80B/76A	85A/B
Colour of lower side of ray floret (RHS)	56D	76D	85C/D
Diameter of disc (mm)			
mean	9.22	10.13	6.33
std. deviation	0.44	0.64	0.82

* reference variety

Proposed denomination: **'Billabong Moonlight'** (see figure 4)

Previously proposed denomination: **'Moonlight'**

Application number: 99-2006

Application date: 1999/12/20

Applicant: Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria, Australia

Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'Fernleaf White'

Summary: *'Billabong Moonlight' has a slightly larger more dense branching growth habit than 'Fernleaf White'. 'Billabong Moonlight' has darker leaf colour than 'Fernleaf White'. 'Billabong Moonlight' has longer ray florets and shorter peduncles than 'Fernleaf White'.*

Description: 'Billabong Moonlight' has a spreading/trailing growth habit with dense to very dense branching and short to medium length internodes. The leaves are obovate to spatulate in shape with very dissected margins. The colour of the upper side is medium to dark green.

'Billabong Moonlight' has small involucral bracts which have slight pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a low to medium number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is rounded in shape with a slight notch. The ray florets are white in colour (RHS 155D). 'Billabong Moonlight' begins flowering early to mid-season and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Billabong Moonlight' originated from a chance seedling discovered in the garden of Karanga Native Plant Nursery Pty. Ltd., Wandin North, Victoria, Australia in 1993. The seedling was presumed to be the result of an open-pollination of a white flowered *B. multifida*. A number of spontaneous seedlings were assessed for superior and/or distinctive characteristics. 'Billabong Moonlight' was found to be distinct from the other seedlings.

Tests and Trials: 'Billabong Moonlight' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 3: Comparison table for 'Billabong Moonlight'

	'BILLABONG MOONLIGHT'	'FERNLEAF WHITE'*
Plant height (cm)		
mean	10.80	9.33
std. deviation	1.30	0.58
Plant width (cm)		
mean	28.60	23.60
std. deviation	2.07	1.67
Peduncle length (cm)		
mean	3.37	5.33
std. deviation	1.31	0.76

Ray floret length (mm)		
mean	6.56	4.43
std. deviation	0.53	0.79

* reference variety

Proposed denomination: **'Mauve Delight'** (see figure 5)
Application number: 99-2007
Application date: 1999/12/20
Applicant: Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'Amethyst'

Summary: *The leaf margins of 'Mauve Delight' are lobed with irregular dentate teeth while the leaves of 'Amethyst' have pinnatifid margins. 'Mauve Delight' has shorter peduncles and smaller flowers than 'Amethyst'. 'Mauve Delight' differs slightly in flower colour from 'Amethyst'.*

Description: 'Mauve Delight' has a spreading trailing growth habit with dense branching and medium to long internodes. The leaves are spatulate in shape with irregularly spaced dentate teeth and lobing. The colour of the upper side is medium green.

'Mauve Delight' has small involucral bracts which have no pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a low to medium number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is rounded in shape with a slight notch. The ray florets are violet in colour 'Mauve Delight' begins flowering early to mid-season and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Mauve Delight' originated from a chance seedling discovered in the garden of Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., Wandin North, Victoria, Australia in 1993. The seedling was presumed to be the result of an open-pollination of a *B. angustifolia* and *B. multifida*. A number of spontaneous seedlings were assessed for superior and/or distinctive characteristics. 'Mauve Delight' was found to be distinct from the other seedlings.

Tests and Trials: 'Mauve Delight' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 4: Comparison table for 'Mauve Delight'

	'MAUVE DELIGHT'	'AMETHYST'*
Peduncle length (cm)		
mean	2.96	3.46
std. deviation	0.47	0.31
Flower diameter (cm)		
mean	1.80	2.15
std. deviation	0.10	0.39
Colour of upper side of ray floret (RHS)	87B/88C	90B/C
Colour of lower side of ray floret (RHS)	84C	85A

* reference variety

Proposed denomination: **'Strawberry Mousse'** (see figure 6)
Application number: 99-2008
Application date: 1999/12/20
Applicant: Richard Colin Anderson, Merricks, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'Pink'

Summary: *'Strawberry Mousse' has a narrower plant width than 'Pink'. The leaves of 'Strawberry Mousse' have lobed margins while 'Pink' has pinnatifid margins. 'Strawberry Mousse' has a purplish hue to the lower side of the leaf while 'Pink' has green on the lower side of the leaf. 'Strawberry Mousse' has longer peduncles and larger flowers than 'Pink'. 'Strawberry Mousse' differs slightly from 'Pink' in flower colour.*

Description: 'Strawberry Mousse' has a spreading trailing growth habit with dense branching and medium to long internodes. The leaves are spatulate in shape with lobed margins. The colour of the upper side is medium to dark green and the lower side has a purple hue.

'Strawberry Mousse' has small involucral bracts which have no pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a low to medium number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is rounded in shape. The ray florets are bluish-pink in colour. 'Strawberry Mousse' begins flowering early and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Strawberry Mousse' originated from a chance seedling discovered in the garden of Mesnicks Nursery, Mernicks, Victoria, Australia in 1991. The seedling was presumed to be the result of an open-pollination of *B. angustifolia* and *B. formosa*. A number of spontaneous seedlings were assessed for superior and/or distinctive characteristics. 'Strawberry Mousse' was found to be distinct from the other seedlings.

Tests and Trials: 'Strawberry Mousse' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 5: Comparison table for 'Strawberry Mousse'

	'STRAWBERRY MOUSSE'	'PINK'*
Plant width (cm)		
mean	21.60	28.20
std. deviation	2.07	1.48
Peduncle length (cm)		
mean	3.58	1.92
std. deviation	0.43	0.37
Flower diameter (cm)		
mean	2.39	1.91
std. deviation	0.29	0.27
Colour of upper side of ray floret (RHS)	73B	66D
Colour of lower side of ray floret (RHS)	65C	66B

* reference variety

Proposed denomination: **'Lemon Twist'** (see figure 7)
Application number: 99-2009
Application date: 1999/12/20
Applicant: Plant Growers Australia Pty. Ltd., Wonga Park, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'Sunburst'

Summary: *'Lemon Twist' produces a smaller plant than 'Sunburst'. 'Lemon Twist' has smaller leaves which are not as lobed as the leaves of 'Sunburst'. 'Lemon Twist' has shorter peduncles and darker yellow flowers than 'Sunburst'.*

Description: 'Lemon Twist' has a spreading trailing growth habit with dense branching and medium length internodes. The leaves are oblanceolate in shape with irregularly spaced dentate teeth and lobing on the margins. The colour of the upper side is light green.

'Lemon Twist' has small involucral bracts which have slight pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a medium to high number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is rounded in shape with a notch. The ray florets are yellow in colour. 'Lemon Twist' begins flowering early and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Lemon Twist' originated from a Brachycome breeding program at Plant Growers Australia, Victoria, Australia in 1993. Parents of 'Lemon Twist' were *B. multifida* var. *dilatata* (female) and *B.* species affinity *curvicarpa* (male). The resultant seed was germinated and the seedlings were assessed for superior and/or distinctive characteristics.

Tests and Trials: 'Lemon Twist' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 6: Comparison table for 'Lemon Twist'

	'LEMON TWIST'	'SUNBURST'*
Plant height (cm)		
mean	11.63	19.67
std. deviation	0.48	1.93
Plant width (cm)		
mean	28.38	32.25
std. deviation	0.96	2.50
Leaf blade length (cm)		
mean	1.78	2.78
std. deviation	0.41	0.26
Leaf blade width (cm)		
mean	0.23	0.72
std. deviation	0.05	0.15

Peduncle length (cm)		
mean	5.80	7.82
std. deviation	0.47	0.51
Length of ray florets (mm)		
mean	4.50	7.00
std. deviation	0.84	0.63
Colour of upper side of ray floret (RHS)	3B	4D
Colour of lower side of ray floret (RHS)	4B	4D
Colour of disc (RHS)	7A	3A

* reference variety

Proposed denomination: **'Happy Face Pink'** (see figure 8)
Application number: 99-2010
Application date: 1999/12/20
Applicant: Plant Growers Australia Pty. Ltd., Wonga Park, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Variety used for comparison: 'City Lights'

Summary: *'Happy Face Pink' has longer leaves than 'City Lights'. The leaves of 'Happy Face Pink' have lobed margins while the leaves of 'City Lights' have pinnatifid margins. 'Happy Face Pink' has shorter peduncles and larger flowers than 'City Lights'. 'Happy Face Pink' differs slightly from 'City Lights' in flower colour and has a larger disc.*

Description: 'Happy Face Pink' has a spreading/trailing growth habit with dense branching and medium to long internodes. The leaves are spatulate in shape with lobed margins. The colour of the upper side is medium green.

'Happy Face Pink' has small involucral bracts which have no pubescence. The flowers are a solitary head type inflorescence. The flowers are single with a medium to high number of ray florets. The longitudinal axis of the ray floret is straight and the tip is pointed in shape. The ray florets are violet in colour. 'Happy Face Pink' begins flowering early and flowers continuously over a long period of time.

Origin and Breeding: 'Happy Face Pink' originated from a Brachycome breeding program at Plant Growers Australia, Victoria, Australia in 1993. Parents of 'Happy Face Pink' were *B. formosa* 'Pilliga Posy' (female) and an unnamed *B. segmentosa* hybrid (male). The resultant seed was germinated and the seedlings were assessed for superior and/or distinctive characteristics.

Tests and Trials: 'Happy Face Pink' was tested at Oxford Station, Ontario in the summer of 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown under field conditions. Plants were spaced 0.40 metres within the row and rows were spaced one metre apart. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 7: Comparison table for 'Happy Face Pink'

	'HAPPY FACE PINK'	'CITY LIGHTS'*
Leaf blade length (cm)		
mean	3.73	2.58
std. deviation	0.25	0.17
Peduncle length (cm)		
mean	4.03	6.33
std. deviation	0.67	0.76
Flower diameter (cm)		
mean	3.13	2.48
std. deviation	0.15	0.13
Colour of upper side of ray floret (RHS)	80B/78D	85A/B
Colour of lower side of ray floret (RHS)	80C	85C/D
Colour of disc (RHS)	7A	2A
Diameter of disc (mm)		
mean	9.86	6.33
std. deviation	0.69	0.82

* reference variety

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

Proposed denomination: **'Skyhawk'**
Application number: 00-2197
Application date: 2000/04/06
Applicant: DLF-Trifolium A/S, Heddinge, Denmark

Agent in Canada: Seed-Link Inc., Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Cyclone', 'Garrison' and 'Quantum'(see table 8 on page 22)

Summary: *The silique of 'Skyhawk' is shorter than those of 'Garrison' and 'Quantum'. The pedicel of 'Skyhawk' is shorter than and longer than those of 'Cyclone' and 'Quantum' respectively. The plants of 'Skyhawk' are shorter than those of 'Garrison'.*

Description: 'Skyhawk' is a spring canola variety. The cotyledons are medium in length. Leaf blades are medium to dark green with very few to few rounded lobes which are shallow to medium in depth. Flower petals are yellow. The siliques are short with short to medium length beak and a long pedicel. Plants are medium in height. The seeds are black.

Origin and Breeding History: 'Skyhawk' was developed at Dansk Planteforaedling, Division of DLF-Trifolium A/S in Store-Heddinge, Denmark. The cross 'Korall' X 'Star' was made in 1991. The F_1 and F_2 were bulked. Selections were made in the F_3 generation for high oil and protein content, low glucosinolate content, blackleg resistance, lodging and early maturity. Further selections were made in the F_4 and F_5 generations for yield and fatty acid distribution. Breeder seed was bulked in the F_6 generation from 10 F_5 plants.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Skyhawk' were conducted at the Elora Research Station, Elora, Ontario during the summers of 1999 and 2000. Trials were arranged in 2 replicates with 7 row plots. Observations were made on 60 plants or parts of plants. 'Skyhawk' was tested as 'DP44-98'.

Proposed denomination: **'456-58'**
Application number: 00-2267
Application date: 2000/05/17
Applicant: Dept. of Plant Agriculture, University of Guelph, Guelph,
Agent in Canada: Parsons Seed Ltd., Beeton, Ontario

Varieties used for comparison: 'Summit', 'Lisora' and 'Iris' (see table 9 on page 23)

Summary: *The cotyledons of '456-58' are shorter than the reference varieties 'Summit', 'Lisora' and 'Iris'. The beak of '456-58' is longer than that of 'Summit' and 'Lisora' and shorter than 'Iris'. The pedicel is longer than those of the reference varieties.*

Description: '456-58' is a spring canola variety. The cotyledons are short to medium in length. Leaf blades are medium to dark green with medium to many rounded lobes which are medium in depth. Flower petals are yellow. The siliques are short to medium in length with a medium to long beak and medium to long pedicel. Plants are medium in height. Seed colour is mixed. '456-58' has fair to medium lodging resistance. Erucic acid content is 0.0%. Glucosinolate content is very low.

Origin and Breeding History: '456-58' was developed by the Department of Plant Agriculture at the University of Guelph, Guelph, Ontario. The cross 'Spok' X 'Ebony' was made in 1994. Double haploids were extracted from the F_1 in 1995. Selections were made based on height, yield, standability and oil quality. Seed was multiplied by bagging plants indoors to generate selfed double haploid seed in the first year and bagging outdoors in nursery plots the following year. Further increases have been carried out in isolated plots.

Tests and Trials: Tests and trials for '456-58' were conducted at the Elora Research Station, Elora, Ontario during the summers of 1999 and 2000. Trials were arranged in 2 replicates with 7 row plots. Observations were made on 60 plants or parts of plants.

Table 8 : Comparison table for 'Skyhawk'

	'SKYHAWK'	'CYCLONE'*	'GARRISON'*	'QUANTUM'*
Days to flower	51	52	54	51
Silique length (mm)				
mean	58.60	59.35	64.73	69.60
significance		ns	p<.001	p<.001
Beak length (mm)				
mean	10.47	10.52	11.19	8.80
significance		ns	ns	p<.001
Pedicel length (mm)				
mean	28.90	34.03	29.40	24.07
significance		p<.001	ns	p<.001
Days to maturity	100	99	100	97
Plant height (cm)				
mean	123.28	117.37	135.93	118.30
significance		ns	p<.001	ns

* reference variety
P - probability value
ns - not significant
Means are based on a two year average of 60 plant parts for silique traits, 30 plants for height measurements and 50 cotyledon measurements. Trials were performed at the Elora Research Station, Elora, Ontario. Differences are significant at the 1% probability level based on LSD values.

Table 9 : Comparison table for '456-58'

	'456-58'	'SUMMIt'*	'LISORA'*	'IRIS'*
Cotyledon length (mm)				
mean	21.9	27.2	25.9	24.5
significance		p<.001	p<.001	p<.001
Days to flower	54	53	52	56
Beak length (mm)				
mean	12.54	11.46	11.33	13.72
significance		p<.001	p<.001	p<.001
Pedicel length (mm)				
mean	27.69	25.68	25.80	22.57
significance		p<.001	p<.001	p<.001
Days to maturity	99	98	99	103
Plant height (cm)				
mean	128.52	120.78	132.60	137.98
significance		ns	ns	p<.001

* reference variety
P - probability value
ns - not significant
Means are based on a two year average of 60 plant parts for silique traits, 30 plants for height measurements and 50 cotyledon measurements. Trials were performed at the Elora Research Station, Elora, Ontario. Differences are significant at the 1% probability level based on LSD values.

FLAX
(*Linum usitatissimum* L.)

Proposed denomination: **'AC Nugget'** (see figure 9)
Previously proposed denomination: **'FP2002'**
Application number: 98-1375
Application date: 1998/05/04
Applicant: Agriculture and Agri-Food Canada, Morden, Manitoba
Agent in Canada: Golden Seed Farms, Fort Qu'Appelle, Saskatchewan
Breeder: Dr. E.O. Kenaschuk, Morden, Manitoba

Varieties used for comparison: 'Flanders', 'Omega' and '989'

Summary: *'AC Nugget' is a yellow seeded flax variety which differs from 'Omega' in the colours at the top of the filament and style (blue for 'AC Nugget' and white for 'Omega') and in the stigma colour (pale violet for 'AC Nugget' and white in 'Omega'). Ciliation of the false septa is absent in 'AC Nugget' but present in '989' and 'Omega'. The seed colour of 'AC Nugget' is yellow, whereas it is brown in 'Flanders'. 'AC Nugget' has low linoleic and high linolenic acid contents, while '989' has high linoleic and low linolenic acid contents.*

Description: 'AC Nugget' is an oilseed flax variety. The hypocotyl of the seedlings has weak anthocyanin colouration. The flowers are medium sized and flattened disk shape, with no longitudinal folding of the petals. There is no sepal dotting. The flowers of 'AC Nugget' are medium blue and the filament is blue at the top and white at the base. The anther is blue, with clear pollen. The style is blue at the base and violet at the top, with a violet stigma.

'AC Nugget' matures mid-season and produces a medium sized capsule which is semi-dehiscent. Ciliation of the false septa is absent. The seeds are yellow and small to medium in size.

'AC Nugget' is moderately resistant to flax wilt (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lini*). The variety is resistant to North American flax rust races.

'AC Nugget' has good resistance to shattering and capsule loss and fair to good resistance to lodging. It has a moderate capability to produce basal branching.

Origin and Breeding: 'AC Nugget' was developed at the Morden Research Station, Morden, Manitoba, from the backcross AFP 9007/Flanders. AFP 9007 is an accession from Germany which has yellow seed colour controlled by a single dominant gene. A BC^5F_4 line was selected in 1995 which exhibited a stable yellow seed colour, and agronomic and quality characteristics similar to that of the recurrent parent, 'Flanders'. The line, designated as M4853, was evaluated in 1996 in preliminary yield tests conducted in Manitoba.

Tests and Trials: Tests and trials for 'AC Nugget' were conducted at the Morden Research Station, Morden, Manitoba, during 1999 and 2000. The trials consisted of 3 reps per variety. Measured characteristics were based on a minimum of 100 measurements per year.

Table 10: Comparison table for 'AC Nugget'

	'AC NUGGET'	'FLANDERS'*	'OMEGA'*	'989'*
Plant height (cm)				
mean	60.4	56.7	60.0	66.4
std. deviation	5.8	5.3	6.2	6.5
Length of main axis (cm)				
mean	58.9	56.6	60.0	64.9
std. deviation	7.4	5.4	6.3	12.0
Seed length (mm)				
mean	4.9	4.8	5.0	4.9
std. deviation	0.2	0.2	0.2	0.1
Seed width (mm)				
mean	2.5	2.5	2.7	2.5
std. deviation	0.2	0.2	0.3	0.2
Seed weight (grams per 1000 seeds)				
	5.6	5.4	5.7	5.8
Protein content (%)				
	36.7	36.1	36.6	36.0
Oil content (%)				
	45.0	43.7	43.0	41.5
Palmitic acid content (%)				
	4.9	5.0	5.2	6.2
Stearic acid content (%)				
	4.2	4.4	3.7	3.8
Oleic acid content (%)				
	20.1	20.9	22.0	16.1
Linoleic acid content (%)				
	13.3	13.7	16.2	71.6
Linolenic acid content (%)				
	57.4	56.0	52.9	2.1
Iodine number				
	190.5	188.1	185.5	143.5

* reference varieties

IMPATIENS
(*Impatiens hawkerii* Bull.)

Proposed denomination: **'Miami'** (see figure 11)
Application number: 98-1501
Application date: 1998/10/08
Applicant: Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., Ottawa, Ontario

Variety used for comparison: 'Papete'

Summary: *'Miami' has slightly lighter leaf colour than 'Papete'. The leaf blade has weak anthocyanin colouration near the base of the midrib while the leaf of 'Papete' has medium anthocyanin at the base and mid-section of the midrib. 'Miami' has weak to medium anthocyanin on the veins of the lower leaf surface and medium anthocyanin on the petiole while 'Papete' has strong anthocyanin on the veins and petiole. 'Miami' has slightly lighter flower colour than 'Papete'.*

Description: 'Miami' is a New Guinea Impatiens variety. The leaves of 'Miami' are elliptic in shape and have a medium green ground colour on the upper side with no markings present. The lower side of the leaf blade is green in colour between the veins. The midrib on the upper side has weak anthocyanin colouration near the base and the veins on the lower surface have weak to medium anthocyanin. The petiole has medium anthocyanin.

'Miami' has single flowers which are reddish-purple in colour with no secondary colour. The eye zone is small in size. The peduncle has weak to medium anthocyanin and the spur has medium anthocyanin.

Origin and Breeding: 'Miami' originated from the cross H 373N x K 127 made in Stuttgart, Germany in 1994.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Miami' were conducted in a polyhouse during the spring/summer of 2001 in Frankton, Ontario. The trials included a total of ten plants per variety. All plants were grown from rooted cuttings transplanted into four inch pots.

Table 11: Comparison table for 'Miami'

	'MIAMI'	'PAPETE'*
Plant height (cm)		
mean	11.5	9.4
std. deviation	1.1	1.3
number measured	9	9
Plant width (cm)		
mean	19.5	18.0
std. deviation	2.1	1.3
number measured	9	9
Length of leaf blade (cm)		
mean	10.2	8.6
std. deviation	1.0	1.2
number measured	10	10
Colour of upper side of leaf blade (RHS)	147A	139A
Main colour of upper side of petal (RHS)	N74A-B	N74A (darker than)
Colour of eye zone (RHS)	60B	60B

* reference variety

Proposed denomination: **'Vienna'** (see figure 12)
Application number: 98-1503
Application date: 1998/10/08
Applicant: Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., Ottawa, Ontario

Variety used for comparison: 'Lycia'

Summary: *'Vienna' has weaker anthocyanin in the petiole than 'Lycia'. The main colour of the upper side of the petal is very light pink for 'Vienna' while it is white for 'Lycia'. The secondary colour on the upper side of the petals is reddish-purple for 'Vienna' while it is reddish-orange for 'Lycia'. 'Vienna' differs from 'Lycia' in the colour of the eye zone and colour of the lower side of the petal.*

Description: 'Vienna' is a New Guinea Impatiens variety. The leaves of 'Vienna' are elliptic in shape and have a dark green ground colour on the upper side with no markings present. The lower side of the leaf blade is green in colour between the veins with faint red colouration. The midrib on the upper side has medium anthocyanin colouration and the veins on the lower surface have strong to very strong anthocyanin. The petiole has weak anthocyanin.

'Vienna' has single flowers which are very light pink in colour with reddish-purple secondary colour present. The secondary colour is located mainly on the upper petal and along the midrib of all petals. The eye zone is small in size. The peduncle has weak anthocyanin and the spur has very weak anthocyanin.

Origin and Breeding: 'Vienna' originated from the cross Dan 109 x unknown father made in Stuttgart, Germany in 1996.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Vienna' were conducted in a polyhouse during the spring/summer of 2001 in Frankton, Ontario. The trials included a total of ten plants of the candidate variety and five plants of the reference variety. All plants were grown from rooted cuttings transplanted into four inch pots.

Table 12: Comparison table for 'Vienna'

	'VIENNA'	'LYCIA'*
Plant height (cm)		
mean	11.1	12.3
std. deviation	1.7	2.0
number measured	10	5
Plant width (cm)		
mean	20.5	18.2
std. deviation	2.6	2.3
number measured	10	5
Length of leaf blade (cm)		
mean	12.0	10.4
std. deviation	1.5	1.4
number measured	10	5
Main colour of upper side of petal (RHS)	69C-D	N155C
Secondary colour of upper side of petal (RHS)	63B to 58C	44B, 44C-D
Main colour of lower side of petal (RHS)	62D	44C, N155C

Colour of eye zone (RHS)
N57A-58C 67B, N66C

* reference variety

LILAC (*Syringa* L.)

Proposed denomination: **'Bailbelle'** (see figure 10)
Trade name: **Tinkerbelle™**
Application number: 99-1863
Application date: 1999/11/22
Applicant: Bailey Nurseries Inc., St. Paul, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Jeffries Nurseries Ltd., Portage La Prairie, Manitoba

Varieties used for comparison: *Syringa meyeri* 'Palibin' (Dwarf Korean type) and *Syringa patula* 'Miss Kim'

Summary: *'Bailbelle' is a hybrid lilac variety that has a bushy, rounded growth habit with a dense crown, similar to 'Palibin' but very different from 'Miss Kim' and most other lilac varieties. 'Bailbelle' has a small, rounded leaf blade whereas 'Palibin' has a broad ovate leaf and 'Miss Kim' has a large, ovate shaped leaf. 'Bailbelle' has dense pubescence on the lower surface of the leaf blade, while the reference varieties have sparse pubescence . 'Bailbelle' also has dense pubescence on the pedicels, whereas 'Palibin' has medium and 'Miss Kim' has sparse pubescence. The main distinguishing characteristic is the colour of the flower buds and flowers of 'Bailbelle', which are pink, compared with the flower buds and flowers of the references which are more purple coloured.*

Description: 'Bailbelle' is a lilac variety which produces bushy, globe shaped plants with dense foliage. Anthocyanin colouration in the young shoots is very strong and pubescence is dense. The bark of the one year old shoots is reddish brown and there are a medium number of lenticels. The leaves are small, rounded in shape and smooth in texture. The leaf tip is acute and the base is rounded. In cross section the leaf blade is strongly concave. The upper surface of the leaf blade is medium green, with moderate pubescence and no glossiness. The lower surface is light green with strong pubescence. The margin is weakly undulating and there is no glaucosity on either leaf surface.

'Bailbelle' flowers mid-season and produces erect panicles on both lateral and terminal buds. The peduncle and pedicels are strongly pubescent. The florets are single and have four corolla lobes that are flat to cupped shaped in cross-section with a rounded tip. The corolla tube is funnel form and long (up to 1½ times the diameter). The buds of 'Bailbelle' are deep pink in colour and the open florets are light pink with a darker pink corolla tube. The stamens are more than ½ the length of the corolla tube and have purple anthers. The fragrance of 'Bailbelle' is strong.

Origin and Breeding: 'Bailbelle' is a hybrid which originated from a cross between *Syringa meyeri* 'Palibin' and *Syringa microphylla* 'Superba'. The initial selection was conducted in 1985 in North Dakota. The selection criteria were hardiness and flower colour.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Bailbelle' were conducted at Jeffries Nurseries, Portage la Prairie, Manitoba during 2000 and 2001. Ten plants, planted 2 feet apart, were evaluated in the field, and a further ten plants, growing in 2 gallon pots were observed. Measured characteristics were taken from the plants grown in pots and were based on a minimum of ten measurements. The potted plants were rooted as softwood cuttings the first year, planted in 1 gallon pots the second year and transplanted into 2 gallon pots during the third year.

Table 13: Comparison table for 'Bailbelle'

	'BAILBELLE'	'PALIBIN'*	'MISS KIM'*
Length of leaf blade (cm)			
mean	30.5	30.2	74.8
std.deviation	3.95	1.81	12.41
Width of leaf blade (cm)			
mean	28.5	28.4	40.1
std. deviation	4.75	2.41	6.79
Length of petiole (mm)			
mean	6.9	7.4	11.2
std. deviation	1.29	0.84	2.2
Diameter of corolla (mm)			
mean	9.8	8.4	6.9
std. deviation	0.79	1.17	0.74
Colour of unopened bud (RHS)			
60D	77B	77A	
Overall flower colour (RHS)			
65C to 65D	75C	76D	
Colour of inner surface of corolla lobes (RHS)			
65C to 65D	75C	76D but paler	

Colour of outer surface of corolla tube (RHS)		
67B	75C	84B

* reference varieties

OAT
(*Avena sativa* L.)

Proposed denomination: **'SW EXACTOR'**
Application number: 99-1638
Application date: 1999/04/22
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Variety used for comparison: 'Triple Crown'

Summary: *'SW EXACTOR' has leaves that are glossy with no pubescence at the margins while those of 'Triple Crown' are glaucous with pubescence at the margins. The flag leaf internode for 'SW EXACTOR' is glossy while it is glaucous for 'Triple Crown'. After heading (green stage), 'SW EXACTOR' is taller than 'Triple Crown'.*

Description: 'SW EXACTOR' is a hulled, spring oat variety. The juvenile growth habit is erect and the lower leaves and their sheaths have no pubescence. At the booting stage, the leaves are medium green with no glaucosity. The ligules are present. There is no pubescence on the margins of the leaves and the flag leaf attitude is intermediate between upright and drooping. There is no glaucosity on the flag leaf internode and no pubescence of the upper culm node. The panicle of 'SW EXACTOR' is symmetrical. The glumes are yellow in colour and medium in length and width. The lemma is short and white with a moderately pointed tip. There is moderate intensity of glaucosity with no pubescence on the lemma. Length of the palea of 'SW EXACTOR' reaches half way up the lemma.

The kernel of 'SW EXACTOR' is white, intermediate between slender and plump and has basal hairs that are intermediate between short and long. The caryopsis is pubescent with mid-long brush hair. There are two grains per spikelet.

Origin and Breeding: 'SW EXACTOR' originated from the cross Dal x Vital^2 x Vital, completed in 1989 in Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigreed method and the variety originated from a single plant selection in the F_3 and repeated selection in the F_6. Early generation selection was made for disease resistance and grain quality, with later selection for yield and straw stiffness. Breeder seed was derived from an F_8 line in 1997.

Tests and Trials: Tests and trials for 'SW EXACTOR' were conducted at Nipawin, Saskatchewan in 1998 and 1999. The trials consisted of 2 replicates per variety. Each plot was 1.75 metres wide and 3.25 metres long. For each replicate there were approximately 1563 plants spaced at 275 plants per m^2. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 20 measurements per year.

Table 14: Comparison table for 'SW EXACTOR'

	'SW EXACTOR'	'TRIPLE CROWN'*
Plant height (including spike, excluding awns) (cm)		
mean	105.6	101.0
range	86-121	89-118
std. deviation	10.61	6.88

* reference varieties

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

Proposed denomination: **'SW PARADE'** (see figure 13)
Application number: 99-1573
Application date: 1999/03/19
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Variety used for comparison: 'Majoret'

Summary: *'SW PARADE' is a green cotyledon, semi-leafless field pea. Density of flecking on the stipules for 'SW PARADE' is intermediate between sparse and dense while it is sparse for 'Majoret'. The pods of 'SW PARADE' have a very weak degree of curvature while those of 'Majoret' have a very strong degree of curvature. Time of maturity for 'SW PARADE' is early while it is mid-season for 'Majoret'. 'SW PARADE' produces a lighter seed with less protein content than 'Majoret'.*

Description: 'SW PARADE' is a green cotyledon, field pea variety which has no stem fasciation. The plants are yellow green and have no anthocyanin colouration. The vines are intermediate between short and long. 'SW PARADE' is a semi-leafless variety. Stipule development is normal with no

rabbit-eared stipules. Stipule flecking is intermediate between sparse and dense.

'SW PARADE' flowers mid-season. There are two flowers per node. The standard is white with an arched base.

'SW PARADE' produces green pods, with a very weakly concave curvature. The pod parchment is entirely present. The distal part of the pod is blunt and there are an average of six to seven ovules per pod. The immature seeds of 'SW PARADE' are light green. The dry seeds are medium sized, spherical, with green cotyledons and no black hilum. The starch grain is simple. 'SW PARADE' matures early.

Origin and Breeding History: 'SW PARADE' was developed in Svalöv, Sweden and originated from a cross done in 1990. The breeding method was a pedigreed method and the variety originated from a single plant selection in the F_3. Selection was made for yield, semi-leafless trait, earliness, straw stiffness, good cotyledon colour and good tendrils. Breeder seed was bulked in the F_4.

Test and Trials: Tests and trials for 'SW PARADE' were conducted at Nipawin, Saskatchewan in 1998 and 1999. The trials consisted of 2 replicates per variety. Each plot was 1.75 metres wide and 3.25 metres long. For each replicate there were approximately 236 plants spaced at 42 plants per m^2. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 20 measurements per year.

Table 15: Comparison table for 'SW PARADE'

	'SW PARADE'	'MAJORET'*
Plant height (cm)		
mean	49.4	55.7
range	26-71	26-99
standard deviation	11.03	12.53
Pod maximum length (cm)		
mean	6.9	7.6
range	5.5-8.1	6.4-8.8
standard deviation	0.57	0.64
Seed weight (grams per 1000 seeds)		
	232.5	253.0
Protein content		
percentage	22.7	24.9

* reference variety

PELARGONIUM
(*Pelargonium x hortorum* L.H. Bailey)

Proposed denomination: **'Klecona'**
Tradename: Arcona 2000
Application number: 01-2563
Application date: 2001/03/15
Applicant: Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., Ottawa, Ontario

Variety used for comparison: 'Fisgenta' and 'Fispurple'

Summary: *'Klecona' has shorter peduncles with less anthocyanin than the peduncles of 'Fisgenta'. 'Klecona' has fewer petals in the floret than the reference varieties. 'Klecona' differs slightly from the reference varieties in flower colour and has no petal markings while 'Fisgenta' has petal markings present.*

Description: 'Klecona' is a zonal pelargonium variety. 'Klecona' has an intermediate growth habit and green stems. The stems are thin to medium and have medium pubescence. The leaf blade is a type one shape with an open to closed base and crenate margins. There is weak lobing present which is shallow in depth. The leaf blade margin is moderately wavy and the leaf blade has medium pubescence on the upper side. The leaves are medium green in colour with no variegation. The leaf zone is weak to moderately conspicuous on young leaves and very weak on older leaves. The leaf zone is reddish-brown in colour and located in the normal position. 'Klecona' has dense pubescence on the petiole.

'Klecona' produces a low to moderate number of reddish-purple inflorescences. Peduncles have dense pubescence and weak anthocyanin colouration. The flower bud is round in shape and the florets are semi-double. The petal margin is entire. There is a small white zone at the base of the upper petals. There are no petal markings. The pedicel has medium pubescence and the colour in the middle third is medium red. The sepals have dense pubescence and are green and red in colour.

Origin and Breeding History: 'Klecona' originated from the controlled cross between 'Klevette' x ZJ 099 which was made in Stuttgart, Germany in 1992. Seedlings were selected in June 1993, based on the criteria for double flowers, flower colour, upright compact growth habit and early flowering.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Klecona' were

conducted in a polyhouse during the spring/summer of 2001 in Frankton, Ontario. The trials included a total of 10 plants per variety. All plants were grown from rooted cuttings transplanted into four inch pots. All measured characteristics were based on ten measurements.

Table 16: Comparison table for 'Klecona'

	'KLECONA'	'FISPURPLE'*	'FISGENTA'*
Peduncle length (cm)			
mean	15.8	17.4	15.2
std. deviation	1.6	2.2	1.4
Number of petals			
mean	7.7	8.3	10.3
std. deviation	0.8	1.1	0.7
Colour of upper petal (RHS)			
upper side-margin	N57A	N57A	N57A
upper side-middle	N57A (base 43C-D)	45B-46C (base 43C)	N57A (base 43C-D)
lower side	52A (with 50A-43C towards base)	52A (with 58C towards margin)	52C
Colour of lower petal (RHS)			
upper side-margin	N57A	N57A	N57B
upper side-middle	N57B	N57B	N57B
lower side	58C	52A (with 58C & white)	58B-C
Colour of inner petal (RHS)			
upper side-middle	N57A	N57A	N57B

* reference variety

Proposed denomination: **'Klesatha'**
Tradename: Samantha
Application number: 01-2564
Application date: 2001/03/15
Applicant: Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., Ottawa, Ontario

Variety used for comparison: 'Fissamba'

Summary: *'Klesatha' has shorter plant height than 'Fissamba'. The leaves of 'Klesatha' have less conspicuous leaf zones than 'Fissamba'. The peduncle has swelling at the base for 'Klesatha' while 'Fissamba' has swelling near the middle. 'Klesatha' has longer pedicels than 'Fissamba'.*

Description: 'Klesatha' is a zonal pelargonium variety. 'Klesatha' has an upright to intermediate growth habit and green stems. The stems are medium in thickness and have medium pubescence. The leaf blade is a type one shape with an open base and crenate margins. There is weak to medium lobing present which is shallow to medium in depth. The leaf blade margin has weak to moderate waviness and the upper surface of the blade has sparse to medium pubescence. The leaves are light to medium green in colour with no variegation. The leaf zone is very weakly conspicuous, green in colour and located in the normal position. The leaf zone is rarely found on young leaves. 'Klesatha' has medium to strong pubescence on the petiole.

'Klesatha' flowers early and produces a low to moderate number of red inflorescences. Peduncles have dense pubescence and weak to medium anthocyanin colouration. Swelling on the peduncle is located at the base. The flower bud is elliptic in shape and the florets are semi-double. The petal margin is entire. There is a very small white zone at the base of the upper petals. There are no petal markings. The pedicel has medium to dense pubescence and the colour in the middle third is medium red. There is no swelling present. The sepals have moderate pubescence and are green and red in colour.

Origin and Breeding History: 'Klesatha' originated from the controlled cross between 'Klespri' x ZI 174 which was made in Stuttgart, Germany in 1992. Seedlings were selected in June 1993, based on the criteria for double flowers, flower colour, upright compact growth habit and early flowering.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Klesatha' were conducted in a polyhouse during the spring/summer of 2001 in Frankton, Ontario. The trials included a total of 10 plants per variety. All plants were grown from rooted cuttings transplanted into four inch pots. All measured characteristics were based on ten measurements.

Table 17: Comparison table for 'Klesatha'

	'KLESATHA'	'FISSAMBA'*
Plant height (cm)		
mean	9.7	14.1
std. deviation	1.2	1.5
Colour of upper petal (RHS)		
upper side-margin	44B	44B
upper side-middle	44B-41A	44B-40A
lower side	41A (with 40A towards base)	40A (with 40B towards base)

Colour of lower petal (RHS)		
upper side-margin	44B	44B
upper side-middle	44B (with 50A in central zone)	44B
lower side	43B (43C/50A on edges)	43B (40A/50A on edges)
Colour of inner petal (RHS)		
upper side-middle	44B	44B
Pedicel length (cm)		
mean	3.4	2.6
std. deviation	0.4	0.3

* reference variety

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

Proposed denomination: **'Amandine'** (see figure 14)
Application number: 99-1568
Application date: 1999/03/12
Applicant: Germicopa SA, Quimper, France
Agent in Canada: Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montreal, Quebec

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Dali'

Summary: *'Amandine' has dark green leaves that are intermediate between open and closed in silhouette while 'Yukon Gold' has yellowish-green leaves that are open in silhouette. Symmetry of the base of the primary and terminal leaflets for 'Amandine' is mostly asymmetrical while it is mostly symmetrical for the reference varieties. 'Amandine' has a higher flowering profusion than the reference varieties. 'Amandine' has red-violet flowers while 'Dali' has white flowers. Tuber shape for 'Amandine' is long while it is round for 'Yukon Gold' and oblong for 'Dali'. The light sprout for 'Amandine' is conical in shape while it is ovoid for 'Yukon Gold' and broad cylindrical for 'Dali'. The light sprouts of 'Amandine' have weak pubescence at the base while those of 'Yukon Gold' have medium pubescence and those of 'Dali' have medium to strong pubescence. Pubescence of the light sprout tip for 'Amandine' is weak while it is strong for 'Dali'. 'Amandine' has strong red-violet anthocyanin colouration of the light sprout tip while 'Yukon Gold' has absent to weak red-violet anthocyanin colouration and 'Dali' has medium blue-violet anthocyanin colouration. Protrusion of lenticels on the light sprout is strong for 'Amandine' while it is weak for the reference varieties.*

Description: 'Amandine' is a stem type, short to medium plant with a semi-erect growth habit. The stems are moderately thick and have weak anthocyanin colouration. Stem wings are moderately prominent and both straight single and straight double. The stem nodes have slight swelling and no anthocyanin. 'Amandine' produces a very high number of branches.

The leaves of 'Amandine' are dark green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is half way between opened and closed. 'Amandine' has no anthocyanin colouration on the upper and lower surfaces of the leaf rachis. The rachis has moderately dense pubescence on the upper surface and no pubescence on the lower surface. The petioles have no anthocyanin colouration and the stipules are small to medium in size. The terminal leaflets are medium ovate in shape with acuminate shaped tips and cordate shaped, strongly asymmetrical bases. The margins of the terminal leaflets have weak waviness. 'Amandine' has five to six pairs of primary leaflets which are medium in size. They are narrowly ovate in shape with acute shaped tips and cordate shaped, strongly asymmetrical bases.

'Amandine' produces a medium number of inflorescences per plant and a medium number of florets per inflorescence. The flower buds have moderate anthocyanin and are persistent. When fully expanded, the flowers are red-violet in colour. There is moderate anthocyanin colouration on the inner and outer side of the corolla. The corolla is medium in size with a moderately prominent star. The calyx has medium anthocyanin colouration and the peduncle has weak anthocyanin. When the flower is fully expanded, the anthers are orange in colour and arranged in a broad cone shape. The stigma is capitate and medium green in colour.

The tubers of 'Amandine' have light yellow coloured skin with no secondary colour. Skin texture is smooth and tuber shape is long. Tuber eyes are shallow in depth, few in number and have a predominantly apical distribution. The eyebrows are not prominent. The tuber flesh is light yellow in colour with no secondary colour. 'Amandine' produces a medium number of tubers per plant.

The light sprout of 'Amandine' is conical in shape with weak pubescence and medium intensity of red-violet anthocyanin colouration at the base. The light sprout tip habit is moderate between closed and open. The tip has weak pubescence and strong intensity of red-violet anthocyanin colouration. The light sprout has a medium frequency of root initials and strong protrusion of lenticels. The lateral shoots on the light sprout

are medium in length.

Origin and Breeding: 'Amandine' originated from a cross between 'Mariana' and 'Charlotte', made in Châteauneuf-du-Faou, France in 1981. Trials were grown in France, Italy, Germany and England from 1983 to 1991. Selection criteria included appearance, yield, resistance to diseases and pests, and culinary quality.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Amandine' were conducted at Grand Falls, New Brunswick in 2000. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.5 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between adjacent hills within the plot was 30.5 cm. Unless indicated otherwise, measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 18: Comparison table for 'Amandine'

	'AMANDINE'	'YUKON GOLD'*	'DALI'*
Number of secondary and tertiary leaflets			
	15-26	16-25	10-30
RHS colour of inner surface of corolla			
	76A (white tips)	76B (white tips)	155B
Tuber length (at mid-range) (mm)			
mean	107.3	71.9	89.2
std. deviation	12.7	7.6	10.2
range	86-135	57-88	65-108
Tuber width (at mid-range) (mm)			
mean	52.8	69.4	61.6
std. deviation	4.9	6.2	6.8
range	42-60	57-80	50-75
Tuber thickness (at mid-range) (mm)			
mean	44.5	56.3	50.1
std. deviation	3.0	4.8	4.6
range	40-50	48-66	40-58

* reference varieties

Proposed denomination: 'Sandy' (see figure 15)
Application number: 99-1569
Application date: 1999/03/12
Applicant: Germicopa SA, Quimper, France
Agent in Canada: Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montreal, Quebec
Breeder: Germicopa SA, Quimper, France

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Atlantic'

Summary: *'Sandy' has stronger anthocyanin on the stem than the reference varieties. 'Sandy' has dark green leaves while 'Yukon Gold' has yellowish-green leaves and 'Atlantic' has olive-green to medium green leaves. 'Sandy' produces a higher number of inflorescences than 'Yukon Gold'. Flower bud persistence for 'Sandy' is high while it is low for 'Yukon Gold'. Flower colour for 'Sandy' is red-violet while it is a pale red-violet with white tips for the reference varieties. Intensity of anthocyanin colouration of the calyx and peduncle for 'Sandy' is medium while it is weak for the reference varieties. 'Sandy' produces tubers that are tan in colour with a netted skin texture while those of 'Yukon Gold' are light yellow with a smooth skin texture and those of 'Atlantic' are buff with a rough to netted skin texture. General shape of the light sprout for 'Sandy' is conical with no pubescence at the base while it is ovoid with medium pubescence for the reference varieties. 'Sandy' has a red-violet anthocyanin colouration at the base of the light sprout while it is blue-violet for 'Atlantic'. Habit of the light sprout tip for 'Sandy' is medium between closed and open while it is closed for the reference varieties. 'Sandy' has medium to strong intensity of anthocyanin colouration of the light sprout tip while it is absent to very weak in the reference varieties. The light sprout for 'Sandy' has a medium frequency of root initials and strong protrusion of lenticels while those of the reference varieties have a low frequency of root initials and weak protrusion of lenticels.*

Description: 'Sandy' is a stem type, tall plant with an erect growth habit. The stems are moderately thick and have strong intensity of anthocyanin colouration. Stem wings are prominent and waved single. The stem nodes have slight swelling and no anthocyanin colouration. 'Sandy' produces a very high number of branches.

The leaves of 'Sandy' are dark green in colour and are mostly glabrous on the lower surface. The leaf silhouette is half way between opened and closed. 'Sandy' has weak anthocyanin colouration on the upper surface of the leaf rachis and no anthocyanin colouration on the lower surface. The rachis has very little pubescence on the upper surface and no pubescence on the lower surface. The petioles have weak anthocyanin colouration and the stipules are large. The terminal leaflets are narrowly ovate in shape with acute to acuminate shaped tips and obtuse to cordate shaped, strongly asymmetrical bases. The margins of the terminal leaflets have medium waviness. 'Sandy' has six pairs of primary leaflets which are medium in

size. They are narrowly ovate in shape with acute to acuminate shaped tips and cordate shaped, strongly symmetrical bases.

'Sandy' produces a medium to high number of inflorescences per plant and a medium number of florets per inflorescence. The flower buds have a moderate intensity of anthocyanin colouration and are persistent. When fully expanded, the flowers are red-violet in colour. There is a strong intensity of anthocyanin colouration on the inner and outer side of the corolla. The corolla is large with a moderately prominent star. The calyx and peduncle have medium anthocyanin colouration. The anthers are orange in colour when the flower is fully expanded and arranged in a narrow cone shape. The stigma is capitate and medium green in colour.

The tubers of 'Sandy' have tan coloured skin with no secondary colour. Skin texture is netted and tuber shape is round. Tuber eyes are deep, intermediate in number and evenly distributed. The eyebrows are not prominent. The tuber flesh is light yellow in colour with no secondary colour. 'Sandy' produces a medium number of tubers per plant.

The light sprout of 'Sandy' is conical in shape with no pubescence and strong, red-violet anthocyanin colouration at the base. The light sprout tip habit is intermediate between closed and open. The tip has weak pubescence and medium to strong, red-violet anthocyanin colouration. The light sprout has a medium frequency of root initials and strong protrusion of lenticels. The lateral shoots on the light sprout are short.

Origin and Breeding: 'Sandy' originated from a cross between 'Saturna' and 'Vakon', made in Châteauneuf-du-Faou, France in 1982. Trials were grown in France, Italy, Portugal, Germany and England from 1984 to 1993. Selection criteria included yield, resistance to diseases and pests, and quality for making chips.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Sandy' were conducted at Grand Falls, New Brunswick in 2000. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.5 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between adjacent hills within the plot was 30.5 cm. Unless indicated otherwise, measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 19: Comparison table for 'Sandy'

	'SANDY'	'YUKON GOLD'*	'ATLANTIC'*
Number of secondary and tertiary leaflets			
	10-16	16-25	11-19
RHS colour of inner surface of corolla			
	86C	76B (white type)	76B (white type)

* reference varieties

Proposed denomination: **'Cynthia'** (see figure 16)
Application number: 99-1570
Application date: 1999/03/12
Applicant: Germicopa SA, Quimper, France
Agent in Canada: Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montreal, Quebec
Breeder: Germicopa SA, Quimper, France

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Morning Gold'

Summary: *'Cynthia' has medium green leaves that are half way between opened and closed in silhouette while 'Yukon Gold' has yellowish-green leaves that are open in silhouette. Symmetry of the base of the terminal leaflet for 'Cynthia' is mostly asymmetrical while it is mostly symmetrical for the reference varieties. 'Cynthia' produces fewer secondary and tertiary leaflets than the reference varieties. 'Cynthia' produces a low profusion of inflorescence per plant while 'Morning Gold' produces a medium to high profusion. 'Cynthia' has white flowers while 'Yukon Gold' has red-violet flowers. The star on the corolla for 'Cynthia' is weakly prominent while it is moderately to very prominent for the reference varieties. Tuber shape for 'Cynthia' is oval to oblong while it is round for the reference varieties. The light sprout for 'Cynthia' is conical in shape while it is ovoid for 'Yukon Gold' and broad cylindrical for 'Morning Gold'. The intensity of anthocyanin colouration at the base of the light sprout for 'Cynthia' is weak while it is medium for the reference varieties. The light sprout for 'Cynthia' has red-violet anthocyanin colouration whereas 'Morning Gold' has blue-violet anthocyanin colouration. 'Cynthia' has moderate intensity of anthocyanin colouration of the light sprout tip while it is absent to weak for 'Yukon Gold'. Protrusion of lenticels of the light sprout is weak for 'Cynthia' while it is strong for 'Morning Gold'.*

Description: 'Cynthia' is an intermediate type between leaf and stem type, medium in height plant with a semi-erect growth habit. The stems are moderately thick and have a weak intensity of anthocyanin colouration. Stem wings are moderately prominent and straight double type. The stem nodes have no swelling and no anthocyanin colouration.

'Cynthia' produces a very high number of branches.

The leaves of 'Cynthia' are medium green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is half way between opened and closed. 'Cynthia' has a weak intensity of anthocyanin colouration on the upper surface of the leaf rachis and no anthocyanin colouration on the lower surface. The upper surface of the rachis is weakly pubescent and there is no pubescence on the lower surface. The petioles have a weak intensity of anthocyanin colouration and the stipules are medium in size. The terminal leaflets are narrowly to medium ovate in shape with acute to acuminate shaped tips and obtuse to cordate shaped, strongly asymmetrical bases. The margins of the terminal leaflets have weak waviness. 'Cynthia' has five pairs of primary leaflets which are medium in size. They are narrowly ovate in shape with acute shaped tips and cordate shaped, moderately asymmetrical bases.

'Cynthia' produces a low number of inflorescences per plant and a low number of flowers per inflorescence. The flower buds have moderate intensity of anthocyanin colouration and are weakly persistent. When fully expanded, the flowers are white in colour. There is no anthocyanin colouration on the inner and outer sides of the corolla. The corolla is medium in size with a weakly prominent star. The calyx has weak intensity of anthocyanin colouration and the peduncle has no anthocyanin. The anthers are orange in colour when the flower is fully expanded and arranged in a pear shaped cone. The stigma is capitate and medium green in colour.

The tubers of 'Cynthia' have predominantly yellow coloured skin with no secondary colour. Skin texture is smooth and tuber shape is oval to oblong. Tuber eyes are at an intermediate depth between shallow and deep, intermediate in number and are evenly distributed. The eyebrows are not prominent. The tuber flesh is medium yellow in colour with no secondary colour. 'Cynthia' produces a medium number of tubers per plant.

The light sprout of 'Cynthia' is conical in shape with medium pubescence and weak, red-violet anthocyanin coloration at the base. The light sprout tip habit is closed. The tip has weak pubescence and moderate, red-violet anthocyanin colouration. The light sprout has a low frequency of root initials and weak protrusion of lenticels. The lateral shoots on the light sprout are medium in length.

Origin and Breeding: 'Cynthia' originated from a cross between 'Landia' and 'O'Sirene', made in Chincuteuf-du-Faou, France in 1983. Trials were grown in France, Italy, Germany and England from 1985 to 1993.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Cynthia' were conducted at Grand Falls, New Brunswick in 2000. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.5 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between adjacent hills within the plot was 30.5 cm. Unless indicated otherwise, measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 20: Comparison table for 'Cynthia'

	'CYNTHIA'	'YUKON GOLD'*	'WORNING GOLD'*
Number of secondary and tertiary leaflets	5-9	16-28	13-28
RHS colour of inner surface of corolla	155B	79B (white tips)	155B
Tuber length (at mid-range) (mm)			
mean	83.6	71.9	72.2
std. deviation	9.8	7.6	7.6
range	70-105	57-88	60-90
Tuber width (at mid-range) (mm)			
mean	60.7	60.4	70.2
std. deviation	3.3	6.2	4.7
range	55-68	57-80	64-80

* reference varieties

Proposed denomination: **'Marine'** (see figure 17)
Application number: 99-1971
Application date: 1999-03-12
Applicant: Germicopa SA, Quimper, France
Agent in Canada: Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montreal, Quebec
Breeder: Germicopa SA, Quimper, France

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Dali'

Summary: *'Marine' has thick stems with a strong intensity of anthocyanin colouration while the reference varieties have thin to medium stems with weak to medium intensity of anthocyanin colouration. Leaf colour for 'Marine' is yellowish green while it is medium green for 'Dali'. Intensity of anthocyanin colouration of the petioles for 'Marine' is moderate while it is absent to weak for the reference varieties. The base of the terminal leaflet for 'Marine' is cordate shaped and strongly asymmetrical while it is acute to obtuse shaped*

and strongly symmetrical for 'Yukon Gold'. Waviness of the terminal leaflet for 'Marine' is moderate while it is weak for 'Yukon Gold' and very weak for 'Dali'. 'Marine' produces a higher number of inflorescence than the reference varieties. 'Marine' produces flower buds that are very persistent while those of 'Yukon Gold' are moderately persistent and those of 'Dali' are weakly persistent. Flower colour for 'Marine' is blue-violet turning white while it is red-violet for 'Yukon Gold' and white for 'Dali'. 'Marine' has strong intensity of anthocyanin colouration of the peduncle whereas 'Yukon Gold' has weak intensity and 'Dali' has no anthocyanin colouration. Tuber shape for 'Marine' is oval to oblong while it is round for 'Yukon Gold'. Shape of the light sprout for 'Marine' is spherical while it is ovoid for 'Yukon Gold' and broad cylindrical for 'Dali'. 'Marine' has strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration at the base of the light sprout while it is red-violet and of moderate intensity for 'Yukon Gold'. Tip of the light sprout for 'Marine' is strongly pubescent with a habit that is intermediate between closed and open while that of 'Yukon Gold' is weakly pubescent with a closed habit. 'Marine' has strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration at the tip of the light sprout while 'Yukon Gold' has absent to very weak intensity of red-violet anthocyanin colouration.

Description: 'Marine' is intermediate between a stem type and leaf type, medium tall plant with a semi-erect growth habit. The stems are thick and have strong anthocyanin colouration. Stem wings are prominent and waved single. The stem nodes have slight swelling and no anthocyanin. 'Marine' produces a moderate number of branches.

The leaves of 'Marine' are yellowish-green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is intermediate between closed and open. 'Marine' has weak intensity of anthocyanin colouration on the upper surface of the leaf rachis and no anthocyanin on the lower surface. The rachis has strong pubescence on the upper surface and no pubescence on the lower surface. The petioles have medium intensity of anthocyanin colouration and the stipules are medium in size. The terminal leaflets are medium ovate in shape with acuminate shaped tips and cordate shaped, strongly asymmetrical bases. The margins of the terminal leaflets have medium waviness. 'Marine' has five pairs of large primary leaflets. They are narrowly ovate in shape with acute shaped tips and cordate shaped, strongly symmetrical bases.

'Marine' produces a medium number of inflorescences per plant and a medium number of florets per inflorescence. The flower buds have moderate intensity of anthocyanin colouration and are strongly persistent. When fully expanded, the flower colour is blue-violet turning white. The corolla has moderate intensity of anthocyanin colouration on the inner side and anthocyanin colouration on the outer side. The corolla is medium in size with a moderately prominent star. The calyx has medium to strong intensity of anthocyanin colouration and the peduncle has strong intensity of anthocyanin colouration. The anthers are bright yellow in colour when the flower is fully expanded and arranged in a pear shaped cone. The stigma is capitate and medium green in colour.

The tubers of 'Marine' have yellow coloured skin with no secondary colour. Skin texture is smooth and tuber shape is oval to oblong. Tuber eyes are shallow in depth, intermediate between few and many in number and have a predominantly apical distribution. The eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is medium to dark yellow in colour with no secondary colour. 'Marine' produces a medium number of tubers per plant.

The light sprout of 'Marine' is spherical in shape with weak to moderate pubescence and very strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration at the base. Habit of the light sprout tip is intermediate between closed and open. The tip has strong pubescence and strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration. The light sprout has a medium frequency of root initials and strong protrusion of lenticels. The lateral shoots on the light sprout are medium in length.

Origin and Breeding: 'Marine' originated from a cross between 'Aminca' and 'O'Sirene', made in Châteauneuf-du-Faou, France in 1981. Trials were grown in France, Italy, Germany and England from 1983 to 1991. Selection criteria included appearance, yield, resistance to diseases and pests, and culinary quality.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Marine' were conducted at Grand Falls, New Brunswick in 2000. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.5 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between adjacent hills within the plot was 30.5 cm. Unless indicated otherwise, measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 21: Comparison table for 'Marine'

	'MARINE'	'YUKON GOLD'*	'DALI'*
Number of secondary and tertiary leaflets	20-33	16-25	10-30
RHS colour of inner surface of corolla	91B	76B (white tips)	155B

Tuber length (at mid-range) (mm)			
mean	86.4	71.9	89.2
std. deviation	13.7	7.6	10.2
range	69-110	57-88	65-108

* reference varieties

Proposed denomination: **'Sylvia'** (see figure 18)
Application number: 99-1572
Application date: 1999/03/12
Applicant: Germicopa SA, Quimper, France
Agent in Canada: Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montreal, Quebec
Breeder: Germicopa SA, Quimper, France

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Dali'

Summary: *'Sylvia' has dark green leaves that are intermediate between open and closed in silhouette while 'Yukon Gold' has yellowish-green leaves that are open in silhouette. Symmetry of the base of the primary and terminal leaflets for 'Sylvia' is mostly asymmetrical while it is mostly symmetrical for the reference varieties. 'Sylvia' produces a moderate profusion of inflorescence per plant while 'Yukon Gold' produces none to low and 'Dali' produces a low profusion. 'Sylvia' has blue-violet flowers while those of 'Yukon Gold' are red-violet and those of 'Dali' are white. Tubers for 'Sylvia' are oblong shaped with medium yellow flesh whereas 'Yukon Gold' has round shaped tubers with tight yellow flesh. The light sprout for 'Sylvia' is conical in shape while it is ovoid for 'Yukon Gold' and broad cylindrical for 'Dali'. 'Sylvia' has strong to very strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration of the light sprout base while for 'Yukon Gold' it is red-violet and of moderate intensity. Habit of the light sprout tip for 'Sylvia' is intermediate between open and closed while it is closed for 'Yukon Gold'. Pubescence of the light sprout tip for 'Sylvia' is moderate while it is weak for 'Yukon Gold' and strong for 'Dali'. 'Sylvia' has strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration of the light sprout tip while 'Yukon Gold' has absent to weak intensity of red-violet anthocyanin colouration and 'Dali' has medium intensity of blue-violet anthocyanin colouration.*

Description: 'Sylvia' is a stem type, medium to tall plant with an erect growth habit. The stems are moderately thick and have medium intensity of anthocyanin colouration. Stem wings are prominent and waved single. The stem nodes have slight swelling and no anthocyanin. 'Sylvia' produces a very high number of branches.

The leaves of 'Sylvia' are dark green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is intermediate between opened and closed. 'Sylvia' has no anthocyanin colouration on the upper and lower surfaces of the leaf rachis. The rachis has moderately dense pubescence on the upper surface and no pubescence on the lower surface. The petioles have no anthocyanin colouration and the leaf stipules are medium in size. The terminal leaflets are medium ovate in shape with acute shaped tips and obtuse to cordate shaped, strongly asymmetrical bases. The margins of the terminal leaflets have weak waviness. 'Sylvia' has six pairs of primary leaflets which are large in size. They are narrowly ovate in shape with acute shaped tips and cordate shaped, moderately asymmetrical bases.

'Sylvia' produces a medium number of inflorescences per plant and a medium number of florets per inflorescence. The flower buds have strong intensity of anthocyanin and are very persistent. When fully expanded, the flowers are blue-violet in colour. There is strong anthocyanin colouration on the inner and outer sides of the corolla. The corolla is large in size with a star that is not very prominent. The calyx has strong intensity of anthocyanin colouration and the peduncle has moderate anthocyanin. The anthers are orange in colour when the flower is fully expanded and arranged in a broad cone shape. The stigma is capitate and medium green in colour.

The tubers of 'Sylvia' have light yellow coloured skin with no secondary colour. Skin texture is smooth and tuber shape is oblong. Tuber eyes are shallow in depth, few in number and have a predominantly apical distribution. The eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is medium yellow in colour with no secondary colour. 'Sylvia' produces a medium number of tubers per plant.

The light sprout of 'Sylvia' is conical in shape with medium pubescence and strong to very strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration at the base. The light sprout tip habit is intermediate between closed and open. The tip has moderate pubescence and strong intensity of blue-violet anthocyanin colouration. The light sprout has a medium frequency of root initials and medium protrusion of lenticels. The lateral shoots on the light sprout are short in length.

Origin and Breeding: 'Sylvia' originated from a cross between 'VK.73.3.40' and 'O'Sirene', made in Châteauneuf-du-Faou, France in 1983. Trials were grown in France, Italy, Portugal, Germany and England from 1985 to 1993. Selection criteria included yield, resistance to diseases and pests, and quality for making chips.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Sylvia' were conducted at Grand Falls, New Brunswick in 2000. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.5 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between adjacent hills within the plot was 30.5 cm. Unless indicated otherwise, measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 22: Comparison table for 'Sylvia'

	'SYLVIA'	'YUKON GOLD'*	'DALI'*
Number of secondary and tertiary leaflets			
	18-28	16-25	10-30
RHS colour of inner surface of corolla			
	91A	76B (white tips)	155B
Tuber length (at mid-range) (mm)]			
mean	100.2	71.9	89.2
std. deviation	11.7	7.6	10.2
range	64-120	57-88	65-108

* reference varieties

ROSE
(*Rosa* L.)

Proposed denomination: **'POULdava'**
Trade name: Augusta
Application number: 96-729
Application date: 1994/11/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULweeto' and 'Morden Centennial'

Summary: *Growth habit for 'POULdava' is spreading to trailing while that of 'Morden Centennial' is upright to bushy. 'POULdava' has many short prickles on its stems while for the reference varieties they are sparse. 'POULdava' has larger leaves, terminal leaflets and flowers than 'POULweeto' and smaller leaves, terminal leaflets and flowers than 'Morden Centennial'. 'POULdava' has shorter sepals and smaller petals than 'Morden Centennial'. The flowers of 'POULdava' are light salmon-pink coloured while 'POULweeto' has flowers that are deep pink coloured fading to light pink and 'Morden Centennial' has bluish rose coloured flowers.*

Description: 'POULdava' is a small shrub rose which has a spreading to trailing growth habit. The young shoots have weak intensity of bronze anthocyanin colouration. 'POULdava' has many linear (needle-shaped), short prickles on the stem. There are an average number of long prickles on the stem. The prickles are reddish-brown in colour. The leaves are medium green in colour with medium to strong glossiness. There are five to seven leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a leathery texture. The base is wedge -shaped to rounded in shape.

'POULdava' flowers early and almost continuously for more than 10 weeks. There is a medium to high number of flowers per shoot. The flower pedicels have many hairs or prickles. The flower bud is pointed to ovoid in shape and sepal extensions are weak. The fully opened flowers are irregularly rounded in shape when viewed from above, flat on the upper and lower parts when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is semi-double. 'POULdava' has light salmon-pink coloured flowers. The flower petals have small spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has weak reflexing and weak undulation. The stamens of 'POULdava' have a yellow filament. The style is medium to long in length, purple and red toned fading to white in colour, has no hairiness on the upper half and is positioned below the anthers. The receptacle is small to medium in size, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have a very weak, tea fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULdava' resulted from a cross between two unnamed shrub rose seedlings, made in 1986 in Fredensborg, Denmark. The variety was selected as exhibiting pink flowers.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULdava' were conducted at Enderlein Nurseries in Lisle, Ontario in 2001. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 6 measurements.

Table 23: Comparison table for 'POULdava' and 'POULweeto'

	'POULDAVA'	'POULWEETO'	'MORDEN CENTENNIAL'*
Leaf length (mm)			
mean	109.2	66.6	149.2
std. deviation	6.7	3.72	7.8
range	100-120	60-70	135-160
Leaf width (mm)			
mean	80.0	39.8	110.0
std. deviation	11.3	2.9	7.6
range	65-95	36-45	100-120
Terminal leaflet length (mm)			
mean	49.3	26.0	64.5
std. deviation	3.03	1.73	3.59
range	45-55	23-28	58-70
Terminal leaflet width (mm)			
mean	26.5	11.8	42.0
std. deviation	1.89	1.06	2.51
range	23-28	10-13	38-45
Sepal length (including extensions) (mm)			
mean	15.3	14.0	26.8
std. deviation	2.42	1.52	2.03
range	12-20	12-16	24-30
Flower diameter (mm)			
mean	53.3	41.3	77.5
std. deviation	3.7	2.68	4.78
range	50-60	38-45	70-85
Petal length (mm)			
mean	19.3	20.5	42.2
std. deviation	1.88	1.11	2.90
range	16-22	19-22	38-45
Petal width (mm)			
mean	20.8	15.0	39.0
std. deviation	1.46	1.83	3.20
range	18-22	12-18	35-45
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	26B to 26C	52C	54A
upper surface	26B	52C	63A
lower surface	26C	52D	60D
Overall flower colour (RHS)	38C to 38D	48D	54A to 58B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	26D	48B	54A to 58B
middle zone	26D	48B	54A to 58B
base	12A	13B	1D
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	26D	48C	54A to 58B
middle zone	26C	48C	54A to 58B
base	12A	13B	1D

* reference variety

Proposed denomination: **'POULnew'** (see figure 23)
Tradename: Jose Carreras
Application number: 98-1213
Application date: 1998/01/23
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULari' and 'POULman'

Summary: *'POULnew' has weaker anthocyanin in the young shoots than the reference varieties. 'POULnew' has larger leaves than the reference varieties. 'POULnew' has double flowers which are cream coloured while 'POULari' has very double flowers which are white in colour and 'POULman' has red flowers.*

Description: 'POULnew' is a hybrid tea rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has weak anthocyanin colouration which is bronze in colour. The stems have a sparse number of short prickles and an average number of long prickles which are concave in shape. The prickles and thorns are pinkish-red and yellow-green in colour. The leaves are medium green in colour and have medium to strong glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is rounded in shape.

'POULnew' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a medium number of flowers per shoot. The flower pedicel has a few prickles and the flower bud is pointed to ovoid in shape. Sepal extensions are weak. The flowers are round in shape when viewed from above, convex on the upper part when viewed from the side and convex on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is double. 'POULnew' has cream coloured flowers. The petals have small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin

has medium to strong reflexing and medium undulation. The stamen filament is yellowish-green in colour. The style is medium in length, reddish-purple in colour near the top and white near the base and has dense pubescence on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is large in size, funnel shaped and has no prickles. 'POULnew' has a medium tea fragrance.

Origin and Breeding: 'POULnew' resulted from the controlled cross between 'Peauduce' and an unnamed seedling, made in 1988 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULnew' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 24: Comparison table for 'POULnew'

	'POULNEW'	'POULARI'*	'POULMAN'*
Leaf length (mm)			
mean	163.5	123.6	142.8
std. deviation	13.9	11.9	8.28
number measured	10	6	6
Leaf width (mm)			
mean	125.0	119.5	116.0
std. deviation	15.8	13.1	6.3
number measured	10	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	157A	155A	46A
upper surface	158C	155B	46A
lower surface	158D	157A	46A
Overall flower colour (RHS)			
	158C	155B	53A
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	158C	155C	53C
middle zone	158C	155C	53C
base	157A	1C	4A
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	158C	155B	53B
middle zone	158C	155B	53B
base	157A	1D	4A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULrijk'** (see figure 24)
Tradename: Madison
Application number: 98-1239
Application date: 1998/03/04
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULcov' and 'Bonica'

Summary: *'POULrijk' has a more spreading growth habit than the reference varieties. 'POULrijk' has stronger anthocyanin colouration on the young shoot and darker leaves than 'POULcov'. 'POULrijk' has longer leaves than the reference varieties. 'POULrijk' has pink flowers while 'POULcov' has white flowers and 'Bonica' has lighter pink flowers.*

Description: 'POULrijk' is a dwarf, ground cover rose variety. The young shoot has strong to very strong anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stems have a sparse number of short and long prickles which are deeply concave in shape. The prickles and thorns are reddish-brown in colour. The leaves are medium to dark green in colour and have strong glossiness. There are five to nine leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is obtuse in shape.

'POULrijk' flowers early and flowers almost continuously for four to ten weeks. There are a medium to high number of flowers per shoot. The flower pedicel has many stipitate glands and the flower bud is ovoid in shape. Sepal extensions are weak. The flowers are irregularly rounded in shape when viewed from above, flat to flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower center has some infolding and the corolla type is double. 'POULrijk' has pink coloured flowers. The petals have small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has no reflexing or undulation. The stamen filament is yellow in colour. The style is medium in length, yellow-green in colour and has no pubescence on the upper half. The stigma is positioned slightly above the anthers. The receptacle is small in size, pitcher shaped and has no prickles. 'POULrijk' has a weak floral fragrance.

Origin and Breeding: 'POULrijk' resulted from the controlled cross between two unnamed seedlings, made in 1986 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULrijk' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 25: Comparison table for 'POULrijk'

	'POULRIJK'	'POULCOV'*	'BONICA'*
Leaf length (mm)			
mean	117.16	83.2	105.0
std. deviation	6.84	7.17	11.83
number measured	6	6	6
Leaf width (mm)			
mean	57.16	47.70	66.66
std. deviation	6.04	7.06	6.18
number measured	6	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	58B/C	155B	56A
upper surface	58B/C	155B	55B
lower surface	58B/C	155B	55C
Overall flower colour (RHS)			
	57D	155B	58A
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	57D	155B	55C/D
middle zone	57D	155B	55C
base	157D	155D	155C
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	62D	155B	55C/D
middle zone	62D	155B	55C
base	157D	155D	155C

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULisab'**
Trade name: Isabel Renaissance®
Application number: 98-1268
Application date: 1998/03/11
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'John S. Armstrong'

Summary: *'POULisab' is a large shrub rose while 'John S. Armstrong' is a hybrid rose. The leaves of 'POULisab are shorter and glossier than those of 'John S. Armstrong'. 'POULisab' has wider terminal leaflets than 'John S. Armstrong'. Flower colour for 'POULisab' is more rich and velvety red than the red flower colour of 'John S. Armstrong'. 'POULisab' flowers have a strong, spicy fragrance while those of 'John S. Armstrong' have a weak to moderate tea fragrance.*

Description: 'POULisab' is a large shrub rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have strong to very strong intensity of reddish-brown anthocyanin colouration. 'POULisab' has a sparse number of concave shaped short prickles on the stem. There are a sparse to average number of long prickles on the stem. The prickles are reddish-brown in colour. The leaves are medium to dark green in colour with strong glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a leathery texture. The base is rounded in shape.

'POULisab' flowers mid-season and almost continuously for 6 to 10 weeks. There is a low number of flowers per shoot. The flower pedicels have a low number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are very weak to weak. The fully opened flowers are rounded to irregularly rounded in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and concave on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is very double. 'POULisab' has rich, velvety red flowers. The flower petals have small spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has absent to weak reflexing and absent to weak undulation. The stamens of 'POULisab' have a yellow filament. The style is medium in length, yellow in colour, has weak hairiness on the upper half and is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flowers have a strong, spicy fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULisab' resulted from a controlled cross between an unnamed seedling and POULnorm, made in 1990 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULisab' were conducted at Enderlein Nurseries in Lisle, Ontario in 2001.

There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 6 measurements.

Table 26: Comparison table for 'POULisab'

	'POULISAB'	'JOHN S. ARMSTRONG'*
Leaf length (mm)		
mean	130.0	159.2
std. deviation	12.25	9.3
range	110-150	145-170
Terminal leaflet width (mm)		
mean	54.3	43.1
std. deviation	3.72	3.60
range	48-60	37-48
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	46A	53A to 60B
upper surface	46A	46A
lower surface	53A	53A to 60B
Overall flower colour (RHS)		
	53A	46A
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	61A	53A
middle zone	61A	53A
base	157A	1D
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	53A	53A
middle zone	53A	53A
base	157A	1D

* reference variety

Proposed denomination: **'POULheart'** (see figure 25)
Tradename: Julia Renaissance®
Application number: 98-1269
Application date: 1998/03/11
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Queen Elizabeth' and 'POULari'

Summary: *'POULheart' has smaller leaves than the reference varieties. 'POULheart' has double flowers while the reference varieties have very double flowers. 'POULheart' has white flowers while 'Queen Elizabeth' has pink flowers.*

Description: 'POULheart' is an upright to bushy shrub rose variety. The young shoot has medium to strong anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stems have a sparse number of short and long prickles which are deeply concave to concave in shape. The prickles and thorns are reddish-brown in colour. The leaves are medium to dark green in colour and have medium to strong glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is rounded in shape.

'POULheart' flowers early and flowers almost continuously for four to six weeks. There are a low number of flowers per shoot. The flower pedicel has a low number of hairs or prickles and the flower bud is pointed to ovoid in shape. Sepal extensions are medium. The flowers are rounded to irregularly rounded in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and concave to flat on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is double. 'POULheart' has white flowers. The petals have small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has strong reflexing and weak to medium undulation. The stamen filament is yellow in colour. The style is long, yellow in colour and has medium pubescence on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. 'POULheart' has a strong fruit Tropicana fragrance.

Origin and Breeding: 'POULheart' resulted from the controlled cross between 'Margaret Merril' and an unnamed seedlings, made in 1989 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULheart' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 27: Comparison table for 'POULheart'

	'POULHEART'	'QUEEN ELIZABETH'*	'POULARI'*
Leaf length (mm)			
mean	117.5	132.5	123.6
std. deviation	15.22	6.89	11.9
number measured	6	6	6

Leaf width (mm)			
mean	84.83	119.16	119.50
std. deviation	11.61	7.35	13.1
number measured	6	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	27B	55A	155A
upper surface	27C	55B	155B
lower surface	27C	55B	157A
Overall flower colour (RHS)			
	158B	55B-55C	155B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	155C	55C	155C
middle zone	155C	55B	155C
base	3C	1D	1C
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	155A	55C	155B
middle zone	155A	55B	155B
base	3C	1D	1D

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULdra'**
Trade name: Alexandra Renaissance®
Application number: 98-1270
Application date: 1998/03/11
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'Morden Centennial'

Summary: *'POULdra' is a large, hybrid, shrub rose while 'Morden Centennial' is a small shrub rose. The young shoots of 'POULdra' have very strong intensity of reddish-brown anthocyanin colouration while those of 'Morden Centennial' have weak intensity of bronze anthocyanin. 'POULdra' has smaller, glossier leaves than 'Morden Centennial'. The flowers of 'POULdra' are larger and have longer sepal extensions than those of 'Morden Centennial'. 'POULdra' flowers have a strong, fruit tropicana fragrance while those of 'Morden Centennial' have a weak unpleasant fragrance.*

Description: 'POULdra' is a large, hybrid shrub rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have very strong intensity of reddish-brown anthocyanin colouration. 'POULdra' has a sparse number of short prickles on the stem which are linear (needle-shaped) to deeply concave in shape. There are an average number of long prickles on the stem. The prickles are greenish-brown in colour. The leaves are dark green in colour with strong glossiness. There are five to seven leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a leathery texture. The base is rounded in shape.

'POULdra' flowers early and almost continuously for 1 to 4 weeks. There is a low number of flowers per shoot. The flower pedicels have a low to moderate number of hairs or prickles. The flower bud is pointed to ovoid in shape and sepal extensions are strong to very strong. The fully opened flowers are rounded to irregularly rounded in shape when viewed from above and flattened convex on the upper and lower parts when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is double. 'POULdra' has deep, dark pink flowers. The flower petals have small spots at the base of the outer side and medium sized spots at the base on the inner side. The petal margin has weak reflexing and weak undulation. The stamen has a yellow filament. The style is long, white in colour with purplish-red on the upper quarter, has medium to strong hairiness on the upper half and is positioned at the same level and above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flowers have a strong, fruit tropicana fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULdra' resulted from a controlled cross of an unnamed seedling and 'Margaret Merril', made in 1988 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULdra' were conducted at Enderlein Nurseries in Lisle, Ontario in 2001. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 6 measurements.

Table 28: Comparison table for 'POULdra'

	'POULDRA'	'MORDEN CENTENNIAL'*
Leaf length (mm)		
mean	139.2	149.2
std. deviation	9.3	7.8
range	125-150	135-160
Leaf width (mm)		
mean	101.6	110.0
std. deviation	7.45	7.6
range	90-110	100-120

Terminal leaflet width (mm)		
mean	58.1	42.0
std. deviation	2.03	2.51
range	55-60	38-45
Sepal length (including extensions) (mm)		
mean	36.5	26.8
std. deviation	2.56	2.03
range	32-40	24-30
Flower diameter (mm)		
mean	90.8	77.5
std. deviation	3.43	4.78
range	85-95	70-85
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	57B	54A
upper surface	57B	63A
lower surface	57B	60D
Overall flower colour (RHS)		
	67B	54A to 58B
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	66A to 66B	54A to 58B
middle zone	66A to 66B	54A to 58B
base	7A	1D
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	66B	54A to 58B
middle zone	66A	54A to 58B
base	7A	1D

* reference variety

Proposed denomination: **'POULtry'**
Trade name: Redwood
Application number: 98-1275
Application date: 1998/03/11
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'Hans Christian Andersen'

Summary: *The young shoots of 'POULtry' have strong intensity of purple anthocyanin colouration while those of 'Hans Christian Andersen' have very strong intensity of reddish-brown to purple anthocyanin. 'POULtry' has shorter, glossier and thicker leaves than 'Hans Christian Andersen'. 'POULtry' has globular shaped flower buds while those of 'Hans Christian Andersen' are ovoid shaped. The flower type for 'POULtry' is very double while it is semi-double to double for 'Hans Christian Andersen'. 'POULtry' flowers have no fragrance while those of 'Hans Christian Andersen' have a weak tea fragrance.*

Description: 'POULtry' is a hybrid rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have strong intensity of purple anthocyanin colouration. 'POULtry' has a sparse number of deep concave shaped, short prickles on the stem. There is an average number of long prickles on the stem. The prickles are greenish-brown in colour. The leaves are dark green in colour with medium glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a leathery texture. The base is rounded in shape.

'POULtry' flowers early to mid-season and almost continuously for 6 to 10 weeks. There is a moderate number of flowers per shoot. The flower pedicels have a high number of hairs or prickles. The flower bud is globular in shape and sepal extensions are weak to medium. The fully opened flowers are round in shape when viewed from above, flattened convex to convex on the upper part when viewed from the side and concave on the lower part when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is very double. 'POULtry' has bright red flowers. The flower petals have very small to small greenish white spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has weak reflexing and weak undulation. The stamen has a yellow filament. The style is long, white in colour, has intermediate between weak and strong hairs and is positioned above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flowers have no fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULtry' resulted from a cross of two unnamed seedlings, made in 1986 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULtry' were conducted at Enderlein Nurseries in Lisle, Ontario in 2001. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 6 measurements.

Table 29: Comparison table for 'POULtry'

	'POULTRY'	'HANS CHRISTIAN ANDERSEN'*
Leaf length (mm)		
mean	115.0	127.5
std. deviation	8.2	6.3
range	100-125	120-135
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	53A	53A to 60A
upper surface	53A	46A
lower surface	53A	60A
Overall flower colour (RHS)	46A	46A
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	53A	53A
middle zone	53A	53A
base	1D	156A
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	46A	46A
middle zone	46A	46A
base	1D	156A

* reference variety

Proposed denomination: **'POULriber'**
Trade name: Grand Canyon
Application number: 98-1280
Application date: 1998/03/20
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'Sexy Rexy'

Summary: *The prickles and thorns on 'POULriber' are light reddish brown while they are nearly white for 'Sexy Rexy'. 'POULriber' has longer leaves and terminal leaflets than 'Sexy Rexy'. The bright, salmon-pink coloured flowers of 'POULriber' are larger and have longer sepal extensions than the light salmon-pink flowers of 'Sexy Rexy'. The flower type for 'POULriber' is double while it is very double for 'Sexy Rexy'. 'POULriber' produces flowers with larger petals than those of 'Sexy Rexy'.*

Description: 'POULriber' is a floribunda rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have a weak intensity of bronze to reddish-brown anthocyanin colouration. 'POULriber' has a sparse number of deep concave shaped, short prickles on the stem. There are a sparse to average number of long prickles on the stem. The prickles are light reddish-brown in colour. The leaves are medium green in colour with moderate glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a leathery texture. The base is obtuse to rounded in shape.

'POULriber' flowers mid-season and almost continuously for 6 to 10 weeks. There is a moderate number of flowers per shoot. The flower pedicels have a moderate number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are weak. The fully opened flowers are rounded in shape when viewed from above and flattened convex on the upper part when viewed from the side and concave on the lower part when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is double. 'POULriber' has bright salmon-pink flowers. The flower petals have small to medium sized spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has weak reflexing and moderate undulation. The stamen has a yellow filament. The style is medium in length, greenish-white in colour, has no hairs on the upper half and is positioned above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flowers have weak to moderate, fruit tropicana fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULriber' resulted from a cross of an unnamed seedling and 'Macrexy', made in 1988 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULriber' were conducted at Enderlein Nurseries in Lisle, Ontario in 2001. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 6 measurements.

Table 30: Comparison table for 'POULriber'

	'POULRIBER'	'SEXY REXY'*
Leaf length (mm)		
mean	115.8	108.0
std. deviation	4.48	8.10
range	110-120	95-118

Terminal leaflet length (mm)		
mean	54.6	42.1
std. deviation	5.5	2.3
range	45-60	40-46
Sepal length (including extensions) (mm)		
mean	30.2	21.5
std. deviation	2.3	2.1
range	28-35	18-25
Flower diameter (mm)		
mean	79.1	57.0
std. deviation	3.4	4.1
range	75-85	50-62
Petal length (mm)		
mean	38.3	25.3
std. deviation	2.6	1.8
range	35-42	22-28
Petal width (mm)		
mean	34.3	22.6
std. deviation	3.7	4.2
range	28-40	16-29
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	40A to 41A	38A
upper surface	41B	38B
lower surface	41B to 41C	38B
Overall flower colour (RHS)		
	40B to 40C	38B to 38C
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	43C	38C
middle zone	43C	38C
base	4B	1C
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	40C	38B
middle zone	40C	38B
base	4B	1C

* reference variety

Proposed denomination: **'POULsyng'** (see figure 26)
Tradename: Clair Renaissance®
Application number: 98-1281
Application date: 1998/03/20
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULman' and 'Queen Elizabeth'

Summary: *'POULsyng' has weaker anthocyanin on the young shoot than the reference varieties. 'POULsyng' has smaller leaves than the reference varieties. 'POULsyng' has very double flowers while 'POULman' has double flowers. 'POULsyng' has apricot coloured flowers while 'POULman' has red flowers and 'Queen Elizabeth' has darker pink flowers.*

Description: 'POULsyng' is an upright to bushy, bedding rose variety. The young shoot has weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stems have a sparse number of short prickles and sparse to medium number of long prickles which are concave in shape. The prickles and thorns are reddish-brown in colour at the base and green above. The leaves are light to medium green in colour and have weak glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is rounded in shape.

'POULsyng' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a medium number of flowers per shoot. The flower pedicel has a medium number of hairs or prickles and the flower bud is ovoid to globular in shape. Sepal extensions are weak. The flowers are round in shape when viewed from above, flat to flattened convex on the upper part when viewed from the side and flattened convex on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is very double. 'POULsyng' has light pink flowers. The petals have small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has weak reflexing and weak to medium undulation. The stamen filament is reddish-purple with some greenish-yellow colouration. The style is long, white and purple in colour and has medium pubescence on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium to large in size, funnel shaped and has no prickles. 'POULsyng' has a strong to very strong fruit Tropicana fragrance.

Origin and Breeding: 'POULsyng' resulted from the controlled cross between an unnamed seedling and 'Radox Bouquet', made in 1989 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULsyng' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 31: Comparison table for 'POULsyng'

	'POULSYNG'	'POULMAN'*	'QUEEN ELIZABETH'*
Leaf length (mm)			
mean	125.0	142.8	132.5
std. deviation	5.17	8.28	6.89
number measured	6	6	6
Leaf width (mm)			
mean	91.43	116.0	119.16
std. deviation	4.11	6.3	7.35
number measured	6	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	27A-19B	46A	55A
upper surface	27A-19B	46A	55B
lower surface	27A	46A	55B
Overall flower colour (RHS)	27A-19B	53A	55B-C
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	27A	53C	55C
middle zone	27B/C	53C	55B
base	4B	4A	1D
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	27A	53B	55C
middle zone	27B/C	53B	55B
base	9A	4A	1D

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULna'** (see figure 27)
Tradename: Helena Renaissance®
Application number: 98-1282
Application date: 1998/03/20
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark

Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Queen Elizabeth' and 'POULari'

Summary: *'POULna' has weaker anthocyanin colouration on the young shoot than the reference varieties. 'POULna' has more flowers per flowering shoot than the reference varieties. 'POULna' has white flowers while 'Queen Elizabeth' has pink flowers. 'POULna' has white style colour while 'Queen Elizabeth' has green and purple styles and 'POULari' has yellow-green styles.*

Description: 'POULna' is a large shrub rose which has an upright growth habit. The young shoot has weak to medium anthocyanin colouration which is bronze in colour. The stems have a sparse number of short and long prickles which are concave in shape. The prickles and thorns are pinkish-green in colour. The leaves are light to medium green in colour and have medium glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is rounded-ovate in shape.

'POULna' flowers early to mid-season and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a medium number of flowers per shoot. The flower pedicel has a medium to high number of stipitate glands and white hairs. The flower bud is ovoid to globular in shape. Sepal extensions are weak. The flowers are round in shape when viewed from above, convex on the upper part when viewed from the side and convex on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is very double. 'POULna' has white flowers. The petals have small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has strong reflexing and weak to medium undulation. The stamen filament is white in colour. The style is medium in length, white in colour and has medium pubescence on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. 'POULna' has a very strong floral fragrance.

Origin and Breeding: 'POULna' resulted from the controlled cross between 'Margaret Merril' and an unnamed seedlings, made in 1989 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULna' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 32: Comparison table for 'POULrim'

	'POULRIM'	'QUEEN ELIZABETH'*	'POULJILL'*
Leaf length (mm)			
mean	142.5	132.5	123.6
std. deviation	15.08	6.89	11.9
number measured	6	6	6
Leaf width (mm)			
mean	110.83	119.16	119.50
std. deviation	12.8	7.35	13.1
number measured	6	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	158D	55A	155A
upper surface	155D	55B	155B
lower surface	155D	55B	157A
Overall flower colour (RHS)	155D with 56D centre	55B-C	155B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	56D	55C	155C
middle zone	155D	55B	155C
base	1D	1D	1C
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	56D	55C	155B
middle zone	155D	55B	155B
base	1D	1D	1D

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULrim'** (see figure 28)
Tradename: Flora Danica
Application number: 98-1289
Application date: 1998/03/27
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Morcau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULjill' and 'POULman'

Summary: *'POULrim' has stronger anthocyanin in the young shoot that the reference varieties. 'POULrim' has smaller leaves than 'POULman' and darker leaves than the reference varieties. 'POULrim' has larger flowers than 'POULjill'. 'POULrim' has apricot coloured flowers while 'POULjill' has yellow flowers and 'POULman' has red flowers.*

Description: 'POULrim' is a hybrid tea rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very strong anthocyanin colouration which is bronze in colour. The stems have an average number of short and long prickles which are linear and concave in shape. The prickles and thorns are pinkish-red with green colouration. The leaves are dark green in colour and have medium glossiness. There are five leaflets present with up to seven leaflets present on the lower part of the plant and three leaflets on the upper part. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is rounded in shape.

'POULrim' flowers early and flowers almost continuously for six to more than ten weeks. There are a medium number of flowers per shoot. The flower pedicel has a low to medium number of prickles and the flower bud is ovoid in shape. Sepal extensions are absent to very weak. The flowers are round in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and flattened convex to convex on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is double. 'POULrim' has apricot coloured flowers. The petals have small spots at the base of the outer side and large spots at the base of the inner side. The petal margin has medium reflexing and weak to medium undulation. The stamen filament is yellow in colour. The style is medium to long in length, reddish-purple in colour near the top and white near the base and has medium to dense pubescence on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium to large in size, urn shaped and has no prickles. 'POULrim' has a weak to medium light floral to fruit Tropicana fragrance.

Origin and Breeding: 'POULrim' resulted from the controlled cross between two unnamed seedlings, made in 1988 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULrim' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 33: Comparison table for 'POULrim'

	'POULRIM'	'POULJILL'*	'POULMAN'*
Leaf length (mm)			
mean	128.6	116.6	142.9
std. deviation	12.6	10.8	8.28
number measured	10	6	6
Leaf width (mm)			
mean	103.6	78.3	116.0
std. deviation	8.8	9.3	6.3
number measured	10	6	6
Flower diameter (cm)			
mean	102.50	74.16	93.50
std. deviation	5.59	5.84	4.37
number measured	10	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	25B-D	9C	46A
upper surface	25A	9A	46A
lower surface	22C	9B	46A
Overall flower colour (RHS)			
	30B-31B	9B-C	53A
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	22B	9C	53C
middle zone	22B	9B-C	53C
base	9A	-	4A
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	25B	9C	53B
middle zone	25A	9B	53B
base	4A	-	4A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULfiry'** (see figure 29)
Tradename: Fiery Hill
Application number: 98-1291
Application date: 1998/03/27
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULmo' and 'POULsnows'

Summary: *'POULfiry' has weaker anthocyanin in the young shoot than 'POULmo'. 'POULfiry' has smaller leaves than 'POULsnows'. 'POULfiry' has reddish-orange flowers while 'POULmo' has red flowers and 'POULsnows' has white flowers.*

Description: 'POULfiry' is a miniature rose variety which has a bushy growth habit. The young shoot has weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stems have a sparse number of short and long prickles which are linear and concave in shape. The prickles and thorns are reddish-brown in colour. The leaves are medium green in colour and have medium glossiness. There are five to seven leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is obtuse in shape.

'POULfiry' flowers early and flowers almost continuously for six to ten weeks. There are a medium number of flowers per shoot. The flower pedicel has a low to medium number of prickles and the flower bud is ovoid in shape. Sepal extensions are weak to medium. The flowers are irregularly rounded to star shaped when viewed from above, convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is double. 'POULfiry' has reddish-orange coloured flowers. The petals have small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has medium to strong reflexing and no undulation. The stamen filament is yellow in colour. The style is long in length, yellow-green in colour and has weak pubescence on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, pitcher shaped and has no prickles. 'POULfiry' has no fragrance.

Origin and Breeding: 'POULfiry' resulted from the controlled cross between two unnamed seedlings, made in 1990 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULfiry' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 34: Comparison table for 'POULfiry'

	'POULFIRY'	'POULMO'*	'POULSNOWS'*
Leaf length (mm)			
mean	84.16	95.0	100.83
std. deviation	13.49	10.95	7.36
number measured	6	6	6

Leaf width (mm)			
mean	54.50	48.33	64.83
std. deviation	6.52	9.42	9.15
number measured	6	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	41A/B	46A-60B	155B
upper surface	41A/B	46A-53A	159C
lower surface	41A/B	46A-60B	155B
Overall flower colour (RHS)			
	40B/C	46A	155B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	41C	60B/46A	155B
middle zone	41C	60B/46A	155B
base	22B	155A	149C
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	40C	46A/53B	155B
middle zone	40C	46A/53A	159C
base	22A	155A	149D

° reference varieties

Proposed denomination: **'POULweeto'**
Trade name: Monticello
Application number: 98-1294
Application date: 1998/03/27
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Morden Centennial' and 'POULdava' (see table 23 on page 37)

Summary: *Growth habit for 'POULweeto' is spreading to trailing while that of 'Morden Centennial' is upright to bushy. 'POULweeto' has a sparse number of short prickles on its' stems while 'POULdava' has many short prickles on its' stems. 'POULweeto' has smaller leaves, terminal leaflets and flowers than the reference varieties. Petal size for 'POULweeto' is smaller than for 'Morden Centennial'. The flowers of 'POULweeto' are deep pink coloured fading to light pink while 'POULdava' has flowers that are light salmon-pink coloured and 'Morden Centennial' has bluish rose coloured flowers.*

Description: 'POULweeto' is a small shrub rose which has a spreading to trailing growth habit. The young shoots have a weak intensity of reddish-brown anthocyanin colouration. 'POULweeto' has a sparse number of linear (needle-shaped) to deep concave shaped, short prickles on the stem. There are a sparse to average number of long prickles on the stem. The prickles are reddish-brown to tan in colour. The leaves are medium green in colour with weak to moderate glossiness. There are five to seven leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a thin, flexible texture. The base is obtuse in shape.

'POULweeto' flowers early to mid-season and almost continuously for more than 10 weeks. There is a very high number of flowers per shoot. The flower pedicels have a moderate number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are intermediate between weak and strong. The fully opened flowers are round in shape when viewed from above, flattened-convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower part when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is semi-double. 'POULweeto' has deep pink coloured flowers fading to light pink. The flower petals have small spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has weak reflexing and weak undulation. The stamen has a yellow filament. The style is long, white in colour, has no to very weak hairs on the upper half and is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is small in size, funnel shaped and has no prickles. The flowers have a very weak, tea fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULweeto' resulted from a cross of two unnamed seedlings, made in 1992 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULweeto' were conducted at Enderlein Nurseries in Lisle, Ontario in 2001. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 6 measurements.

Proposed denomination: **'POULtika'** (see figure 30)
Tradename: Northern Lights
Application number: 98-1297
Application date: 1998/03/27
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Queen Elizabeth' and 'POULsyng'

Summary: *'POULtika' has smaller leaves than the reference varieties. 'POULtika' has pale pink flowers while 'Queen Elizabeth' has darker pink flowers and 'POULsyng' has apricot coloured flowers.*

Description: 'POULtika' is a large shrub rose which has a bushy growth habit. The young shoot has medium anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stems have a sparse number of short and long prickles which are concave in shape. The prickles and thorns are reddish-brown in colour. The leaves are dark green in colour and have medium glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflet has a serrate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is obtuse in shape.

'POULtika' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a low number of flowers per shoot. The flower pedicel has a low number of stipitate glands and white hairs. The flower bud is pointed to ovoid in shape. Sepal extensions are weak. The flowers are round in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla type is double. 'POULtika' has pink flowers. The petals have very small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has weak reflexing and undulation. The stamen filament is yellow in colour. The style is medium in length, pale yellow with some reddish colouration and has sparse pubescence on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, pitcher shaped and has no prickles. 'POULtika' has a weak fruit Tropicana fragrance.

Origin and Breeding: 'POULtika' resulted from the controlled cross between an unnamed seedling and 'Kordes Brilliant', made in 1987 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULtika' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 35: Comparison table for 'POULtika'

	'POULTIKA'	'QUEEN ELIZABETH'*	'POULSYNG'*
Leaf length (mm)			
mean	85.4	132.5	125.0
std. deviation	6.98	6.89	5.17
number measured	6	6	6
Leaf width (mm)			
mean	61.4	119.16	91.42
std. deviation	5.02	7.35	4.11
number measured	6	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	65B	55A	27A-19B
upper surface	65B	55B	27A-19B
lower surface	65A/B	55B	27A
Overall flower colour (RHS)	65B-C	55B-C	27A-19B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	65A	55C	27A
middle zone	65A	55B	27B/C
base	155C spot of 1D	1D	4A
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	65B	55C	27A
middle zone	65C	55B	27B/C
base	155C spot of 1D	1D	4A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULnorm'** (see figure 31)
Tradename: That's Jazz
Application number: 98-1302
Application date: 1998/03/27
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULman'

Summary: *'POULnorm' has a more upright growth habit*

than 'POULman'. 'POULnorm' has smaller leaves than 'POULman'. 'POULnorm' has very double flowers while 'POULman' has double flowers. 'POULnorm' has lighter red flower colour than 'POULman'.

Description: 'POULnorm' is a climbing rose variety. The young shoot has medium anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stems have an sparse number of short and long prickles which are deeply concave to concave in shape. The prickles and thorns are greyish-orange in colour. The leaves are medium green in colour and have medium to strong glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflet has a dentate margin and leathery texture. The base of the terminal leaflet is rounded in shape.

'POULnorm' flowers mid-season and flowers almost continuously for six to more than ten weeks. There are a medium number of flowers per shoot. The flower pedicel has a medium number of prickles and the flower bud is ovoid in shape. Sepal extensions are medium. The flowers are irregularly rounded in shape when viewed from above, flat to flattened convex on the upper part when viewed from the side and concave on the lower surface when viewed from the side. The flower center is infold and the corolla type is very double. 'POULnorm' has red coloured flowers. The petals have very small spots at the base of the outer and inner side. The petal margin has weak reflexing and undulation. The stamen filament is yellow in colour. The style is medium in length, yellowish-green in colour and has sparse pubescence on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, pitcher shaped and has no prickles. 'POULnorm' has a medium fruit Tropicana to spicy fragrance.

Origin and Breeding: 'POULnorm' resulted from the controlled cross between an unnamed seedling and 'Norita', made in 1985 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULnorm' were conducted at Valderose Gardens in Paincourt, Ontario in 1999. There were a minimum of five plants per variety grown in field conditions.

Table 36: Comparison table for 'POULnorm'

	'POULNORM'	'POULMAN'*
Leaf length (mm)		
mean	119.8	142.8
std. deviation	7.35	8.28
number measured	6	6
Leaf width (mm)		
mean	94.6	116.0
std. deviation	5.5	6.3
number measured	6	6
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	60A	46A
upper surface	53A	46A
lower surface	60A	46A
Overall flower colour (RHS)		
	53A	*53A*
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	60A	53C
middle zone	60A	53C
base	3B	4A
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	53A	53B
middle zone	53A	53B
base	3D	4A

* reference variety

Proposed denomination: **'JACmered'**
Trade name: Crimson Knight
Application number: 98-1423
Application date: 1998/06/05
Applicant: Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULhappy'

Summary: *'JACmered' has larger leaves, larger terminal leaflets and larger flowers than 'POULhappy'. The flowers of 'JACmered' are darker red in colour than those of 'POULhappy'.*

Description: 'JACmered' is a miniature rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have weak intensity of reddish-brown anthocyanin colouration. 'JACmered' has an average number of linear (needle-shaped), short prickles on the stem. There are very few long prickles on the stem. The prickles are reddish-brown in colour. The leaves

are light green in colour with weak glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a thin, flexible texture. The base is rounded in shape.

'JACmered' flowers mid-season and almost continuously for 1 to 4 weeks. There is a moderate number of flowers per shoot. The flower pedicels have a low number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and the sepal extensions are intermediate between weak and strong. The flowers are round in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is double. 'JACmered' has red coloured flowers. The flower petals have medium sized spots at the base of the inner and outer sides. The petal margin has moderate reflexing and weak undulation. The stamens of 'JACmered' have a yellow filament. The style is long, yellow in colour, has medium hairiness on the upper half and is positioned above the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has prickles. The flowers have a very weak, tea fragrance.

Origin and Breeding History: 'JACmered' resulted from the controlled cross between two unnamed seedlings, made in 1994 in Somis, California. Seed was harvested and planted in 1994. JACmered was selected and propagated by cuttings in 1995.

Tests and Trials: Tests and trials for 'JACmered' were conducted at Burnaby Lake Greenhouses, Ltd., Surrey, British Columbia in 2001. They consisted of 6 to 10 plants per variety grown in 6" pots spaced 12" apart in a greenhouse. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 9 measurements.

Table 37: Comparison table for 'JACmered'

	'JACMERED'	'POULHAPPY'*
Leaf length (mm)		
mean	73	60
std. deviation	8	7
Leaf width (mm)		
mean	53	40
std. deviation	8	4
Terminal leaflet length (mm)		
mean	36	22
std. deviation	7	9
Terminal leaflet width (mm)		
mean	23	15
std. deviation	3	3
Flower diameter (mm)		
mean	47	35
std. deviation	3	3
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	53A	45B
upper surface	53A	45B
lower surface	53A	45B
Overall flower colour (RHS)	53A	45B
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	53B	45C
middle zone	53B	45C
base	150D	1D
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	53A	45B
middle zone	53A	45B
base	150D	1D

* reference variety

Proposed denomination: **'JACquest'**
Trade name: Rudolf
Application number: 98-1426
Application date: 1998/06/05
Applicant: Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'KORfrauma'

Summary: *'JACquest' has no prickles on the stem while 'KORfrauma' has a sparse number of short prickles on the stem. The young stems of 'JACquest' have no anthocyanin colouration whereas those of 'KORfrauma' have weak, reddish-brown anthocyanin. 'JACquest' has smaller leaves than 'KORfrauma'. The flowers of 'JACquest' are deep red in colour while those of 'KORfrauma' are bright rose coloured.*

Description: 'JACquest' is a miniature rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have no anthocyanin colouration. 'JACquest' has no short and long prickles on the stem. The leaves are light green in colour with

weak glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a thin, flexible texture. The base is obtuse in shape.

'JACquest' flowers mid-season and almost continuously for 1 to 4 weeks. There is a moderate number of flowers per shoot. The flower pedicels have a moderate number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and the sepal extensions are strong. The flowers are round in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is double. 'JACquest' has deep red coloured flowers. The flower petals have small spots at the base of the inner and outer sides. The petal margin has weak reflexing and weak undulation. The stamens of 'JACquest' have a yellow filament. The style is medium in length, yellowish-green in colour, has weak hairiness on the upper half and is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have no fragrance.

Origin and Breeding History: 'JACquest' resulted from a cross between an unnamed seedling and POULvic, made in 1993. Seed was harvested and planted in 1994 in Somis, California. JACquest was selected and propagated in 1994.

Tests and Trials: Tests and trials for 'JACquest' were conducted at Burnaby Lake Greenhouses, Ltd., Surrey, British Columbia in 2001. They consisted of 6 to 10 plants per variety grown in 6" pots spaced 12" apart in a greenhouse. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 9 measurements.

Table 38: Comparison table for 'JACquest'

	'JACQUEST'	'KORFRAUMA'*
Leaf length (mm)		
mean	52	90
std. deviation	7	9
Leaf width (mm)		
mean	42	54
std. deviation	3	3
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	45B	57B
upper surface	45B	57B
lower surface	45D	57B
Overall flower colour (RHS)		
	45B	57B
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	45B	57B
middle zone	45B	57B
base	11B	11B
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	46B	57B
middle zone	46B	57B
base	10B	11C

* reference variety

Proposed denomination: **'JACpricl'**
Trade name: Snow Bunny
Application number: 98-1427
Application date: 1998/06/05
Applicant: Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'KORsailer'

Summary: *'JACpricl' has longer leaves than 'KORsailer'. The terminal leaflets for 'JACpricl' are larger than those of 'KORsailer'. 'JACpricl' has larger flowers with larger petals and longer sepals than 'KORsailer'.*

Description: 'JACpricl' is a miniature rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have a weak intensity of reddish-brown anthocyanin colouration. 'JACpricl' has a sparse number of linear (needle-shaped), short prickles on the stem. There are a sparse number of long prickles on the stem. The prickles are reddish-brown. The leaves are medium green in colour with weak glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a thin, flexible texture. The base is rounded in shape.

'JACpricl' flowers mid-season and almost continuously for 1 to 4 weeks. There is a moderate number of flowers per shoot. The flower pedicels have a low number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are intermediate between weak and strong. The flowers are round in shape when viewed from above and flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower

part when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is double. 'JACpricl' has white flowers. The flower petals have very small spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has medium reflexing and medium undulation. The stamen has a white filament. The style is intermediate between short and long, yellowish-green in colour, has weak hairiness of the upper half and is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is small in size, pitcher shaped and has prickles. The flowers have a weak, tea fragrance.

Origin and Breeding History: 'JACpricl' resulted from a cross between 'JACimin' and 'INTERprince', made in 1992 in Somis, California. Seeds were harvested and planted in 1992. From the resulting seedlings, 'JACpricl' was selected in 1993.

Tests and Trials: Tests and trials for 'JACpricl' were conducted at Burnaby Lake Greenhouse, Ltd., Surrey, British Columbia in 2001. They consisted of 6 to 10 plants per variety grown in 6" pots spaced 12" apart in a greenhouse. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 9 measurements.

Table 39: Comparison table for 'JACpricl'

	'JACPRICL'	'KORSAILER'*
Leaf length (mm)		
mean	85	59
std. deviation	3	6
Terminal leaflet length (mm)		
mean	40	35
std. deviation	3	3
Terminal leaflet width (mm)		
mean	22	17
std. deviation	3	2
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	155C	155B
upper surface	155C	155B
lower surface	155C	155B
Overall flower colour (RHS)		
	155C	155B
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	155C	155B
middle zone	155C	155B
base	1D	155B
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	155C	155B
middle zone	155C	155B
base	1D	155B

* reference variety

Proposed denomination: **'JACstrip'**
Trade name: Valentines Surprise
Application number: 98-1429
Application date: 1998/06/05
Applicant: Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULracos'

Summary: *'JACstrip' has longer sepals than 'POULracos'. Flower colour for 'JACstrip' is bi-colour deep rose and white while that for 'POULracos' is deep red.*

Description: 'JACstrip' is a miniature rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have no anthocyanin colouration. 'JACstrip' has a sparse number of linear (needle-shaped) short prickles on the stem. There are a sparse number of long prickles on the stem. The prickles are nearly white in colour. The leaves are light green in colour with weak glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a thin, flexible texture. The base is rounded in shape.

'JACstrip' flowers mid-season and almost continuously for 1 to 4 weeks. There is a moderate number of flowers per shoot. The flower pedicels have a low number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and the sepal extensions are intermediate between weak and strong. The flowers are round in shape when viewed from above and flat on the upper and lower parts when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is double. 'JACstrip' has bi-colour deep rose and white flowers. The flower petals have very small spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has weak reflexing and weak undulation. The stamen has a yellow filament. The style is intermediate between short and long, yellowish-green in colour, has weak hairiness on the upper half and is

positioned at the same level as the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has prickles. The flowers have a very weak, fruit tropicana fragrance.

Origin and Breeding History: 'JACstrip' resulted from a cross between an unnamed seedling and 'SAValife', made in 1993 in Somis, California. Seed was harvested and planted in 1993. From the resulting seedlings, 'JACstrip' was selected in 1994.

Tests and Trials: Tests and trials for 'JACstrip' were conducted at Burnaby Lake Greenhouses, Surrey, British Columbia in 2001. They consisted of 6 to 10 plants per variety grown in 6" pots spaced 12" apart in a greenhouse. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 9 measurements.

Table 40: Comparison table for 'JACstrip'

	'JACSTRIP'	'POULRACOS'*
Sepal length (including extensions) (mm)		
mean	35	17
std. deviation	3	2
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	53D	59C
upper surface	53D	59C
lower surface	53D	59C
Overall flower colour (RHS)	53D and 155D	59C
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	53C and 155D	59D
middle zone	53C and 155D	59D
base	1C	155D
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	53C and 155D	59C
middle zone	53C and 155D	59C
base	1D	155D

* reference variety

Proposed denomination: **'JACmello'**
Trade name: Yellow Nugget
Application number: 98-1431
Application date: 1998/06/05
Applicant: Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULpeacy'

Summary: *'JACmello' has more narrow leaves than 'POULpeacy'. The terminal leaflet of 'JACmello' is shorter than that of 'POULpeacy'. 'JACmello' produces very double yellow flowers with petal margins that are moderately reflexed and moderately undulating while the double flowers of 'POULpeacy' are a slightly darker yellow with petal margins that are weakly reflexed and weakly undulating.*

Description: 'JACmello' is a miniature rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have moderate intensity of reddish brown anthocyanin colouration. 'JACmello' has a sparse number of linear (needle-shaped) short prickles on the stem. There are a sparse number of long prickles on the stem. The prickles are yellow in colour. The leaves are medium green in colour with moderate glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins and a thin, flexible texture. The base is rounded in shaped.

'JACmello' flowers mid-season and almost continuously for 1 to 4 weeks. There is a low number of flowers per shoot. The flower pedicels have a low number of hairs or prickles. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are weak. The flowers are rounded in shape when viewed from above, flattened convex on the upper and lower parts when viewed from the side. The flower center is normal with floral parts visible on the open bloom. The corolla is very double. 'JACmello' has yellow flowers. The flower petals have no spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has moderate reflexing and moderate undulation. The stamen has a yellow filament. The style is intermediate between short and long, yellowish-green in colour, has intermediate between weak and strong hairs on the upper half and is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, pitcher shaped and has prickles. The flowers have a very weak tea fragrance.

Origin and Breeding History: 'JACmello' resulted from a cross between 'JACyim' and 'AROyumi', made in 1992. Seed was harvested and planted in 1992 in Somis, California. 'JACmello' was selected and propagated in 1993.

Tests and Trials: Tests and trials for 'JACmello' were conducted at Burnaby Lake Greenhouses in 2001. They

consisted of 6 to 10 plants per variety grown in 6" pots spaced 12" apart in a greenhouse. Unless otherwise indicated, measured characteristics were based on 9 measurements.

Table 41: Comparison table for 'JACmello'

	'JACMELLO'	'POULPEACY'*
Leaf width (mm)		
mean	43	53
std. deviation	5	3
Terminal leaflet length (mm)		
mean	25	35
std. deviation	5	3
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	150B	150A
upper surface	150B	150A
lower surface	150B	150A
Overall flower colour (RHS)	9A	12A
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	9A	12B
middle zone	9A	12B
base	9A	12B
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	9A	12A
middle zone	9A	12A
base	9A	12A

* reference variety

Proposed denomination: **'POULhilda'** (see figure 32)
Trade name: **Annette Hit®**
Application number: 98-1511
Application date: 1998/10/15
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Mr. Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULobe', 'POULarbso' 'POULpollo'

Summary: *'POULhilda' is a light pink, pot rose variety which produces large, very double flowers that do not fade as they age. The variety differs from the reference varieties in flower colour. The flowers of 'POULhilda' are similar in size to those of 'POULarbso' and 'POULpollo' but larger than those of 'POULobe'. 'POULhilda' has a larger entire leaf than any of the reference varieties.*

Description: 'POULhilda' is a pot rose variety with an upright to bushy growth habit. The margins of the leaflets, the leaf petioles and petiolules on the juvenile foliage have weak anthocyanin colouration that is reddish brown in hue. There is a sparse number of linear shaped, greyish orange coloured thorns on the stem and very few or no prickles on the pedicel. 'POULhilda' has five to seven leaflets, which are very weakly glossy. The terminal leaflet has serrate margins and is leathery in texture. The base of the terminal leaflet is rounded.

'POULhilda' flowers almost continuously and produces ovoid shaped, very light pink flower buds. Sepal extensions are moderate. When viewed from above, the fully opened flower is irregularly rounded. When viewed from the side the upper part of the flower is a flattened convex and the lower part is concave. The flower centre is slightly infolded. 'POULhilda' produces very double, light pink flowers. There is a small, whitish petal spot at the base of the inner and outer side of the petals. Reflexing of the petal margin is medium to strong and undulation is weak.

The filament of the outer stamen of 'POULhilda' is yellowish green. The style is also yellowish green and long, with the stigma well above the receptacle mouth and above the level of the anthers. The receptacle is small and pitcher shaped, with no prickles. The flowers of 'POULhilda' have no fragrance.

Origin and Breeding: 'POULhilda' originated from a cross made in Fredensborg, Denmark, in 1994, between unnamed seedlings. The seeds were planted in December 1994 and in the spring selections were made. 'POULhilda' is a selection of one seedling resulting from the hybridization.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULhilda' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in the spring of 2000. The trials consisted of six plants of each variety, planted in six inch pots. Measured characteristics were based on a minimum of ten measurements.

Table 42: Comparison table for 'POULhilda'

	'POUL HILDA'	'POUL OBE'*	'POUL ARBSO'*	'POUL POLLO'*
Length of entire leaf (mm)				
mean	89.4	77.5	67.6	78.6
std. deviation	12.2	6.65	8.1	4.2
Width of entire leaf (mm)				
mean	57.3	54.8	47.2	47.1
std. deviation	2.0	5.74	5.1	2.3
Flower diameter (mm)				
mean	40.7	33.5	45.4	45.7
std. deviation	3.57	4.18	3.85	2.68
Overall flower colour (RHS)				
49 C-D	46B	52D	26B to 24C	
Colour of outer side of petal (RHS)				
margin	49C	46C	48D	29A
middle zone	49C	57A	48D	29A
base	157A	155C	1C	3A
Colour of inner side of petal (RHS)				
margin	49D	46C	55C	24C
middle zone	49D	46C	55C	24C
base	157A	155C	1C	3A-6A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULsabel'** (see figure 33)
Trade name: **Isabel Hit®**
Application number: 98-1513
Application date: 1998/10/15
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Mr. Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULobe', 'POULhappy'

Summary: *'POULsabel' is a pot rose variety which produces red flowers that are larger in diameter and differ in colour from the flowers of the reference varieties. 'POULsabel' has double flowers which have fewer petals than 'POULobe' and slightly more petals than 'POULhappy'. 'POULsabel' also has a significantly larger entire leaf than either 'Poulobe' and 'POULhappy'.*

Description: 'POULsabel' is a pot rose variety with an upright to bushy growth habit. The margins and undersides of the leaflets on the juvenile foliage have weak anthocyanin colouration that is reddish brown in hue. There is a sparse number of linear shaped, light pink to reddish brown thorns on the stem and very few or no prickles on the pedicel. 'POULsabel' has five leaflets, which are strongly glossy. The terminal leaflet has serrate margins and is moderately leathery in texture. The base of the terminal leaflet is obtuse to rounded.

'POULsabel' flowers almost continuously and produces ovoid shaped, red flower buds. Sepal extensions are weak. When viewed from above, the fully opened flower is rounded. When viewed from the side the upper and lower parts of the flower are convex. The flower centre is normal. 'POULsabel' produces double, medium red flowers that fade to red purple as they age. There is a small, light yellow petal spot at the base of the inner and outer side of the petals. Reflexing of the petal margin is medium to strong and undulation is weak.

The filament of the outer stamen of 'POULsabel' is light yellow. The style is also yellowish green and long, with the stigma well above the receptacle mouth and at the same level as the anthers. The receptacle is small to medium sized and pitcher shaped, with no prickles. The flowers of 'POULsabel' have a weak fragrance that is floral to tropical in quality.

Origin and Breeding: 'POULsabel' originated from a cross made in Fredensborg, Denmark, in 1994, between unnamed seedlings. The seeds were planted in December 1994 and in the spring of 1995 selections were made. 'POULsabel' is a selection of one seedling resulting from the hybridization.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULsabel' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in the spring of 2000. The trials consisted of six plants of each variety, planted in six inch pots. Measured characteristics were based on a minimum of ten measurements.

Table 43: Comparison table for 'POULsabel'

	'POUL SABEL'	'POUL OBE'*	'POUL HAPPY'*
Length of entire leaf (mm)			
mean	110.3	77.5	69.3
std. deviation	9.69	6.65	2.83
Width of entire leaf (mm)			
mean	80.3	54.8	32.5
std. deviation	6.26	5.74	2.06

Flower diameter (mm)			
mean	50.2	33.5	36.9
std. deviation	2.82	4.18	1.30
Overall flower colour (RHS)			
53B - 53C	46B	40A - 42A	
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	61B	46C	45B
middle zone	61B	57A	45B
base	1D	155C	1C-12A
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	53B-57A	46C	40A-42A
middle zone	53B-57A	46C	40A-42A
base	1D	155C	1C-12A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULrent'** (see figure 34)
Trade name: **Laurent Hit***
Application number: 98-1514
Application date: 1998/10/15
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Mr. Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULobe', 'POULpeacy', 'POULsun'

Summary: *'POULrent' is a pot rose variety that produces lighter yellow flowers than the references 'POULpeacy' and 'POULsun'. The reference variety 'POULobe' has red flowers. 'POULrent' has larger flowers than all reference varieties and larger entire leaves than 'POULobe' and 'POULsun'.*

Description: 'POULrent' is a pot rose variety with a bushy growth habit. The young shoots have medium to strong anthocyanin colouration that is reddish brown in hue. There is a sparse to medium number of linear shaped, green-red thorns on the stem and very few or no prickles on the pedicel. 'POULrent' has five to seven leaflets, which are weakly to moderately glossy. The terminal leaflet has serrate margins and is thin in texture. The base of the terminal leaflet is obtuse.

'POULrent' flowers almost continuously and produces pointed, light yellow flower buds. Sepal extensions are weak. When viewed from above, the fully opened flower is irregularly rounded. When viewed from the side the upper part of the flower is flattened convex and the lower part is concave. The flower centre is normal. 'POULrent' produces double, medium yellow flowers. There is a small to medium sized, bright yellow petal spot at the base of the inner and outer side of the petals. Reflexing and undulation of the petal margin are weak to medium.

The filament of the outer stamen of 'POULrent' is yellow. The style is yellowish green and long, with the stigma well above the receptacle mouth and at the same level or above the anthers. The receptacle is medium sized and pitcher shaped, with no prickles. The flowers of 'POULrent' have a weak fragrance that is lightly floral in quality.

Origin and Breeding: 'POULrent' originated from a cross made in Fredensborg, Denmark, in 1995, between unnamed seedlings. The seeds were planted in December 1995 and in the spring of 1996 selections were made. 'POULrent' is a selection of one seedling resulting from the hybridization.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULrent' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in the spring of 2000. The trials consisted of six plants of each variety, planted in six inch pots. Measured characteristics were based on a minimum of ten measurements.

Table 44: Comparison table for 'POULrent'

	'POUL RENT'	'POUL OBE'*	'POUL PEACY'*	'POUL SUN'*
Length of entire leaf (mm)				
mean	82.9	77.5	100.9	77.7
std. deviation	5.2	6.65	7.7	3.68
Width of entire leaf (mm)				
mean	60.2	54.8	84.2	50.4
std. deviation	5.4	5.74	9.67	2.05
Flower diameter (mm)				
mean	56.0	33.5	47.4	37.8
std. deviation	5.88	4.18	4.95	5.38
Overall flower colour (RHS)				
6D	46B	12A-13B	12A	
Colour of outer side of petal (RHS)				
margin	3D	46C	12B	12A
middle zone	5C	57A	12B	12A
base	6B	155C	4B	12A

Colour of inner side of petal (RHS)				
margin	3D	46C	12B	12A
middle zone	5C	46C	12A-B	12A
base	6B	155C	-	12A

* reference varieties

Proposed denomination: '**POULpeacy**' (see figure 35)
Trade name: **Peace Palace®**
Application number: 98-1517
Application date: 1998/10/15
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Mr. Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULobe', 'POULymp', 'POULsun'

Summary: *'POULpeacy' is a yellow flowered pot rose variety whereas 'POULobe' has red flowers and 'POULymp' has apricot coloured flowers. 'POULpeacy' has larger entire leaves than 'POULsun' and a larger flower diameter. The petals of 'POULpeacy' are longer and wider than those of 'POULsun'.*

Description: 'POULpeacy' is a pot rose variety with an upright to bushy growth habit. The young shoots have weak to medium anthocyanin colouration that is reddish brown in hue. There is a sparse to medium number of linear shaped, pink thorns on the stem and very few or no prickles on the pedicel. 'POULpeacy' has generally five leaflets, which are moderately to strongly glossy. The terminal leaflet has serrate margins and is moderately thin in texture. The base of the terminal leaflet is obtuse to rounded.

'POULpeacy' flowers almost continuously and produces pointed to ovoid, bright yellow flower buds. Sepal extensions are weak to medium. When viewed from above, the fully opened flower is round. When viewed from the side the upper part of the flower is convex and the lower part is flattened convex. The flower centre is normal. 'POULpeacy' produces double, medium to deep yellow flowers. There is a small, light yellow petal spot at the base of the outer side of the petals and no basal spot on the inner side. Reflexing of the petal margin is medium to strong and undulation of the margin is very weak or absent.

The filament of the outer stamen of 'POULpeacy' is yellow-orange. The style is white and short, with the stigma just above the receptacle mouth and at the same level as the anthers. The receptacle is medium sized and pitcher shaped, with no prickles. The flowers of 'POULpeacy' have a weak fragrance that is tea to spicy in quality.

Origin and Breeding: 'POULpeacy' originated from a cross made in Fredensborg, Denmark, in 1995, between unnamed seedlings. The seeds were planted in December 1995 and in the spring of 1996 selections were made. 'POULpeacy' is a selection of one seedling resulting from the hybridization.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULpeacy' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in the spring of 2000. The trials consisted of six plants of each variety, planted in six inch pots. Measured characteristics were based on a minimum of ten measurements.

Table 45: Comparison table for 'POULpeacy'

	'POUL PEACY'	'POUL OBE'*	'POUL YMP'*	'POUL SUN'*
Length of entire leaf (mm)				
mean	100.9	77.5	93.5	77.7
std. deviation	7.7	6.65	10.44	3.68
Width of entire leaf (mm)				
mean	84.2	54.8	63.2	50.4
std. deviation	5.4	5.74	4.51	2.05
Flower diameter (mm)				
mean	47.4	33.5	59.9	37.8
std. deviation	4.95	4.18	3.91	5.38
Overall flower colour (RHS)				
	12A-13B	46B	22A and 24A	12A
Colour of outer side of petal (RHS)				
margin	12B	46C	31C	12A
middle zone	12B	57A	31C	12A
base	4B	155C	4C	12A
Colour of inner side of petal (RHS)				
margin	12B	46C	22A-B	12A
middle zone	12A-B	46C	22A-B	12A
base	-	155C	4B	12A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULbrez'** (see figure 36)
Trade name: Breeze Party®
Application number: 99-1755
Application date: 1999/08/10
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULfuna', 'POULhappy' and 'POULfio'

Summary: *The flowers of 'POULbrez' are a pink blend whereas they are deep pink in 'POULfuna', medium red in 'POULhappy' and medium pink in 'POULfio'. The plants of 'POULbrez' are micro in size whereas 'POULhappy' and 'POULfio' are miniature in size.*

Description: 'POULbrez' is a micro pot rose which has an upright to bushy growth habit. The young shoots have weak to medium, reddish brown anthocyanin colouration. 'POULbrez' has a sparse amount of short linear prickles on the stem. Long prickles on the stem are sparse. There are a limited number of nearly white stipitate glands on the pedicel. The leaves are medium to dark green with medium glossiness. There are five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins, a thin/flexible to leathery texture with a rounded base.

'POULbrez' flowers almost continuously for more than 10 weeks. There is a low number of flowers per shoot. There are few to a medium number of hairs or prickles on the flower pedicel. The flower bud is ovoid to globular in shape and sepal extensions are absent or very weak. The flowers are round when viewed from above, flattened convex to convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower centre is infold and the corolla is semi-double. The flowers of 'POULbrez' are a pink blend. The flower petals have small spots at the base of the outer side and small spots at the base of the inner side. The petal margin has medium reflexing and undulation of margins is absent to weak. The stamens of 'POULbrez' have a yellow filament. The red style is medium to long in length, has no hairiness on the upper half of the style and is level with the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have a fruit tropicana fragrance which is medium in strength.

Origin and Breeding History: 'POULbrez' resulted from the controlled cross between two unnamed seedlings, made in 1995 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULbrez' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in 2000. Measured characteristics were based on 10 measurements.

Table 46: Comparison table for 'POULbrez'

	'POULBREZ'	'POULFUNA'*	'POULHAPPY'*	'POULFIO'*
Leaf length (mm)				
mean	56.3	52.7	69.3	60.1
std. deviation	9.95	4.87	2.83	2.46
Leaf width (mm)				
mean	36.4	36.4	32.5	39.6
std. deviation	4.56	4.74	2.06	2.15
Flower diameter (mm)				
mean	45.5	29.1	36.9	36.4
std. deviation	3.4	1.04	1.30	1.80
Overall flower colour (RHS)	62C-D	57B-D	40A-42A	41B
Colour of outer side of petal (RHS)				
margin	62B	57C	45B	52B
middle zone	62B	57D	45B	52B
base	155C/157A	155B	1C-12A	1D
Colour of inner side of petal (RHS)				
margin	62C	57B	40A-42A	41B
middle zone	63C-D	57B	40A-42A	41B
base	155C/157A	155B	1C-12A	7A

*reference variety

Proposed denomination: **'POULrolyt'** (see figure 37)
Trade name: Colour Hit®
Application number: 99-1759
Application date: 1999/08/10
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULsabel'

Summary: *The flowers of 'POULrolyt' are deep pink whereas the flowers of the reference variety, 'POULsabel', are a red blend. The leaves of 'POULrolyt' are smaller and less glossy than those of 'POULsabel'.*

Description: 'POULrolyt' is a miniature pot rose with an upright to bushy growth habit. The young shoots have very weak anthocyanin colouration. 'POULrolyt' has a sparse amount of short linear prickles on the stem. Long prickles on the stem and pedicel are sparse and nearly white. The leaves are dark green with weak to medium glossiness. There are three to seven leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins, a thin flexible texture with an obtuse shaped base.

'POULrolyt' flowers early and almost continuously for more than 10 weeks. There is a low number of flowers per shoot. There are hairs or prickles on the flower pedicel. The flower bud is ovoid and sepal extensions are absent or very weak. The flowers are irregularly rounded when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower centre is infolded to normal and the corolla is very double. The flowers of 'POULrolyt' are deep pink. The flower petals have very small to small spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has medium to strong reflexing and undulation of margins is weak to medium. The stamens of 'POULrolyt' have a white to yellow filament. The yellow green style is medium to long, has no hairiness on the upper half of the style and the stigma is level with or slightly above the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and

has prickles. The flowers have no fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULrolyt' resulted from the controlled cross between an unnamed seedling X 'POULhappy', made in 1995 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULrolyt' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in 2000. Measured characteristics were based on 10 measurements.

Table 47: Comparison table for 'POULrolyt'

	'POULROLYT'	'POULSABEL'*
Leaf length (mm)		
mean	78.4	106.0
std. deviation	7.54	8.37
Leaf width (mm)		
mean	52.0	76.0
std. deviation	6.63	8.96
Overall flower colour (RHS)	43A-B	46C
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	52A	57B
middle zone	52A	57B
base	155C/1C	155C/1C
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	43B	46C/57A
middle zone	43B-C	46C/57A
base	155C/1C	1C

* reference variety

Proposed denomination: **'POULrosit'** (see figure 38)
Trade name: Rosita Parade®
Application number: 99-1760
Application date: 1999/08/10
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULmist'

Summary: *The flowers of 'POULrosit' have fewer petals than those of the reference variety, 'POULmist'. The petals of 'POULrosit' are yellow with red orange margins whereas the petals of 'POULmist' are deep yellow.*

Description: 'POULrosit' is a miniature pot rose with an upright to bushy growth habit. The young shoots have medium intensity of reddish brown anthocyanin colouration. 'POULrosit' has a sparse amount of short linear prickles on the stem. Long prickles on the stem and pedicel are sparse and whitish with reddish brown intonations. The leaves are dark green with medium glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins, a thin/flexible texture with a rounded base.

'POULrosit' flowers early and almost continuously for more than 10 weeks. There is a low number of flowers per shoot. There are few hairs or prickles on the flower pedicel. The flower bud is globular and sepal extensions are weak to medium. The flowers are irregularly rounded when viewed from above, convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower surface when viewed from the side. The flower centre is infolded and the corolla is double. The flowers of 'POULrosit' are a yellow blend. There are no petal spots at the base of the flower petals of the outer and inner sides. The petal margin has weak to medium reflexing and undulation of margins is weak. The stamens of 'POULrosit' have a yellow filament. The yellow green style is short to medium in length, has no hairiness on the upper half of the style and the stigma is positioned below the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have no fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULrosit' originated from a naturally occurring mutation of the variety, 'POULgold', discovered in the spring, 1998 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULrosit' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in November, 2000. Measured characteristics were based on 10 measurements.

Table 48: Comparison table for 'POULrosit'

	'POULROSIT'	'POULMIST'*
Leaf length (mm)		
mean	65.5	68.1
std. deviation	6.62	6.88
Leaf width (mm)		
mean	44.7	52.3
std. deviation	5.40	5.31

Overall flower colour (RHS)	14A with 34A on margins	12A
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	34B	8A
middle zone	14A	8A
base	n/a	n/a
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	34B	8A
middle zone	14B	12A
base	n/a	n/a

* reference variety

Proposed denomination: **'POULnil'** (see figure 39)
Trade name: Pernille Hit®
Application number: 99-1765
Application date: 1999/08/17
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULymp'

Summary: *The flowers of 'POULnil' are an apricot blend with more pink tones than the reference variety, 'POULymp' which has more orange tones. The petals of 'POULnil' have less reflexing than those of 'POULymp'.*

Description: 'POULnil' is a miniature pot rose with an upright to bushy growth habit. The young shoots have weak reddish brown anthocyanin colouration. 'POULnil' has a sparse amount of short linear prickles on the underside of the petiole. Long prickles on the stem and pedicel are sparse and nearly white. The leaves are dark green with medium to strong glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins, a thin/flexible texture with a rounded base.

'POULnil' flowers early and almost continuously for more than 10 weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot with few to medium hairs or prickles on the flower pedicel. The flower bud is pointed with medium to strong sepal extensions. The flowers are irregularly rounded when viewed from above, flattened convex to convex on the upper part when viewed from the side and flattened convex on the lower surface when viewed from the side. The flower centre is infolded and the corolla is double. The flowers of 'POULnil' are an apricot blend. The flower petals have very small to medium sized spots at the base of the outer and inner sides. The petal margin has weak reflexing and undulation of margins. The stamens of 'POULnil' have a yellow filament. The yellow green style is medium in length, has weak hairiness on the upper half of the style and is level with the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have a weak, musty fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULnil' resulted from the controlled cross between an unnamed seedling X unnamed seedling, made in 1995 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULnil' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in November, 2000. Measured characteristics were based on 10 measurements.

Table 49: Comparison table for 'POULnil'

	'POULNIL'	'POULYMP'*
Overall flower colour (RHS)	29A-C	32B-C and 24C-D
Colour of outer side of petal (RHS)		
margin	35B-C	29B
middle zone	35B-C	29C
base	13B	13D
Colour of inner side of petal (RHS)		
margin	19B	13B
middle zone	22D	13B
base	13B	n/a

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULra012'** (see figure 40)
Trade name: Carmen Parade®
Application number: 00-2340
Application date: 2000/07/06
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULhappy', 'POULra007'

Summary: *'POULra012' is a pot rose variety which has more anthocyanin colouration in the young shoots than the plants of either reference variety. The flowers of 'POULra012' have fewer petals than 'POULra007' and the petals are larger than those of both references. The style of 'POULra012' is white with some red colouration just below the stigma, whereas the style of 'POULhappy' is yellow-green and the style of 'POULra007' is light green.*

Description: 'POULra012' is a miniature pot rose with an upright to bushy growth habit. The young shoots have moderate reddish brown anthocyanin colouration. 'POULra012' has a sparse amount of short linear prickles on the stem. Long prickles on the stem and pedicel are sparse and reddish brown. The leaves are dark green with weak glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins, are thin/flexible in texture with a rounded base.

'POULra012' flowers early and almost continuously for more than 10 weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot. There are medium to many hairs or prickles on the flower pedicel. The flower bud is pointed with medium sepal extensions. The flowers are irregularly rounded when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and concave to flat on the lower surface when viewed from the side. The flower centre is normal and the corolla is double. The flowers of 'POULra012' are red. The flowers have small white spots at the base of the outer and inner side of the petals. The petal margin has strong reflexing and undulation of margins is weak. The stamens of 'POULra012' have a yellow filament. The style is white with some red below the stigma and it is medium to long, with medium to strong hairiness on the upper half of the style. The stigma is located above the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have no fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULra012' resulted from the controlled cross between an 'POULsint' and an unnamed seedling, made in 1996 in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra012' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in November, 2000. Measured characteristics were based on 10 measurements.

Table 50: Comparison table for 'POULra012'

	'POUL RA012'	'POUL HAPPY'*	'POUL RA007'*
Leaf length (mm)			
mean	78.3	69.3	73.8
std. deviation	8.57	2.83	4.45
Leaf width (mm)			
mean	58.0	32.5	52.1
std. deviation	5.92	2.06	5.22
Petal length (mm)			
mean	19.1	14.6	17.5
std. deviation	1.51	0.92	2.25
Petal width (mm)			
mean	19.8	12.8	13.6
std. deviation	1.99	1.6	1.56
Overall flower colour (RHS)	46B	40A-42A	46B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	46B	45B	46A
middle zone	46B	45B	46A
base	155C/1C	1C-12A	155C/157D
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	46B-C	40A-42A	46B
middle zone	46B-C	40A-42A	46B
base	155C/1C	1C-12A	155C/157D

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULmona'** (see figure 41)
Trade name: Ramona Hit®
Application number: 00-2342
Application date: 2000/07/06
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'POULsabel', 'POULobe'

Summary: *'POULmona' is a pot rose variety which differs from the reference varieties in flower colour. 'POULmona' has*

deep pink flowers while 'POULsabel' and 'POULobe' have red flowers. 'POULmona' has significantly larger leaves and petals than 'POULobe'. 'POULmona' has semi-double flowers, whereas 'POULsabel' has double flowers and 'POULobe' has very double flowers.

Description: 'POULmona' is a miniature pot rose with an upright to bushy growth habit. The young shoots have weak reddish brown anthocyanin colouration. 'POULmona' has a sparse amount of short linear prickles on the stem. Long prickles on the stem and pedicel are sparse and yellowish white. The leaves are dark green with medium to strong glossiness. There are three to five leaflets present. The terminal leaflets have serrate margins, are leathery in texture and have a rounded base.

'POULmona' flowers early and almost continuously for more than 10 weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot. There are few hairs or prickles on the flower pedicel. The flower bud is pointed to ovoid with weak sepal extensions. The flowers are irregularly rounded when viewed from above, flattened convex to convex on the upper part when viewed from the side and convex on the lower surface when viewed from the side. The flower centre is infolded and the corolla is semi-double. The flowers of 'POULmona' are deep pink. The flowers have small to medium sized light yellow spots at the base of the outer and inner side of the petals. The petal margin has strong reflexing and undulation of margins is weak. The stamens of 'POULmona' have a yellowish green filament. The style is yellow-green and it is medium to long, with very weak hairiness on the upper half of the style. The stigma is located slightly above the anthers. The receptacle is small, pitcher shaped and has no prickles. The flowers have a very weak floral fragrance.

Origin and Breeding History: 'POULmona' resulted from a mutation of 'POULsabel' which was discovered in the spring/summer of 1998 in the greenhouse at Fredensborg, Denmark. Seed was planted in December 1998 and germinated during the winter and early spring. In 1999 the seedlings were selected.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULmona' were conducted at Aldershot Greenhouses, Burlington, Ontario in November, 2000. Measured characteristics were based on 10 measurements.

Table 51: Comparison table for 'POULmona'

	'POUL MONA'	'POUL SABEL'*	'POUL OBE'*
Leaf length (mm)			
mean	102.9	106.0	77.5
std. deviation	10.38	8.37	6.65
Leaf width (mm)			
mean	71.8	76.0	54.8
std. deviation	4.95	8.96	5.74
Petal length (mm)			
mean	30.8	28.0	16.4
std. deviation	1.83	4.56	1.62
Petal width (mm)			
mean	36.4	31.3	12.2
std. deviation	4.43	4.60	1.47
Overall flower colour (RHS)	55A	46C	46B
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	68A	57B	46C
middle zone	55B-C	57B	57A
base	155C/1C	155C/1C	155C/1C
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	68A	46C/57A	46C
middle zone	55A-C	46C	46C
base	155C/1C	1C	155C/1C

* reference varieties

SOYBEAN
(*Glycine max* L. Merrill)

Proposed denomination: **'Starburst'**
Previously proposed denomination **'T9532'**
Application number: 97-1150
Application date: 1997/09/16
Applicant: Hyland Seeds, Blenheim, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'RCAT Angora', 'RCAT Calico', 9305 and 'Dominator'

Summary: *'Starburst' has denser pubescence than 'Dominator'. 'Starburst' has a less erect growth habit than 'RCAT Angora', '9305' and 'Dominator'. 'Starburst' has shorter plant height over two growing periods than '9305' and 'Dominator'. 'Starburst' matures earlier than 'RCAT Calico', '9305' and 'Dominator'. 'Starburst' has spherical flattened seed shape which is shinier than the spherical rounded seed of 'RCAT Angora'.*

Description: 'Starburst' is an indeterminate oilseed soybean variety which has a growth habit moderate between erect and prostrate. The hypocotyl is purple in colour. The leaves are medium green in colour with an intermediate texture. There are three leaflets and the terminal leaflet is ovate in shape and medium in size. The plant pubescence before flowering is dense and erect in habit. The flowers are purple and pubescence is grey in colour at maturity. Mature pods are brown in colour. The seed is yellow in colour and spherical flattened in shape. The seed coat has a moderately shiny luster. The hilum is yellow in colour and medium in size. The mature seed cotyledons are yellow.

Origin and Breeding History: 'Starburst' originated from the cross 'Dominator' x 'Elgin 87' made in 1988. Segregating populations were advanced using modified single seed descent to the F4 generation when a single plant was selected in 1991. Further selection was made until the F6 in 1993. Selection criteria included high yield, good standability, appealing plant type and seed type and low susceptibility to prevalent diseases.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Starburst' were conducted at Hyland Farms, near Ridgetown, Ontario in 1996 and 1997. The trials consisted of three replicated plots containing four rows, approximately three metres long.

Table 52: Comparison table for 'Starburst'

	'STARBURST'	'RCAT ANGORA'*	'RCAT CALICO'*	'9305'*	'DOMINATOR'*
Plant height (cm)					
mean	48.9	55.3	50.9	52.3	62.3
std. deviation	3.45	4.32	5.26	4.76	12.73
Seed weight (g/100 seed)	15.3	15.2	16.4	16.8	16.6
Days to maturity	118.3	117.5	120.0	120.3	121.0
Heat unit rating (HU)	3175	3150	3225	3250	3300
Protein content (%)	40.2	40.3	42.7	40.9	40.7
Oil content (%)	22.0	21.9	20.2	22.3	21.5

* reference varieties
Note: The data in this table originates from the 1996 trials.

Proposed denomination: **'RCAT Staples'**
Application number: 99-1647
Application date: 1999/04/26
Applicant: University of Guelph, Ridgetown College, Ridgetown, Ontario

Agent in Canada: SeCan Association, Nepean, Ontario

Varieties used for comparison: 'RCAT Columbus' and 'Hallmark'

Summary: *'RCAT Staples' has taller plant height than the*

reference varieties. 'RCAT Staples' has brown pod colour while 'RCAT Columbus' has tan pods. The hilum is dark brown for 'RCAT Staples' while it is black for 'RCAT Columbus'. 'RCAT Staples' has low seed coat peroxidase activity while the reference varieties have high activity.

Description: 'RCAT Staples' is an indeterminate oilseed soybean variety. The hypocotyl has anthocyanin present. The lateral leaflets are rounded ovate in shape. The flower colour is purple and plant pubescence is brown in colour. 'RCAT Staples' has brown pod colour. The ground colour of the seed testa is yellow and the hilum is dark brown. Seed coat peroxidase activity is low.

Origin and Breeding History: 'RCAT Staples' originated from the cross 9303 x T8508 made at Ridgetown College, University of Guelph, Ridgetown, Ontario in 1990. The variety was developed through the use of modified single seed descent breeding procedure facilitated through the use of a winter nursery in Belize, Central America. In 1993, a single progeny row was selected on the basis of maturity, lodging tolerance and pod load. This row identified as 90/101/3 was evaluated for agronomic performance for two years prior to entry into the official Ontario Soybean Variety trials as RCAT 9608 in 1996.

Tests and Trials: Tests and trials for 'RCAT Staples' were conducted at Ridgetown, Ontario in 1999 and 2000. In 1999, the trials consisted of six replicated plots containing five rows, approximately five metres long, spaced 43 cm apart. In 2000 the trials consisted of two replicated plots of similar dimensions.

Table 53: Comparison table for 'RCAT Staples'

	'RCAT STAPLES'	'RCAT COLUMBUS'*	'HALLMARK'*
Number of days to flowering			
	48	46	49
Plant height			
mean (cm)	105	99	99
std. deviation	3.9	5.2	4.7
no. measured	20	20	20
Days to maturity	128	127	128
Heat unit rating	3175	3175	3200

* reference varieties

Proposed denomination: **'S25-H5'** (see figure 42)
Application number: 00-2283
Application date: 2000/05/24
Applicant: Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, USA
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario

Varieties used for comparison: 'S24-L2'

Summary: *'S25-H5' has black hilum colour while 'S24-L2' has brown hilum colour. 'S25-H5' is moderately susceptible to Phytophthora rot while 'S24-L2' is resistant. 'S25-H5' is resistant to soybean cyst nematode, race 3 and moderately resistant to soybean cyst nematode, race 14 while 'S24-L2' is susceptible to both.*

Description: 'S25-H5' is an indeterminate oilseed soybean variety. The hypocotyl is purple in colour. The terminal leaflets are medium in size, ovate in shape and medium green in colour. The leaf texture is intermediate between smooth and wrinkled. The plant pubescence colour at mid-pod fill stage is tawny. The pubescence is normal in density and erect. The flowers of 'S25-H5' are purple in colour. Mature pod colour is tan. The seed shape is spherical rounded. The seed coat is yellow in colour and dull. The hilum is black in colour and medium in size. The abscission layer is normal and the cotyledon colour of mature seed is yellow.

'S25-H5' is moderately susceptible to Phytophthora rot (*Phytophthora megasperma* f. sp. *glycinea*, races 1-3, 6-9), is resistant to soybean cyst nematode (*Heterodera glycines*, race 3) and moderately resistant to soybean cyst nematode, race 14. 'S25-H5' has good resistance to shattering and lodging.

Origin and Breeding History: 'S25-H5' originated from a cross, made in Washington, Iowa, USA in 1991. The F2 to F5 generations were advanced using a modified single seed descent technique. Single plants from the F6 generation were harvested and threshed individually. The progeny of these single plants were evaluated in a plant row observation nursery in the summer of 1994. 'S25-H5', originally designated as J405808, was selected from this group.

Tests and Trials: Tests and trials for 'S25-H5' were conducted at Arva, Ontario in 2000 and 2001. The trials consisted of two replicated plots containing two rows, approximately 4.5 metres long.

VINCA
(*Vinca major* L.)

Proposed denomination: **'Wojo's Jem'** (see figure 43)
Application number: 00-2268
Application date: 2000/05/17
Applicant: Joseph Wojciechowski, Ortonville, Michigan, USA
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario

Varieties used for comparison: 'Maculata' and 'Variegata'

Summary: *'Wojo's Jem' has ivory coloured stems while 'Variegata' has medium green stems. 'Wojo's Jem' has weak stem anthocyanin while 'Variegata' has no anthocyanin. The stems of 'Wojo's Jem' have shorter internodes than the reference varieties. 'Wojo's Jem' has slightly larger leaves than the reference varieties. The main colour of the upper side of the leaf is ivory for 'Wojo's Jem' while it is light green for 'Maculata' and medium green for 'Variegata'. The secondary colour on the upper side of the leaf is dark green for 'Wojo's Jem' while it is light green for 'Maculata' and white for 'Variegata'.*

Description: 'Wojo's Jem' has a pendulous growth habit and sparse branching. The stems are ivory in colour and have weak anthocyanin colouration. The stems have no glaucosity or pubescence. The stems are small to medium in diameter and smooth.

The leaves are opposite in arrangement and simple. 'Wojo's Jem' has an ovate shaped leaf with an obtuse apex, truncate base and entire margin. The leaf blade is variegated. The main colour on the upper side is ivory and the secondary colour is dark green. The secondary colour is located on the margin and covers a medium to large area. There is a petiole present.

Origin and Breeding: 'Wojo's Jem' originated as a naturally occurring sport of *Vinca major* 'Maculata', which was discovered and selected in 1996. This work was conducted by Joseph Wojciechowski in Ortonville, Michigan USA. The new variety was selected on the basis on its unique variegated foliage.

Tests and Trials: Trials for 'Wojo's Jem' were conducted at Oxford Station, Ontario in 2000. The trials consisted of ten plants per variety grown outdoors. Measured characteristics were based on ten measurements.

Table 54: Comparison table for 'Wojo's Jem'

	WOJO'S JEM	'MACULATA'*	'VARIEGATA'*
Internode length (cm)			
mean	7.25	9.00	12.33
std. deviation	0.82	0.71	0.61
Leaf blade length (cm)			
mean	4.29	3.81	3.67
std. deviation	0.49	0.46	0.52
Leaf blade width (cm)			
mean	3.42	2.57	3.21
std. deviation	0.38	0.35	0.39
Main colour of upper side of leaf blade (RHS)	4C/D	144C	146B
Secondary colour of upper side of leaf blade (RHS)	147A	146B	145D

* reference varieties

4. APPLICATIONS ABANDONED

BEAN
(*Phaseolus vulgaris* L.)

➤ **Applicant:** Peas & Beans Ltd., Girton Cambridgshire, United Kingdon
Agent in Canada: Johnson Seeds Ltd., Winnipeg Manitoba
Application number: 96-985
Application date: 1996/07/03
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'Prim'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 97-1019
Application date: 1997/04/07
Date abandoned: 2001/04/10
Proposed denomination: **'SW 02601'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 95-480
Application date: 1995/03/22
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'AU 649'**

CANOLA
(Brassica rapa L.)

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 97-1007
Application date: 1997/03/27
Date abandoned: 2001/04/10
Proposed denomination: **'Foothills'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 97-1008
Application date: 1995/03/27
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'Valleyview'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 97-1025
Application date: 1997/04/21
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'1007'**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:** Monsanto Company, St. Louis, Missouri, U.S.A.
Agent in Canada: Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1224
Application date: 1998/02/06
Date abandoned: 2001/03/01
Proposed denomination: **'NL20-NRK'**

➤ **Applicant:** Caithness Potato Breeders Ltd., London, United Kingsom
Agent in Canada: Caithness Potato Technology Inc., O'Leary, P.E.I.
Application number: 97-992
Application date: 1997/03/04
Date abandoned: 2001/04/28
Proposed denomination: **'Maxine'**

➤ **Applicant:** Caithness Potato Breeders Ltd., London, United Kingsom
Agent in Canada: Caithness Potato Technology Inc., O'Leary, P.E.I.
Application number: 97-993
Application date: 1997/03/04
Date abandoned: 2001/04/28
Proposed denomination: **'Tristar'**

➤ **Applicant:** Gilles-Pierre Côté, Drummond, New Brunswick
Application number: 97-1097
Application date: 1997/06/18
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'Ladorée'**

SOYBEAN
(*Glycine max* L. Merrill)

➤ **Applicant:** Hyland Seeds, Blenheim Ontario
Application number: 96-850
Application date: 1996/05/21
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'T9315'**

➤ **Applicant:** Hyland Seeds, Blenheim Ontario
Application number: 97-1151
Application date: 1997/09/16
Date abandoned: 2001/04/27
Proposed denomination: **'T9426'**

5. APPLICATIONS WITHDRAWN

ALSTROEMERIA
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Applicant:** Van Staaveren B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 01-2681
Application date: 2001/04/20
Date Withdrawn : 2001/06/28
Proposed denomination: **'Staloren'**
Tradename: **Lorena**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 98-1438
Application date: 1998/06/23
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2385'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 98-1439
Application date: 1998/06/23
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2479'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 98-1441
Application date: 1998/06/23
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2515'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 98-1443
Application date: 1998/06/23
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2805'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 98-1444
Application date: 1998/06/23
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2810'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 99-1664
Application date: 1999/04/29
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2684'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 99-1665
Application date: 1999/04/29
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2681'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 00-2233
Application date: 2000/05/03
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS3223'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 00-2241
Application date: 2000/05/03
Date Withdrawn : 2001/06/19
Proposed denomination: **'NS2135M'**

CANOLA
(*Brassica rapa* L.)

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 98-1369
Application date: 1998/04/20
Date Withdrawn : 2001/06/15
Proposed denomination: **'Spectrum'**

CORN
(*Zea mays* L.)

➤ **Applicant:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illnois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., Chatham, Ontario
Application number: 99-1747
Application date: 1999/08/05
Date Withdrawn : 2001/06/04
Proposed denomination: **'3DHA9'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Applicant:** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, California, U.S.A.
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1525
Application date: 1998/07/21
Date Withdrawn : 2001/06/04
Proposed denomination: **'Matador Light Pink'**

PETUNIA
(*Petunia x hybrida* Vilm.)

➤ **Applicant:** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 99-2040
Application date: 1999/12/21
Date Withdrawn: 2001/08/30
Proposed denomination: **'Balruflav'**
Tradename: **Ruffle™ Light Lavender**

➤ **Applicant:** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 99-2041
Application date: 1999/12/21
Date Withdrawn: 2001/08/30
Proposed denomination: **'Balfufbrip'**
Tradename: **Ruffle™ Bright Purple**

6. RIGHTS SURRENDERED

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Holder:** Agriculture and Agri-Food Canada, Brandon, Manitoba
Agent in Canada: Agricore, Calgary, Alberta
Certificate number: 0522
Date granted: 1998/09/15
Date rights surrendered: 2001/08/31
Approved denomination: **'AC Hawkeye'**

CHRYSANTHEMUM
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0150
Date granted: 1995/08/21
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Akron'**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0151
Date granted: 1995/08/21
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Imperial'**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0158
Date granted: 1995/08/21
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Apricot Blush'**
Synonym: **Apricot Yoblush**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0658
Date granted: 1999/08/24
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Purple Yolima'**
Tradename: **Purple Lima**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0659
Date granted: 1999/08/24
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Yolima'**
Tradename: **Lima**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0660
Date granted: 1999/08/24
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Honey Yolima'**
Synonym: **Honey Lima**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0662
Date granted: 1999/08/24
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Soledad'**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0663
Date granted: 1999/08/24
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Salmon Pomona'**

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0664
Date granted: 1999/08/24
Date rights surrendered: 2001/08/20
Approved denomination: **'Dark Yomonterey'**
Synonym: **Dark Monterey**

PELARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L. H. Bailey)

➤ **Holder:** Research Technologies, Inc., Tucson, Arizona, U.S.A.
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 0329
Date granted: 1997/06/17
Date rights surrendered: 2001/06/25
Approved denomination: **'Fantasy'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex. Klotzsch)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0793
Date granted: 2000/08/14
Date rights surrendered: 2001/08/08
Approved denomination: **'Eckabner'**
Tradename: **Success Pink**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0798
Date granted: 2000/08/14
Date rights surrendered: 2001/08/08
Approved denomination: **'Eckadali'**
Tradename: **White Splendor**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0799
Date granted: 2000/08/14
Date rights surrendered: 2001/08/08
Approved denomination: **'Eckabiel'**
Tradename: **Pink Splendor**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Holder:** Irish Potato Marketing Limited, Dublin, Ireland
Agent in Canada: Potato Blossom Industries Inc., O'Leary, P.E.I.
Certificate number: 0586
Date granted: 1999/03/19
Date rights surrendered: 2001/07/31
Approved denomination: **'Ambo'**

➤ **Holder:** Irish Potato Marketing Limited, Dublin, Ireland
Agent in Canada: Potato Blossom Industries Inc., O'Leary, P.E.I.
Certificate number: 0588
Date granted: 1999/03/19
Date rights surrendered: 2001/07/31
Approved denomination: **'Barna'**

➤ **Holder:** Irish Potato Marketing Limited, Dublin, Ireland
Agent in Canada: Potato Blossom Industries Inc., O'Leary, P.E.I.
Certificate number: 0591
Date granted: 1999/03/19
Date rights surrendered: 2001/07/31
Approved denomination: **'Rooster'**

➤ **Holder:** Irish Potato Marketing Limited, Dublin, Ireland
Agent in Canada: Potato Blossom Industries Inc., O'Leary, P.E.I.
Certificate number: 0593
Date granted: 1999/03/19
Date rights surrendered: 2001/07/31
Approved denomination: **'Tulla'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Holder:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: Tom Bailey, Kingsville, Ontario
Certificate number: 0465
Date granted: 1998/06/30
Date rights surrendered: 2001/07/04
Approved denomination: **'Ruihonzev'**
Tradename: **Opal Rosamini**

➤ **Holder:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: Tom Bailey, Kingsville, Ontario
Certificate number: 0466
Date granted: 1998/06/30
Date rights surrendered: 2001/07/04
Approved denomination: **'Ruinero'**
Tradename: **Dainty Rosamini**

➤ **Holder:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: Tom Bailey, Kingsville, Ontario
Certificate number: 0467
Date granted: 1998/06/30
Date rights surrendered: 2001/07/04
Approved denomination: **'Ruinidan'**
Tradename: **Pink Rosamini**

SOYBEAN
(*Glycine max* L. Merrill)

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Harrow, Ontario
Certificate number: 0646
Date granted: 1999/06/22
Date rights surrendered: 2001/06/04
Approved denomination: **'AC 756'**

7. RIGHTS REVOKED

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Holder:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Walker Seeds Ltd., Tisdale, Saskatchewan
Certificate number: 0571
Date granted: 1999/02/23
Date rights revoked: 2001/07/05
Denomination: **'Supra'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium x hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Holder:** Denholm Seeds Inc., Lompoc, California, U.S.A.
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 0331
Date granted: 1997/06/17
Date rights revoked: 2001/06/17
Denomination: **'Ritz'**
Synonym: **Usritz**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Holder:** Monsanto Company, St. Louis, Missouri, U.S.A.
Agent in Canada: Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, Ontario
Certificate number: 0736
Date granted: 2000/04/03
Date rights revoked: 2001/08/08
Denomination: **'NL20-RBK'**

➤ **Holder:** Svalöf Weibull AB, Svalöv Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company, Lindsay Ontario
Certificate number: 0738
Date granted: 2000/04/05
Date rights revoked: 2001/08/29
Denomination: **'Matilda'**

➤ **Holder:** Svalöf Weibull AB, Svalöv Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company, Lindsay Ontario
Certificate number: 0739
Date granted: 2000/04/05
Date rights revoked: 2001/08/29
Denomination: **'Colombo'**

➤ **Holder:** Svalöf Weibull AB, Svalöv Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company, Lindsay Ontario
Certificate number: 0740
Date granted: 2000/04/05
Date rights revoked: 2001/08/29
Denomination: **'Eloge'**

8. CHANGE OF DENOMINATION

BRACHYCOME
(*Brachycome* species Cass.)

➤ **Applicant:** Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Application number: 99-2006
Application date: 1999/12/20
Previously proposed denomination: **'Moonlight'**
Proposed denomination: **'Billabong Moonlight'**

FUCHSIA
(Fuchsia x hybrida)

➤ **Applicant:** Kieft Bloemzaden B.V., Venhuizen, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2306
Application date: 2000/06/21
Previously proposed denomination: **'Diva Rose / Blue 2548-1'**
Proposed denomination: **'Kiecandiro'**

➤ **Applicant:** Kieft Bloemzaden B.V., Venhuizen, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2307
Application date: 2000/06/21
Previously proposed denomination: **'Diva Rose / Purple 2545-4'**
Proposed denomination: **'Kiecandipu'**

KALANCHOE
(*Kalanchoe* species Adans.)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1846
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Maxi Rose'**
Proposed denomination: **'Axrose'**
Tradename: **Maxi Rose**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1847
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Maxi White'**
Proposed denomination: **'Axwhite'**
Tradename: **Maxi White**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1848
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Maxi Salmon'**
Proposed denomination: **'Axsalm'**
Tradename: **Maxi Salmon**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1849
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Maxi Orchid'**
Proposed denomination: **'Axorch'**
Tradename: **Maxi Orchid**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1850
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Maxi Antique Pink'**
Proposed denomination: **'Axanpink'**
Tradename: **Maxi Antique Pink**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1852
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Maxi Pink'**
Proposed denomination: **'Axpink'**
Tradename: **Maxi Pink**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1854
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Midi Pink'**
Proposed denomination: **'Mipink'**
Tradename: **Midi Pink**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1855
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Midi Salmon Pink'**
Proposed denomination: **'Misalpink'**
Tradename: **Midi Salmon Pink**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1856
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Midi Bright Pink'**
Proposed denomination: **'Mibripink'**
Tradename: **Midi Bright Pink**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1859
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Midi Sunset'**
Proposed denomination: **'Misunpink'**
Tradename: **Midi Sunset**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1860
Application date: 1999/11/05
Previously proposed denomination: **'Midi Pink Starlet'**
Proposed denomination: **'Mipinkstar'**
Tradename: **Midi Pink Starlet**

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'HÛr. ex Ait.)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 01-2737
Application date: 2001/05/23
Previously proposed denomination: **'Free Light Lav II'**
Proposed denomination: **'Freelight Lav Two'**
Tradename: **Freestyle Light Lavender II**

PELARGONIUM
(*Pelargonium x hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 00-2254
Application date: 2000/05/10
Previously proposed denomination: **'Amri Pink II'**
Proposed denomination: **'Amri Pink Two'**
Tradename: **Americana Pink II**

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 00-2255
Application date: 2000/05/10
Previously proposed denomination: **'Amri Light Pink Spla II'**
Proposed denomination: **'Amrilight Pinkspla Two'**
Tradename: **Americana Light Pink Splash II**

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 00-2256
Application date: 2000/05/10
Previously proposed denomination: **'Amri White Spla II'**
Proposed denomination: **'Amriwhite Spla Two'**
Tradename: **Americana White Splash II**

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 00-2257
Application date: 2000/05/10
Previously proposed denomination: **'Clips Red II'**
Proposed denomination: **'Clips Red Two'**
Tradename: **Eclipse Red II**

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Application number: 99-1652
Application date: 1999/04/29
Previously proposed denomination: **'ES 4'**
Proposed denomination: **'Amazon'**

➤ **Applicant:** Pflanzenzucht Oberlimpurg™, Schwaebisch Hall, Germany
Agent in Canada: C. & M. Seeds, Palmerston, Ontario
Application number: 01-2533
Application date: 2001/01/30
Previously proposed denomination: **'CM97606'**
Proposed denomination: **'Granite'**

9. CHANGE OF APPLICANT

ARGYRANTHEMUM
(*Argyranthemum frutexcens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford, British Columbia
Application number: 99-2057
Application date: 1999/12/22
Proposed denomination: **'Sugar Baby'**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford, British Columbia
Application number: 99-2058
Application date: 1999/12/22
Proposed denomination: **'Sugar Button'**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford, British Columbia
Application number: 99-2059
Application date: 1999/12/22
Proposed denomination: **'Summer Melody'**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford, British Columbia
Application number: 99-2060
Application date: 1999/12/22
Proposed denomination: **'Summer Pink'**

EUONYMUS
(*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz)

➤ **Former Applicant:** The Conard-Pyle Company, West Grove, Pennsylania U.S.A.
New applicant: CP Delaware Inc., Wilmington Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Application number: 99-2084
Application date: 1999/12/23
Proposed denomination: **'Moonshadow'**

➤ **Former Applicant:** The Conard-Pyle Company, West Grove, Pennsylania U.S.A.
New applicant: CP Delaware Inc., Wilmington Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Application number: 99-2085
Application date: 1999/12/23
Proposed denomination: **'Sunrise'**

PETUNIA
(*Petunia x hybrida* Vilm.)

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2321
Application date: 2000/06/21
Proposed denomination: **'MP4'**
Tradename: **Tiny Tunia Burgundy**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2322
Application date: 2000/06/21
Proposed denomination: **'MP6'**
Tradename: **Tiny Tunia Violet**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2323
Application date: 2000/06/21
Proposed denomination: **'MP7'**
Tradename: **Tiny Tunia Pink**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2324
Application date: 2000/06/21
Proposed denomination: **'MP19'**
Tradename: **Tiny Tunia Plum Vein**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2325
Application date: 2000/06/21
Proposed denomination: **'MP20'**
Tradename: **Tiny Tunia Violet Vein**

➤ **Former Applicant:** University of Sydney, Cobbity, NSW, Australia
New applicant: NuFlora International Pty. Ltd. Sydney, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2326
Application date: 2000/06/21
Proposed denomination: **'MP21'**
Tradename: **Tiny Tunia White**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Former Applicant:** The Conard-Pyle Company, West Grove, Pennsylania U.S.A.
New applicant: CP Delaware Inc., Wilmington Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2397
Application date: 2000/09/29
Proposed denomination: **'Meinusian'**

➤ **Former Applicant:** The Conard-Pyle Company, West Grove, Pennsylania U.S.A.
New applicant: CP Delaware Inc., Wilmington Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2398
Application date: 2000/09/29
Proposed denomination: **'Meitelov'**

➤ **Former Applicant:**	The Conard-Pyle Company, West Grove, Pennsylania U.S.A.
New applicant:	CP Delaware Inc., Wilmington Delaware, U.S.A.
Agent in Canada:	Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Application number:	00-2399
Application date:	2000/09/29
Proposed denomination:	**'Meizincaro'**

10. CHANGE OF HOLDER

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Former Holder:**	The Conard-Pyle Company, West Grove, Pennsylania U.S.A.
New holder:	CP Delaware Inc., Wilmington Delaware, U.S.A.
Agent in Canada:	Variety Rights Management Oxford Station, Ontario
Certificate number:	0993
Date rights granted:	2001/07/06
Approved denomination:	**'Radrazz'**

11. ERRATA

Plant Varieties Journal, July 2001, No. 40

Page 21

The applicant for the pelargonium varieties **'Klecona'** and **'Klesatha'** should be Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart, Germany

Page 30

The application number for the *Brassica juncea* Canola type variety **'PC Arid'** should be 99-1685.

12. COST OF PROTECTION

Filing an application	$250.00
Examination of an application750.00	
Issuance of a PBR certificat	500.00
Annual Fee	300.00
Protective Direction	50.00
Claim for Priority from a preceeding application outside of Canada	50.00
Change of an approved denomination	100.00
Objection to an application for PBR	200.00
Reinstatement of an abandoned application	100.00
Reinstatement of an abandoned application on petition	200.00
Application for a compulsory license	250.00
Replacement of a lost/destroyed certificate	50.00
Public inspection of the Register	5.00
Copies of documents in the Register (per page)	.50
Purchase of Canadian test results by a UPOV member country	350.00



Fig. 1 Variety 'Heuver' (left) with reference variety 'Patmore' (right) / Variété 'Heuver' (à gauche) avec la variété de référence 'Patmore' (à droite)



Fig. 2 Variety 'Jumbo Misty Pink' (right) with reference variety 'City Lights' (left) / Variété 'Jumbo Misty Pink' (à droite) avec la variété de référence 'City Lights' (à gauche)



Fig. 3 Variety 'Jumbo Misty Lilac' (right) with reference variety 'City Lights' (left) / Variété 'Jumbo Misty Lilac' (à droite) avec la variété de référence 'City Lights' (à gauche)



Fig. 4 Variety 'Billabong Moonlight' (right) with reference variety 'Fernleaf White' (left) / Variété 'Billabong Moonlight' (à droite) avec la variété de référence 'Fernleaf White' (à gauche)



Fig 5 Variety 'Mauve Delight' (right) with reference variety 'Amethyst' (left) / Variété 'Mauve Delight' (à droite) avec la variété de référence 'Amethyst' (à gauche)



Fig 6 Variety 'Strawberry Mousse' (right) with reference variety 'Pink' (left) / Variété 'Strawberry Mousse' (à droite) avec la variété de référence 'Pink' (à gauche)



Fig. 7 Variety 'Lemon Twist' (right) with reference variety 'Sunburst' (left) / Variété 'Lemon Twist' (à droite) avec la variété de référence 'Sunburst' (à gauche)



Fig. 8 Variety 'Happy Face Pink' (right) with reference variety 'City Lights' (left) / Variété 'Happy Face Pink' (à droite) avec la variété de référence 'City Lights' (à gauche)



Fig. 9 Variety 'AC Nugget' (left) with reference varieties '989', 'Omega', and 'Flanders' (from left to right) / Variété 'AC Nugget' (à gauche) avec les variétés de référence '989', 'Omega' et 'Flanders' (de gauche à droite)

Fig. 10 Variety 'Bailbelle' (top) with reference varieties 'Palibin' (bottom left) and 'Miss Kim' (bottom right) / Variété 'Bailbelle' (en haut) avec les variétés de référence 'Palibin' (à gauche, en dessous) et 'Miss Kim' (à droite, en dessous)



Fig. 11 Variety 'Miami' (left) with reference variety 'Papete' (right) / Variété 'Miami' (à gauche) avec la variété de référence 'Papete' (à droite)



Fig. 12 Variety 'Vienna' (left) with reference variety 'Lycia' (right) / Variété 'Vienna' (à gauche) avec la variété de référence 'Lycia' (à droite)



Fig. 13 Variety 'SW PARADE' (top) with reference variety 'Majoret' (bottom) / Variété 'SW PARADE' (en haut) avec la variété de référence 'Majoret' (en dessous)



Fig. 14 Variety 'Amandine' / Variété 'Amandine'



Fig 15 Variety 'Sandy' / Variété 'Sandy'

Fig. 16 Variety 'Cynthia' / Variété 'Cynthia'



Fig. 17 Variety 'Marine' / Variété 'Marine'

Fig. 18 Variety 'Sylvia' / Variété 'Sylvia'

Fig. 19 Reference variety 'Yukon Gold' / Variété de référence 'Yukon Gold'

Fig. 20 Reference variety 'Dali' / Variété de référence 'Dali'

Fig. 21 Reference variety 'Atlantic' / Variété de référence 'Atlantic'

Fig. 22 Reference variety 'Morning Gold' / Variété de référence 'Morning Gold'



Fig. 23 Variety 'POULnew' (left) with reference varieties 'POULari' (centre) and 'POULman' (right) / Variété 'POULnew' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULari' (au centre) et 'POULman' (à droite)



Fig 24 Variety 'POULrijk' (left) with reference varieties 'POULcov' (centre) and 'Bonica' (right) / Variété 'POULrijk' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULcov' (au centre) et 'Bonica' (à droite)

Fig. 25 Variety 'POULheart' (left) with reference varieties 'Queen Elizabeth' (centre) and 'POULari' (right) / Variété 'POULheart' (à gauche) avec les variétés de référence 'Queen Elizabeth' (au centre) et 'POULari' (à droite)



Fig. 26 Variety 'POULsyng' (left) with reference varieties 'Queen Elizbeth' (centre) and 'POULman' (right) / Variété 'POULsyng' (à gauche) avec les variétés de référence 'Queen Elizabeth' (au centre) et 'POULman' (à droite)



Fig. 27 Variety 'POULna' (left) with reference varieties 'Queen Elizabeth' (centre) and 'POULari' (right) / Variété 'POULna' (à gauche) avec les variétés de référence 'Queen Elizabeth' (au centre) et 'POULari' (à droite)



Fig. 28 Variety 'POULrim' (left) with reference varieties 'POULjill' (centre) and 'POULman' (right) / Variété 'POULrim' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULjill' (au centre) et 'POULman' (à droite)



Fig. 29 Variety 'POULfiry' (left) with reference varieties 'POULnows' (centre) and 'POULmo' (right) / Variété 'POULfiry' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULnows' (au centre) et 'POULmo' (à droite)



Fig. 30 Variety 'POULtika' (left) with reference varieties 'POULsyng' (centre) and 'Queen Elizabeth' (right) / Variété 'POULtika' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULsyng' (au centre) et 'Queen Elizabeth' (à droite)



Fig. 31 Variety 'POULnorm (left) with reference variety 'POULman' (right) / Variété 'POULnorm' (à gauche) avec la variété dé référence 'POULman' (à droite)



Fig. 32 Variety 'POULhilda' (left) with reference varieties 'POULobe', 'POULarbso, and 'POULpollo' (from left to right) / Variété 'POULhilda' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULobe', 'POULarbso' et 'POULpollo' (de gauche à droite)



Fig 33 Variety 'POULsabel' (left) with reference varieties 'POULobe' (centre) and 'POULhappy' (right) / Variété 'POULsabel' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULobe' (au centre) et 'POULhappy' (à droite)



Fig. 34 Variety 'POULrent' (left) with reference varieties 'POULobe', 'POULpeacy, and 'POULsun' (from left to right) / Variété 'POULrent' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULobe', 'POULpeacy' et 'POULsun' (de gauche à droite)



Fig. 35 Variety 'POULpeacy' (left) with reference varieties 'POULobe', 'POULymp, and 'POULsun' (from left to right) / Variété 'POULpeacy' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULobe', 'POULymp' et 'POULsun' (de gauche à droite)



Fig. 36 Variety 'POULbrez' (left) with reference varieties 'POULfuna', 'POULfio, and 'POULhappy' (from left to right) / Variété 'POULbrez' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULfuna', 'POULfio' et 'POULhappy' (de gauche à droite)



Fig. 37 Variety 'POULrolyt' (left) with reference variety 'POULsabel' (right) / Variété 'POULrolyt' (à gauche) avec la variété de référence 'POULsabel' (à droite)



Fig 38 Variety 'POULrosit' (left) with reference variety 'POULmist' (right) / Variété 'POULrosit' (à gauche) avec la variété de référence 'POULmist' (à droite)

Fig. 39 Variety 'POULnil' (left) with reference variety 'POULymp' (right) / Variété 'POULnil' (à gauche) avec la variété de référence 'POULymp' (à droite)



Fig. 40 Variety 'POULra012' (right) with reference varieties 'POULhappy' (left) and 'POULra007' (centre) / Variété 'POULra012' (à droite) avec les variétés de référence 'POULhappy' (à gauche) et 'POULra007' (au centre)



Fig. 41 Variety 'POULmona' (right) with reference varieties 'POULobe' (left) and 'POULsabel' (centre) / Variété 'POULmona' (à droite) avec les variétés de référence 'POULobe' (à gauche) et 'POULsabel' (au centre)

Fig. 42 Variety 'S25-H5' (top) with reference variety 'S24-L2' (bottom) / Variété 'S25-H5' (en haut) avec la variété de référence 'S24-L2' (en dessous)



Fig. 43 Variety 'Wojo's Jem' (bottom) with reference varieties 'Variegata' (top left) and 'Maculata' (top right) / Variété 'Wojo's Jem' (en dessous) avec les variétés de référence 'Variegata'(en haut, à gauche) et 'Maculata' (en haut, à droite)

Bulletin des variétés végétales

LE BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Toute correspondance échangée avec le BPOV doit être expédiée à l'adresse suivante:

Le Bureau de la Protection des Obtentions Végétales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario)
K1A 0Y9

Pour les demandes de renseignements généraux concernant la protection des obtentions végétales, veuillez communiquer avec un des membres du BPOV par télécopieur au (613) 228-6629, par courrier électronique, ou par téléphone au (613) 225-CFIA (225-2342) aux postes indiqués.

Visitez notre site Web à:
http://www.inspection.gc.ca/français/plaveg/pbrpov/pbrpovf.shtml

Employés du Bureau de la protection des obtentions végétales		# de Poste
Directeur, POV	Valerie Sisson (vsisson@inspection.gc.ca)	4384
Agents, POV	Elizabeth Prentice-Hudson (eprentice@inspection .gc.ca)	4393
	Christine Irving (cirving@inspection.gc.ca)	4394
	Sandy Marshall (smarshall@inspection.gc.ca)	4392
	Michel Cormier (mcormier@inspection.gc.ca)	4391
Coordinateur de projects	Bill Hanson (bhanson@inspection.gc.ca)	4388

13. Délivrance des certificats d'obtention 93
Bégonia 93
Bouvardie 93
Fraisier 93
Genevrier 93
Impatiente 94
Pétunia 96
Poinsettia 97
Pois 97
Pommier 97
Rosier 97
Verveine 98

14. Demandes dont le dépôt est accepté 99
Alstoemère 99
Blé 99
Boutelou gracieux 99
Canola 99
Cerisier 100
Chrysanthème frutescent 100
Dahlia 100
Impatiente 100
Kalanchoë 101
Koelérie à crêtes 101
Maïs 101
Orge 102
Pâturin 102
Pélargonium 102
Poinsettia 103
Pois 103
Pomme de terre 104
Pommier 104
Rosier 104
Soja 105
Verveine 106

15. Demandes à l'étude 107
Avoine 107
Brachycome 108
Canola 113
Frêne 115
Impatiente 116
Lilas 118
Lin 119
Pélargonium 120
Pervenche 121
Pois 122
Pomme de terre 123
Rosier 129
Soja 158

16. Demandes abandonées 161

17. Demandes retirées 162

18. Renonciation des certificats d'obtention 164

19. Révocation des certificats d'obtention 166

20. Changement de denomination 167

21. Changement de requérant 170

22. Changement du titulaire 172

23. Errata 172

24. Coût de la protection 173

L'ÉCHÉANCE POUR LE NUMÉRO DE JANVIER 2002 EST LE 19 NOVEMBRE 2001

L'ÉCHÉANCE POUR LE NUMÉRO D'AVRIL 2002 EST LE 8 FÉVRIER 2002

13. DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D'OBTENTION

BÉGONIA
(***Begonia elatior hybridae***)

➤ **Titulaire :** Benary Samenzucht GmbH, Hann.Münden (Allemagne)
Mandataire au Canada : Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro du certificat : 1008
Date de l'obtention : 2001/08/13
Numéro de la demande : 99-2015
Date de la demande : 1999/12/20
Dénomination approuvée : **'Beman Hellrosa'**
Nom commercial : **Solenia Light Pink**

➤ **Titulaire :** Benary Samenzucht GmbH, Hann.Münden (Allemagne)
Mandataire au Canada : Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro du certificat : 1009
Date de l'obtention : 2001/08/13
Numéro de la demande : 99-2016
Date de la demande : 1999/12/20
Dénomination approuvée : **'Beman Orange'**
Nom commercial : **Solenia Orange**

BOUVARDIE
(***Bouvardia* species Salisb.)**

➤ **Titulaire :** Bouvardiakwekerij de Jong vof, Roelofarendsveen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1002
Date de l'obtention : 2001/07/27
Numéro de la demande : 99-1674
Date de la demande : 1999/05/20
Dénomination approuvée : **'Royal Janette'**

➤ **Titulaire :** Bouvardiakwekerij de Jong vof, Roelofarendsveen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1003
Date de l'obtention : 2001/07/27
Numéro de la demande : 99-1676
Date de la demande : 1999/05/20
Dénomination approuvée : **'Royal Daphne'**

FRAISIER
(***Fragaria x ananassa* Duch.)**

➤ **Titulaire :** S.C. Darbonne, Milly La Foret (France)
Mandataire au Canada : Fetherstonhaugh & Co., Vancouver (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 0994
Date de l'obtention : 2001/07/13
Numéro de la demande : 97-1063
Date de la demande : 1997/05/07
Dénomination approuvée : **'Darselect'**

GENEVRIER
(***Juniperous horizontalis* Moench)**

➤ **Titulaire :** Casey Van Vloten, Pitt Meadows (Colombie-Britannique)
Mandataire au Canada : MacKenzie Fujisawa Brewer Stevenson, Vancouver (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1014
Date de l'obtention : 2001/08/27
Numéro de la demande : 99-2018
Date de la demande : 1999/12/21
Dénomination approuvée : **'Blue Prince'**

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkerii* Bull.)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0975
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1709
Date de la demande : 1999/06/15
Dénomination approuvée : 'Kiascia'
Nom commercial : Ascia - Light Purple
Synonyme : Ascia

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0976
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1710
Date de la demande : 1999/06/15
Dénomination approuvée : 'Kilogia'
Nom commercial : Logia - Violet
Synonyme : Logia

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0977
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1712
Date de la demande : 1999/06/15
Dénomination approuvée : 'Kibarbu'
Nom commercial : Barbuda - Apricot
Synonyme : Barbuda

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0978
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1713
Date de la demande : 1999/06/15
Dénomination approuvée : 'Kiziz'
Nom commercial : Zizula - Orange on Orange
Synonyme : Zizula

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0979
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1714
Date de la demande : 1999/06/15
Dénomination approuvée : 'Kicap'
Nom commercial : Capila - Purple on Lilac
Synonyme : Capila

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0980
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1715
Date de la demande : 1999/06/15
Dénomination approuvée : 'Kizeg'
Nom commercial : Zegris - Salmon Pink
Synonyme : Zegris

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0984
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1580
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : 'Kipablo'
Nom commercial : Pablo - Salmon

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0985
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1581
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : **'Kiram'**
Nom commercial : **Ramon - Cherry Rose**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0986
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1582
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : **'Kiped'**
Nom commercial : **Pedro - Rose**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0987
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1583
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : **'Kirau'**
Nom commercial : **Raul - Scarlet Red**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0988
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1585
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : **'Kicarl'**
Nom commercial : **Carlos - Purple**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0989
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1586
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : **'Kisaul'**
Nom commercial : **Saul - Orange**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0990
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 99-1587
Date de la demande : 1999/03/25
Dénomination approuvée : **'Kijuan'**
Nom commercial : **Juan - Light Pink**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0992
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 00-2123
Date de la demande : 2000/02/18
Dénomination approuvée : **'Kimpdel'**
Nom commercial : **Imp. Delias - Light Rose**

IMPATIENTE
(*Impatiens* hybrida)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0991
Date de l'obtention : 2001/06/15
Numéro de la demande : 00-2122
Date de la demande : 2000/02/18
Dénomination approuvée : **'Kibetio'**
Nom commercial : **Betio - Candy Kiss**

IMPATIENTE
(*Impatiens wallerana* Hook.f.)

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0995
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1609
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiLav'

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0996
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1610
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiTag'

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0997
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1611
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiPec'

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0998
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1613
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiCher'

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0999
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1615
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiHop'

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1000
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1616
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiLip'

➤ **Titulaire :** Tioga Genetics, Broadbent, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1001
Date de l'obtention : 2001/07/16
Numéro de la demande : 99-1617
Date de la demande : 1999/03/30
Dénomination approuvée : 'TiRe'

PÉTUNIA
(*Petunia x hybrida* Vilm.)

➤ **Titulaire :** John Alldrick, Studley, Warwickshire (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro du certificat : 1010
Date de l'obtention : 2001/08/13
Numéro de la demande : 99-1967
Date de la demande : 1999/12/16
Dénomination approuvée : 'Limelight'

➤ **Titulaire :** Priscilla Grace Kerley, Cambridge (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro du certificat : 1011
Date de l'obtention : 2001/08/13
Numéro de la demande : 99-1906
Date de la demande : 1999/12/03
Dénomination approuvée : 'Kercor'
Nom commercial : Coral Plume

➤ **Titulaire :** Priscilla Grace Kerley, Cambridge (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro du certificat : 1012
Date de l'obtention : 2001/08/13
Numéro de la demande : 99-1907
Date de la demande : 1999/12/03
Dénomination approuvée : **'Kerjul'**
Nom commercial : **Julia**

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois (État-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro du certificat : 1015
Date de l'obtention : 2001/08/30
Numéro de la demande : 99-2039
Date de la demande : 1999/12/21
Dénomination approuvée : **'Balrufvein'**
Nom commercial : **Ruffle[MD] Plum Veined**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex. Klotzsch)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0981
Date de l'obtention : 2001/06/06
Numéro de la demande : 99-1725
Date de la demande : 1999/06/17
Dénomination approuvée : **'Eckansley'**
Nom commercial : **Holly Point**

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Titulaire :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Performance Seeds Canada Ltd., Regina (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 1016
Date de l'obtention : 2001/08/30
Numéro de la demande : 99-1634
Date de la demande : 1999/04/19
Dénomination approuvée : **'Eclipse'**

POMMIER
(*Malus pumila* Mill.)

➤ **Titulaire :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
Numéro du certificat : 1013
Date de l'obtention : 2001/08/20
Numéro de la demande : 00-2210
Date de la demande : 2000/04/25
Dénomination approuvée : **'MacExcel'**

POMMIER
(*Malus* species Mill.)

➤ **Titulaire :** Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Ridout & Maybee, Toronto (Ontario)
Numéro du certificat : 1007
Date de l'obtention : 2001/08/10
Numéro de la demande : 94-316
Date de la demande : 1994/03/10
Dénomination approuvée : **'Honeycrisp'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0993
Date de l'obtention : 2001/07/06
Numéro de la demande : 99-1678
Date de la demande : 1999/05/25
Dénomination approuvée : **'Radrazz'**
Nom commercial : **Knock Out**

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montreal (Québec)
Numéro du certificat : 1004
Date de l'obtention : 2001/08/02
Numéro de la demande : 97-1113
Date de la demande : 1997/07/23
Dénomination approuvée : **'POULracos'**
Nom commercial : **Scarlet Parade®**

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montreal (Québec)
Numéro du certificat : 1005
Date de l'obtention : 2001/08/02
Numéro de la demande : 97-1122
Date de la demande : 1997/07/23
Dénomination approuvée : **'POULweno'**
Nom commercial : **Bronze Parade®**

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montreal (Québec)
Numéro du certificat : 1006
Date de l'obtention : 2001/08/02
Numéro de la demande : 97-1130
Date de la demande : 1997/08/08
Dénomination approuvée : **'POULdacen'**
Nom commercial : **Sundance Palace®**

VERVEINE
(*Verbena x hybrida* Voss)

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro du certificat : 0982
Date de l'obtention : 2001/06/12
Numéro de la demande : 99-1643
Date de la demande : 1999/04/22
Dénomination approuvée : **'Tort Peachy'**
Nom commercial : **Tortuga Peachy**

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro du certificat : 0983
Date de l'obtention : 2001/06/12
Numéro de la demande : 99-1645
Date de la demande : 1999/04/22
Dénomination approuvée : **'Tort White'**
Nom commercial : **Tortuga White**

14. DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

ALSTROEMÈRE
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Requérant :** Van Staaveren B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2802
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination proposée : **'Stariana'**

➤ **Requérant :** Koninklijke van Zanten B.V., Rijsenhout (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2803
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination proposée : **'Ossorio'**

➤ **Requérant :** Koninklijke van Zanten B.V., Rijsenhout (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2804
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination proposée : **'Zanair'**

➤ **Requérant :** Koninklijke van Zanten B.V., Rijsenhout (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2805
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination proposée : **'Zanena'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Requérant :** United Grain Growers Limited, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2771
Date de la demande : 2001/07/10
Dénomination proposée : **'5601HR'**

➤ **Requérant :** United Grain Growers Limited, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2772
Date de la demande : 2001/07/10
Dénomination proposée : **'5701PR'**

BOUTELOU GRACIEUX
(*Bouteloua gracilis* (H.B.K.) Lag. ex. Steud.)

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Ducks Unlimited Canada, Brandon (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2807
Date de la demande : 2001/08/07
Dénomination proposée : **'BG-MB'**
Certificat temporaire délivré : 2001/08/07

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** The Governors of the University of Alberta, Edmonton (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2762
Date de la demande : 2001/06/12
Dénomination proposée : **'A00-57 NDA'**

➤ **Requérant :** The Governors of the University of Alberta, Edmonton (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2763
Date de la demande : 2001/06/12
Dénomination proposée : **'A00-66 NDA'**

CERISIER
(*Prunus avium* L.)

➤ **Requérant :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, Summerland (Colombie-Britannique)
Mandataire au Canada : okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2765
Date de la demande : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'Sumste'**
Nom commercial: **Samba**

➤ **Requérant :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, Summerland (Colombie-Britannique)
Mandataire au Canada : okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2766
Date de la demande : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'Sumele'**
Nom commercial: **Satin**

➤ **Requérant :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, (Colombie-Britannique)
Mandataire au Canada : okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2767
Date de la demande : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'13N-7-70'**

CHRYSANTHÈME FRUTESCENT
(*Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2750
Date de la demande : 2001/06/04
Dénomination proposée : **'Supalight'**

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2751
Date de la demande : 2001/06/04
Dénomination proposée : **'Supaglow'**

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2752
Date de la demande : 2001/06/04
Dénomination proposée : **'Supamarg'**

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, NSW (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2753
Date de la demande : 2001/06/04
Dénomination proposée : **'Cobeer'**
Nom commercial: **Sugar Cheer**

DAHLIA
(*Dahlia* species Cav.)

➤ **Requérant :** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Holc's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2793
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'Margaret Improved'**

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkeri* Bull.)

➤ **Requérant :** Ogleyer Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2784
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Lasting Impression Red'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2785
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Ovation Blush Rose'**

IMPATIENTE
***(Impatiens walleriana* Hook.f.)**

➤ **Requérant :** Floranova Limited, Dereham, Norfolk (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2798
Date de la demande : 2001/07/23
Dénomination proposée : **'Cameo Pink Surprise'**

➤ **Requérant :** Floranova Limited, Dereham, Norfolk (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2799
Date de la demande : 2001/07/23
Dénomination proposée : **'Cameo Red Surprise'**

KALANCHOË
***(Kalanchoe blossfeldiana* Poelln.)**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2783
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Axsunyell'**
Nom commercial : **Maxi Sunray Yellow**

KOULÉRIE À CRÊTES
***(Koeleria macrantha* (Ledeb.) J.A. Schultes)**

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Ducks Unlimited Canada, Brandon (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2806
Date de la demande : 2001/08/07
Dénomination proposée : **'PG-MB'**
Certificat temporaire délivré : 2001/08/07

MAÏS
***(Zea mays* L.)**

➤ **Requérant :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2808
Date de la demande : 2001/08/21
Dénomination proposée : **'0014738'**

➤ **Requérant :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2809
Date de la demande : 2001/08/21
Dénomination proposée : **'1181664'**

➤ **Requérant :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2810
Date de la demande : 2001/08/21
Dénomination proposée : **'1325530'**

ORGE
***(Hordeum vulgare* L. sensu lato)**

➤ **Requérant :** Agriculture et agroalimentaire Canada, Brandon (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2813
Date de la demande : 2001/08/28
Dénomination proposée : **'TR256'**

PÂTURIN
(Poa arachnifera x Poa pratensis)

➤ **Requérant :** Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas (États-Unis)
Mandataire au Canada : Borden Ladner Gervais LLP, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2786
Date de la demande : 2001/07/13
Dénomination proposée : **'Reveille'**

PÉLARGONIUM
***(Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)**

➤ **Requérant :** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Holz's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2792
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'Balcultbere'**
Nom commercial: **Colorvade™ Burgundy Ice**

PÉLARGONIUM
***(Pelargonium x domesticum* L. H. Bailey)**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2775
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Brave'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2774
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Elegance Purple Bicolor'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2775
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Elegance Raspberry Swirl'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2776
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Elegance Rose Bicolor'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2777
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Jewel'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2778
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Royalty White'**

PÉLARGONIUM
***(Pelargonium x hortorum* L. H. Bailey)**

➤ **Requérant :** Ogiveee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2779
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Candy Light Salmon'**

➤ **Requérant :** Ogiveee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2780
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Patriot Red'**

➤ **Requérant :** Ogiveee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2781
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Stardom Pink and White'**

➤ **Requérant :** Ogiveee Ltd., Connellsville, Pennsylvania (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2782
Date de la demande : 2001/07/12
Dénomination proposée : **'Stardom Red'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allegemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2811
Date de la demande : 2001/08/23
Dénomination proposée : **'KLEP01007'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allegemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2812
Date de la demande : 2001/08/23
Dénomination proposée : **'KLEP01012'**

POINSETTIA
***(Euphorbia pulcherrima* Willd. ex. Klotzsch)**

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2768
Date de la demande : 2001/08/23
Dénomination proposée : **'Eckalvesa'**
Synonyme : **1-99**

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2769
Date de la demande : 2001/08/23
Dénomination proposée : **'Eckalyca'**
Synonyme : **T-198**

POIS
***(Pisum sativum* L. sensu lato)**

➤ **Requérant :** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 01-2770
Date de la demande : 2001/07/06
Dénomination proposée : **'Madoc'**
Certificat temporaire délivré : 2001/07/06

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

POMME DE TERRE
(Solanum tuberosum L.)

➤ **Requérant :** SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hamburg (Allemagne)
Mandataire au Canada : Solanum International Inc., Edmonton (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2787
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'HO 2000'**
Certificat temporaire délivré : 2001/07/19

POMMIER
(Malus domestica Borkh.)

➤ **Requérant :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, Summerland (Colombie-Britannique)
Mandataire au Canada : okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2764
Date de la demande : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'8S-69-23'**

➤ **Requérant :** William A. Cox., Cleveland, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Bereskin & Parr, Toronto (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2800
Date de la demande : 2000/08/03 (bénéfice de priorité)
Dénomination proposée : **'Stella Minnesota'**
Certificat temporaire délivré : 2001/08/02

ROSIER
(Rosa species L.)

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2754
Date de la demande : 2001/06/05
Dénomination proposée : **'POULbrido'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2788
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'POULra014'**
Nom commercial: **Julie Parade®**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2789
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'POULra015'**
Nom commercial: **Denise Parade®**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2790
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'POULra016'**
Nom commercial: **Sterling Parade®**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2794
Date de la demande : 2001/07/25
Dénomination proposée : **'POULhi005'**
Nom commercial: **Valentina Hit®**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2795
Date de la demande : 2001/07/25
Dénomination proposée : **'POULhi009'**
Nom commercial: **Cinderella Hit®**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2796
Date de la demande : 2001/07/25
Dénomination proposée : **'POULhi008'**
Nom commercial: **Tiffany Hit®**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 01-2797
Date de la demande : 2001/07/25
Dénomination proposée : **'POULgo006'**
Nom commercial: **Pink Pagode**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Adams Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2801
Date de la demande : 2001/08/03
Dénomination proposée : **'KORpusiro'**
Nom commercial: **Purple Roxy**

SOJA (*Glycine max* L. Merrill)

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2755
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'CL970321'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2756
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'CL970331'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2757
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'CL970333'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2758
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'CL970335'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2759
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'J557707'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2760
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'L400403'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2761
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination proposée : **'L400498'**
Certificat temporaire délivré : 2001/06/08

➤ **Requérant :** Hyland Seeds, Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2814
Date de la demande : 2001/08/29
Dénomination proposée : **'Cascade'**

VERVEINE
(*Verbena x hybrida* Voss)

➤ **Requérant :** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2791
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination proposée : **'Balazwhit'**
Nom commercial: **Aztec™ White**

15. DEMANDES À L'ÉTUDE

Toute personne désirant s'opposer aux demandes suivantes doit le faire par écrit en s'adressant au directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales dans les six mois suivant la date de publication du présent bulletin; la demande doit également être accompagnée du paiement des frais appropriés.

À moins d'indication contraire, les couleurs sont déterminées au moyen du code des couleurs de la Royal Horticultural Society (RHS).

Dans la section *Demandes à l'étude* la description ne présente désormais que les caractères de la variété candidate, mais le sommaire permet toujours une comparison avec les variétés de référence.

Toutes les photos sont fournies par le requérant. Les photographies peuvent être omises lorsque les caractéristiques distinctives ne sont pas évidentes.

AVOINE
(*Avena sativa* L.)

Dénomination proposée : **'SW EXACTOR'**
Numéro de la demande : 99-1638
Date de la demande : 1999/04/22
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variété de référence : 'Triple Crown'

Sommaire : *'SW EXACTOR' produit des feuilles luisantes à marge glabre, alors que 'Triple Crown' produit des feuilles glauques à marge pubescente. L'entre-nœud de la dernière feuille est luisant chez la variété candidate, alors qu'il est glauque chez la variété de référence. Après l'épiaison (stade vert), la plante est plus haute chez 'SW EXACTOR' que chez 'Triple Crown'.*

Description : 'SW EXACTOR' est une avoine de printemps à grains vêtus. La jeune plante a un port dressé; le limbe et la gaine de ses feuilles inférieures sont glabres. Au stade du gonflement, les feuilles sont ligulées, vert moyen, non glauques, sans pubescence sur les bords. La dernière feuille a un port intermédiaire entre dressé et retombant. L'entre-nœud de la dernière feuille est luisant, et le nœud supérieur de la tige est glabre. La panicule est symétrique. Les glumes sont jaunes, de longueur et largeur moyennes. La glumelle inférieure est courte, blanche, glabre, modérément glauque et moyennement pointue. La glumelle supérieure atteint la moitié de la longueur de la glumelle inférieure.

Le grain est blanc, intermédiaire entre fusiforme et bien rempli, à pilosité basale moyennement longue. Le caryopse est pubescent, et les poils de la brosse sont moyennement longs. Il y a deux grains par épillet.

Origine génétique : La variété 'SW EXACTOR' est issue du croisement Dal × Vital^2 × Vital, réalisé en 1989 à Svalöv, en Suède. La variété a été obtenue par sélection généalogique. Un sujet unique a été sélectionné parmi la génération F_3, et la sélection a été répétée à la F_6. Les critères de sélection précoce étaient la résistance aux maladies et la qualité du grain, tandis que les critères de sélection avancée étaient le rendement et la résistance à la verse. La semence du sélectionneur a été obtenue en 1997 à partir d'une lignée F_8.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'SW EXACTOR' ont été menés en 1998 et 1999 à Nipawin, en Saskatchewan. Les essais ont été réalisés à raison de deux répétitions par variété, en parcelles larges de 1,75 mètre et longues de 3,25 mètres. Chaque répétition comportait environ 1563 sujets, espacés de manière à obtenir 275 sujets par m^2. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures par année d'essai.

Tableau 55 : Tableau pour 'SW EXACTOR'

	'SW EXACTOR'	'TRIPLE CROWN'*
Hauteur de la plante (incluant l'épi sans les arêtes) (cm)		
moyenne	105,6	101,0
étendue	86-121	89-118
écart-type	10,61	6,88

* variété de référence

BRACHYCOME
(*Brachycome* sp.)

Dénomination proposée : **'Jumbo Misty Pink'** (voir la figure 2)
Numéro de la demande : 99-2004
Date de la demande : 1999/12/20
Requérant : Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'City Lights' (voir le tableau 56 à la page 109)

Sommaire : *Les feuilles sont un peu plus grandes chez 'Jumbo Misty Pink' que chez 'City Lights'. Elles sont lobées chez 'Jumbo Misty Pink', alors qu'elles sont pinnatifides chez 'City Lights'. Chez 'Jumbo Misty Pink', les rayons du capitule sont roses et blanchissent en vieillissant, alors que chez 'City Lights' ils sont violet-bleu clair.*

Description : 'Jumbo Misty Pink' donne une plante étalée-rampante densément ramifiée, à entre nœuds de longueur modérée. Les feuilles sont spatulées et lobées. Le dessus des feuilles est vert moyen.

Les bractées involucrales sont petites et glabres. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont en nombre intermédiaire à élevé. Ils sont roses et blanchissent en vieillissant. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est arrondi. La floraison est hâtive, longue et continue.

Origine génétique : 'Jumbo Misty Pink' est issue d'un semis de hasard découvert en 1994 dans le jardin de la Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., à Wandin North, au Victoria, en Australie. On présume que le semis est issu d'une pollinisation libre entre le *B. segmentosa* et une espèce ou un hybride de *Brachycome* à fleurs roses. Un certain nombre de semis spontanés ayant un feuillage semblable ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs, et la variété 'Jumbo Misty Pink' s'est avérée distincte des autres semis.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Jumbo Misty Pink' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Dénomination proposée : **'Jumbo Misty Lilac'** (voir la figure 3)
Numéro de la demande : 99-2005
Date de la demande : 1999/12/20
Requérant : Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'City Lights'

Sommaire : *'Jumbo Misty Lilac' donne une plante plus haute que 'City Lights'. Les feuilles sont lobées chez 'Jumbo Misty Lilac', alors qu'elles sont pinnatifides chez 'City Lights'. Chez 'Jumbo Misty Lilac', les rayons du capitule sont violets, alors que chez 'City Lights' ils sont violet-bleu clair. Le disque du capitule est plus grand chez 'Jumbo Misty Lilac' que chez 'City Lights'.*

Description : 'Jumbo Misty Lilac' donne une plante étalée-rampante densément ramifiée, à entre-nœuds de longueur modérée. Les feuilles sont spatulées et lobées. Le dessus des feuilles est vert moyen.

Les bractées involucrales sont petites et glabres. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont violets, en nombre intermédiaire à élevé. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est arrondi. La floraison est hâtive, longue et continue.

Origine génétique : 'Jumbo Misty Lilac' est issue d'un semis de hasard découvert en 1994 dans le jardin de la Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., à Wandin North, au Victoria, en Australie. On présume que le semis est issu d'une pollinisation libre entre le *B. segmentosa* et un *B. multifida* à fleurs mauves. Un certain nombre de semis spontanés ayant un feuillage semblable ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs, et la variété 'Jumbo Misty Lilac' s'est avérée distincte des autres semis.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Jumbo Misty Lilac' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 56 : Tableau pour 'Jumbo Misty Pink' et 'Jumbo Misty Lilac'

	'JUMBO MISTY PINK'	'JUMBO MISTY LILAC'	'CITY LIGHTS'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	15,14	14,60	11,17
écart-type	0,90	1,14	0,75
Longueur du limbe de la feuille (cm)			
moyenne	3,83	3,40	2,58
écart-type	0,24	0,64	0,17
Largeur du limbe de la feuille (cm)			
moyenne	2,10	1,48	1,70
écart-type	0,46	0,33	0,20
Couleur de la face supérieure du rayon de l'ombelle (RHS)	55D/white	80B/76A	85A/B
Couleur de la face inférieure du rayon de l'ombelle (RHS)	56D	76D	85C/D
Diamètre du disque de l'ombelle (mm)			
moyenne	9,22	10,13	6,33
écart-type	0,44	0,64	0,82

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Billabong Moonlight'** (voir la figure 4)

Dénomination antérieurement proposée : **'Moonlight'**

Numéro de la demande : 99-2006

Date de la demande : 1999/12/20

Requérant : Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria (Australie)

Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'Fernleaf White'

Sommaire : *'Billabong Moonlight' donne une plante plus densément ramifiée et un peu plus grande que 'Fernleaf White'. Les feuilles sont plus foncées chez 'Billabong Moonlight' que chez 'Fernleaf White'. Les rayons du capitule sont plus longs chez 'Billabong Moonlight' que chez 'Fernleaf White', et le pédoncule est plus court.*

Description : 'Billabong Moonlight' donne une plante étalée-rampante densément à très densément ramifiée, à entre-nœuds courts à moyens. Les feuilles sont obovées à spatulées, à marge très découpée. Le dessus des feuilles est vert moyen à vert foncé.

Les bractées involucrales sont petites et légèrement pubescentes. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont blancs (RHS 155D), en nombre peu élevé à intermédiaire. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est arrondi et légèrement échancré. La floraison est hâtive à intermédiaire ainsi que longue et continue.

Origine génétique : 'Billabong Moonlight' est issue d'un semis de hasard découvert en 1993 dans le jardin de la Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., à Wandin North, au Victoria, en Australie. On présume que le semis est issu de la pollinisation libre d'un *B. multifida* à fleurs blanches. Un certain nombre de semis spontanés ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs, et la variété 'Billabong Moonlight' s'est avérée distincte des autres semis.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Billabong Moonlight' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 57 : Tableau de comparaison pour 'Billabong Moonlight'

	'BILLABONG MOONLIGHT'	'FERNLEAF WHITE'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	10,80	9,33
écart-type	1,30	0,58
Largeur de la plante (cm)		
moyenne	28,60	23,60
écart-type	2,07	1,67
Longueur du pédoncule (cm)		
moyenne	3,37	5,33
écart-type	1,31	0,76
Longueur du rayon de l'ombelle (mm)		
moyenne	6,56	4,43
écart-type	0,53	0,79

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Mauve Delight'** (voir la figure 5)
Numéro de la demande : 99-2007
Date de la demande : 1999/12/20
Requérant : Evan Philip Clucas, Wandin North, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'Amethyst'

Sommaire : *Les feuilles de 'Mauve Delight' sont lobées et irrégulièrement dentées, alors que celles de 'Amethyst' sont pinnatifides. Les capitules sont plus petits chez 'Mauve Delight' que chez 'Amethyst', et leur pédoncule est plus court. Les fleurs de 'Mauve Delight' sont d'une couleur légèrement différente de celles de 'Amethyst'.*

Description : 'Mauve Delight' donne une plante étalée-rampante densément ramifiée, à entre-nœuds moyens à longs. Les feuilles sont spatulées, lobées et munies de dents irrégulièrement espacées. Le dessus des feuilles est vert moyen.

Les bractées involucrales sont petites et glabres. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont violets, en nombre peu élevé à intermédiaire. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est arrondi et légèrement échancré. La floraison est hâtive à intermédiaire ainsi que longue et continue.

Origine génétique : 'Mauve Delight' est issue d'un semis de hasard découvert en 1993 dans le jardin de la Kuranga Native Plant Nursery Pty. Ltd., à Wandin North, au Victoria, en Australie. On présume que le semis est issu d'une pollinisation libre entre le *B. angustifolia* et le *B. multifida*. Un certain nombre de semis spontanés ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs, et la variété 'Mauve Delight' s'est avérée distincte des autres semis.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Mauve Delight' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 58 : Tableau de comparaison pour 'Mauve Delight'

	'MAUVE DELIGHT'	'AMETHYST'*
Longueur du pédoncule (cm)		
moyenne	2,96	3,48
écart-type	0,47	0,31
Diamètre de la fleure (cm)		
moyenne	1,80	2,15
écart-type	0,10	0,39
Couleur de la face supérieure du rayon de l'ombelle (RHS)	87B/88C	90B/C
Couleur de la face inférieure du rayon de l'ombelle (RHS)	84C	85A

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Strawberry Mousse'** (voir la figure 6)
Numéro de la demande : 99-2008
Date de la demande : 1999/12/20
Requérant : Richard Colin Anderson, Merricks, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'Pink'

Sommaire : *'Strawberry Mousse' donne une plante plus étroite que 'Pink'. Les feuilles sont lobées chez 'Strawberry Mousse', alors qu'elles sont pinnatifides chez 'Pink'. Chez 'Strawberry Mousse', le dessous des feuilles a une teinte violacée, alors que chez 'Pink' le dessous est vert. Les capitules sont plus grands chez 'Strawberry Mousse' que chez 'Pink', et leur pédoncule est plus long. Les fleurs de 'Strawberry Mousse' sont d'une couleur légèrement différente de celles de 'Pink'.*

Description : 'Strawberry Mousse' donne une plante étalée-rampante densément ramifiée, à entre-nœuds moyens à longs. Les feuilles sont spatulées et lobées. Le dessus des feuilles est vert moyen à vert foncé, et le dessous a une teinte violacée.

Les bractées involucrales sont petites et glabres. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont rose bleuâtre, en nombre peu élevé à intermédiaire. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est arrondi. La floraison est hâtive, longue et continue.

Origine génétique : 'Strawberry Mousse' est issue d'un semis de hasard découvert en 1991 dans le jardin de la Merricks Nursery, à Merricks, au Victoria, en Australie. On présume que le semis est issu d'une pollinisation libre entre le *B. angustifolia* et le *B. formosa*. Un certain nombre de semis spontanés ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs, et la variété 'Strawberry Mousse' s'est avérée distincte des autres semis.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Strawberry Mousse' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 59 : Tableau de comparaison pour 'Strawberry Mousse'

	'STRAWBERRY MOUSSE'	'PINK'*
Largeur de la plante (cm)		
moyenne	21,60	28,20
écart-type	2,07	1,48
Longueur du pédoncule (cm)		
moyenne	3,58	1,92
écart-type	0,43	0,37
Diamètre de la fleure (cm)		
moyenne	2,39	1,91
écart-type	0,29	0,27
Couleur de la face supérieure du rayon de l'ombelle (RHS)	73B	66D
Couleur de la face inférieure du rayon de l'ombelle (RHS)	65C	65B

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Lemon Twist'** (voir la figure 7)
Numéro de la demande : 99-2009
Date de la demande : 1999/12/20
Requérant : Plant Growers Australia Pty. Ltd., Wonga Park, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'Sunburst'

Sommaire : *'Lemon Twist' donne une plante plus petite que 'Sunburst'. Les feuilles de 'Lemon Twist' sont plus petites et moins lobées que celles de 'Sunburst'. Les capitules sont jaune plus foncé chez 'Lemon Twist' que chez 'Sunburst', et leur pédoncule est plus court.*

Description : 'Lemon Twist' donne une plante étalée-rampante densément ramifiée, à entre-nœuds de longueur moyenne. Les feuilles sont oblancéolées, lobées et munies de dents irrégulièrement espacées. Le dessus des feuilles est vert clair.

Les bractées involucrales sont petites et légèrement pubescentes. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont jaunes, en nombre intermédiaire à élevé. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est arrondi et échancré. La floraison est hâtive, longue et continue.

Origine génétique : 'Lemon Twist' a été mise au point en 1993 dans le cadre d'un programme de sélection de brachycomes mené au Victoria, en Australie, par la Plant Growers Australia Pty. Ltd. La variété résulte d'un croisement entre le *B. multifida* var. *dilatata*, comme parent femelle, et un *Brachycome* non identifié mais apparenté au *B. curvicarpa*, comme parent mâle. Les semis issus de ce croisement ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Lemon Twist' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 60 : Tableau de comparaison pour 'Lemon Twist'

	'LEMON TWIST'	'SUNBURST'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	11,63	18,67
écart-type	0,48	1,53
Largeur de la plante (cm)		
moyenne	25,38	32,25
écart-type	0,95	2,50
Longueur du limbe de la feuille (cm)		
moyenne	1,78	2,78
écart-type	0,41	0,26
Largeur du limbe de la feuille (cm)		
moyenne	0,23	0,72
écart-type	0,05	0,15

Longueur du pédoncule (cm)		
moyenne	5,80	7,82
écart-type	0,47	0,51
Longueur du rayon de l'ombelle (mm)		
moyenne	4,50	7,00
écart-type	0,84	0,63
Couleur de la face supérieure du rayon de l'ombelle (RHS)	3B	4D
Couleur de la face inférieure du rayon de l'ombelle (RHS)	4B	4D
Couleur du disque de l'ombelle (RHS)	7A	3A

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Happy Face Pink'** (voir la figure 8)
Numéro de la demande : 99-2010
Date de la demande : 1999/12/20
Requérant : Plant Growers Australia Pty. Ltd., Wonga Park, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variété de référence : 'City Lights'

Sommaire : *Les feuilles sont plus longues chez 'Happy Face Pink' que chez 'City Lights'. Elles sont lobées chez 'Happy Face Pink', alors qu'elles sont pinnatifides chez 'City Lights'. Les capitules sont plus grands chez 'Happy Face Pink' que chez 'City Lights', et leur pédoncule est plus court. De plus, les capitules de 'Happy Face Pink' sont de couleur légèrement différente de ceux de 'City Lights', et leur disque est plus grand.*

Description : 'Happy Face Pink' donne une plante étalée-rampante densément ramifiée, à entre-nœuds moyens à longs. Les feuilles sont spatulées et lobées. Le dessus des feuilles est vert moyen.

Les bractées involucrales sont petites et glabres. Les capitules sont solitaires et simples. Les rayons sont violets, en nombre intermédiaire à élevé. Leur axe longitudinal est droit, et leur sommet est pointu. La floraison est hâtive, longue et continue.

Origine génétique : 'Happy Face Pink' a été mise au point en 1993 dans le cadre d'un programme de sélection de brachycomes mené au Victoria, en Australie, par la Plant Growers Australia Pty. Ltd. La variété résulte d'un croisement entre le *B. formosa* 'Pilliga Posy', comme parent femelle, et un *B. segmentosa* hybride non identifié, comme parent mâle. Les semis issus de ce croisement ont été évalués quant à la présence de caractères supérieurs ou distinctifs.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Happy Face Pink' ont été effectués durant l'été 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés en plein champ. Les sujets étaient espacés de 0,40 mètre sur le rang, et les rangs étaient espacés de un mètre. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 61 :Tableau de comparaison pour 'Happy Face Pink'

	'HAPPY FACE PINK'	'CITY LIGHTS'*
Longueur du limbe de la feuille (cm)		
moyenne	3,73	2,58
écart-type	0,25	0,17
Longueur du pédoncule (cm)		
moyenne	4,03	6,33
écart-type	0,67	0,76
Diamètre de la fleure (cm)		
moyenne	3,13	2,48
écart-type	0,15	0,13
Couleur de la face supérieure du rayon de l'ombelle (RHS)	80B/78D	85A/B
Couleur de la face inférieure du rayon de l'ombelle (RHS)	80C	85C/D
Couleur du disque de l'ombelle (RHS)	7A	2A
Diamètre du disque de l'ombelle (mm)		
moyenne	9,86	6,33
écart-type	0,69	0,82

* variété de référence

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

Dénomination proposée : **'Skyhawk'**
Numéro de la demande : 00-2197
Date de la demande : 2000/04/06
Requérant : DLF-Trifolium A/S, Heddinge (Danemark)
Mandataire au Canada : Seed-Link Inc., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Cyclone', 'Garrison' et 'Quantum' (voir le tableau 62 à la page114)

Sommaire : *La silique de 'Skyhawk' est plus courte que celles de 'Garrison' et de 'Quantum'. Le pédicelle de 'Skyhawk' est plus court que celui de 'Cyclone' et plus long que celui de 'Quantum'. 'Skyhawk' donne une plante plus courte que 'Garrison'.*

Description : 'Skyhawk' est un canola de printemps. Les cotylédons sont de longueur moyenne. Le limbe des feuilles est vert moyen à vert foncé, ses lobes sont arrondis ainsi que très peu nombreux à peu nombreux, et ses indentations sont peu profondes à moyennes. Les pétales sont jaunes. La silique est courte, son bec est court à moyen, et son pédicelle est long. La plante est de hauteur moyenne et produit des graines noires.

Origine génétique : La variété 'Skyhawk' a été mise au point par la Dansk Planteforædling, division de la DLF-Trifolium A/S, à Store-Heddinge, au Danemark. Le croisement 'Korall' × 'Star' a été réalisé en 1991, et les graines F_1 et F_2 ont été mises en mélange. Une première sélection a été effectuée à la génération F_3, selon les critères suivants : teneur élevée en huile et en protéines, faible teneur en glucosinolates, résistance à la jambe noire, résistance à la verse et précocité de maturation. Des sélections supplémentaires ont été effectuées aux générations F_4 et F_5, en fonction du rendement et du profil des acides gras. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange des graines F_6 de dix sujets F_5.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Skyhawk' ont été réalisés durant les étés 1999 et 2000 à la Station de recherches d'Elora, en Ontario. Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 7 rangs. Les observations ont été faites sur 60 plantes ou parties de plantes. La variété a été mise à l'essai sous la dénomination 'DP44-98'.

Dénomination proposée : **'456-58'**
Numéro de la demande : 00-2267
Date de la demande : 2000/05/17
Requérant : Department of Plant Agriculture, University of Guelph, Guelph (Ontario)
Mandataire au Canada : Parsons Seed Ltd., Beeton (Ontario)

Variétés de référence : 'Summit', 'Lisora' et 'Iris' (voir le tableau 63 à la page 115)

Sommaire : *Les cotylédons de '456-58' sont plus courts que ceux des variétés de référence. Chez '456-58', le bec de la silique est plus long que chez 'Summit' et 'Lisora' mais plus court que chez 'Iris'. Le pédicelle est plus long chez '456-58' que chez les variétés de référence.*

Description : '456-58' est un canola de printemps. Les cotylédons sont courts à moyens. Le limbe des feuilles est vert moyen à vert foncé, ses lobes sont arrondis et en nombre intermédiaire à élevé, et ses indentations sont de profondeur moyenne. Les pétales sont jaunes. La silique est courte à moyenne, son bec est moyen à long, et son pédicelle est moyen à long. La plante est de hauteur moyenne et produit des graines de couleurs mélangées. La résistance à la verse est passable à moyenne. La graine ne renferme pas (0,0 %) d'acide érucique et a une teneur très faible en glucosinolates.

Origine génétique : La variété '456-58' a été mise au point par le Département d'agriculture végétale de l'Université de Guelph, à Guelph, en Ontario. Le croisement 'Spok' × 'Ebony' a été réalisé en 1994, et des sujets dihaploïdes ont été extraits de la génération F_1 en 1995. Les critères de sélection étaient la hauteur de la plante, le rendement, la résistance à la verse et la qualité de l'huile. La semence a été multipliée la première année en plaçant des sacs sur des plants cultivés à l'intérieur, de manière à obtenir par autofécondation des graines dihaploïdes. La deuxième année, la semence a été multipliée en plaçant des sacs sur des sujets cultivés à l'extérieur en pépinière. Par la suite, la semence a été multipliée à plusieurs reprises en parcelles isolées.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de '456-58' ont été réalisés durant les étés 1999 et 2000 à la Station de recherches d'Elora, en Ontario. Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 7 rangs. Les observations ont été faites sur 60 plantes ou parties de plantes.

Tableau 62 : Tableau de comparaison pour 'Skyhawk'

	'SKYHAWK'	'CYCLONE'*	'GARRISON'*	'QUANTUM'*
Jours à floraison	51	52	54	51
Longueur de la silique (mm)				
moyenne	58,60	59,35	64,73	69,60
signification		ns	p<,001	p<,001
Longueur du bec (mm)				
moyenne	10,47	10,52	11,19	8,80
signification		ns	ns	p<,001
Longueur du pédicelle (mm)				
moyenne	28,90	34,03	29,40	24,07
signification		p<,001	ns	p<,001
Jours à la maturité	100	99	100	97
Hauteur de la plante (cm)				
moyenne	123,28	117,37	135,93	118,30
signification		ns	p<,001	ns

* variétés de référence
P - valuer de probabilité
ns - non important
Les moyennes ont été calculées à partir de moyennes établies sur deux ans par observation des caractères des siliques sur 60 plantes et par mesure de la hauteur sur 30 plantes. Les essais ont été réalisés en 1999 et 2000 à la station de recherches d'Elora, à Elora (Ontario). Les différences sont significatives au seuil de probabilité de 1% selon le critère de la plus petite différence significative.

Tableau 63 : Tableau de comparaison pour '458-58'

	'458-58'	'SUMMIT'*	'LISORA'*	'IRIS'*
Largeur du cotylédon(mm)				
moyenne	21,9	27,2	25,9	24,5
signification		p<,001	p<,001	p<,001
Jours à floraison	54	53	52	56
Longueur du bec (mm)				
moyenne	12,54	11,46	11,33	13,72
signification		p<,001	p<,001	p<,001
Longueur du pédicelle (mm)				
moyenne	27,69	25,68	25,80	22,57
signification		p<,001	p<,001	p<,001
Jours à la maturité	99	98	99	103
Hauteur de la plante (cm)				
moyenne	128,52	120,78	132,60	137,98
signification		ns	ns	p<,001

* variétés de référence
P - valuer de probabilité
ns - non important
Les moyennes ont été calculées à partir de moyennes établies sur deux ans par observation des caractères des siliques sur 60 plantes, par mesure de la hauteur sur 30 plantes et par mesure de la largeur sur 50 cotylédons. Les essais ont été réalisés en 1999 et 2000 à la station de recherches d'Elora, à Elora (Ontario). Les différences sont significatives au seuil de probabilité de 1% selon le critère de la plus petite différence significative.

FRÊNE
(*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.)

Dénomination proposée : **'Heuver'** (voir la figure 1)
Nom commercial : **Foothills**
Numéro de la demande : 99-1776
Date de la demande : 1999/08/27
Requérant : Henry Heuver, Calgary (Alberta)
Mandataire au Canada : John Byland, Kelowna (Colombie-Britannique)

Variété de référence : 'Patmore'

Sommaire : *'Heuver' est un frêne vert qui ne produit pas de graines. Le houppier est symétrique, dense et arrondi chez la variété candidate, alors qu'il est plus irrégulier chez 'Patmore'. Les branches sont beaucoup plus épaisses et plus robustes chez 'Heuver' que chez 'Patmore', et elles forment un plus grand angle avec le tronc. 'Heuver' est plus rustique que 'Patmore'; cette dernière pousse plus longtemps en automne, ce qui la rend plus sensible aux dégâts dus au gel. L'écorce de 'Heuver' est grise, lisse et peu fissurée, tandis que celle de 'Patmore' est gris teinté de bronze et plus rugueuse. Les folioles de 'Heuver' sont moins profondément dentées, moins luisantes et d'un vert moins foncé que celles de 'Patmore'. Le pétiole de 'Heuver' est glabre, alors que celui de 'Patmore' affiche une certaine pubescence dans le sillon, particulièrement au niveau du point d'insertion des folioles basales.*

Description : 'Heuver' est un frêne vert à houppier dense, ovale à arrondi, ramifié de manière très symétrique. Les branches sont robustes et forment un grand angle avec le tronc. Le taux de croissance est modéré. Les pousses de un an sont brun clair, glabres, d'épaisseur moyenne, à coupe transversale circulaire. Les faisceaux vasculaires de la cicatrice foliaire sont disposés en forme de « C » ouvert. L'écorce est grise et lisse. Les bourgeons à bois sont moyens à gros, ovoïdes-larges, brun moyen et pubescents; chacun est inséré au-dessus d'une cicatrice foliaire, et les écailles sont valvées (non chevauchantes).

Les feuilles sont composées-pennées. La foliole terminale est elliptique-large et dentée en scie, sa base est cunéiforme, et son sommet est acuminé. Les deux faces du limbe sont glabres, sauf qu'une pubescence clairsemée est présente le long de la nervure principale, sur la face inférieure. La face supérieure du limbe est modérément luisante, vert clair à vert moyen; la face inférieure est verte et moyennement à fortement glauque. Le pétiole est glabre, non ailé, parcouru d'un sillon peu profond.

'Heuver' est une variété dioïque. Les inflorescences sont des panicules produites sur le vieux bois juste sous les nouvelles pousses. Les fleurs possèdent un calice mais sont dépourvues de corolle. Elles sont petites à moyennes et ne sont pas parfumées. La floraison est hâtive. La variété ne produit pas de graines.

Origine génétique : Le frêne vert 'Heuver' a été sélectionné vers la fin des années 70 parmi un groupe de semis issus de matériel rustique provenant du Montana; les graines avaient été récoltées dans une localité de haute altitude soumise à des conditions climatiques extrêmes. Les semis ont été cultivés pendant plusieurs années avant de devenir de grands arbres, à la pépinière Foothills, à Calgary, en Alberta. En août 1987, plusieurs sujets ont été sélectionnés en fonction des critères suivants : port, absence de graines, rusticité, lustre des feuilles et forme générale de l'arbre. Des sélections supplémentaires ont finalement abouti à la variété 'Heuver'.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Heuver' ont été réalisés en 1999 et 2000 à la ferme Glenmore de la pépinière Foothills, à Calgary, en Alberta. Les essais ont porté sur 15 arbres de chaque variété, espacés de 10 pieds sur le rang et de 10 pieds entre les rangs. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 40 mesures pour chacune des variétés.

Tableau 64 : Tableau de comparaison pour 'Heuver'

	'HEUVER'	'PATMORE'*
Longueur de la feuille terminale (cm)		
moyenne	17,4	13,5
écart-type	2,8	1,9
Largeur de la feuille terminale (cm)		
moyenne	19,2	15,3
écart-type	2,7	2,1
Longueur du pétiole (cm)		
moyenne	5,9	4,2
écart-type	0,8	0,8

* variété de référence

IMPATIENTE
(Impatiens hawkeri Bull.)

Dénomination proposée : **'Miami'** (voir la figure 11)
Numéro de la demande : 98-1501
Date de la demande : 1998/10/08
Requérant : Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., Ottawa (Ontario)

Variété de référence : 'Papete'

Sommaire : *La couleur des feuilles est un peu plus pâle chez 'Miami' que chez 'Papete'. Chez 'Miami', le limbe des feuilles présente une pigmentation anthocyanique faible près de la base de la nervure principale, tandis que chez 'Papete' cette pigmentation est d'intensité moyenne et occupe la base et la partie médiane de la nervure principale. Chez 'Miami', la pigmentation anthocyanique est faible à moyenne sur les nervures de la face inférieure du limbe et moyenne sur le pétiole, tandis que chez 'Papete' elle est forte sur les nervures et sur le pétiole. Les fleurs de 'Miami' sont légèrement plus pâles que celles de 'Papete'.*

Description : 'Miami' est une impatiente de Nouvelle-Guinée. Les feuilles sont elliptiques, et leur face supérieure est vert moyen, sans marques. La face inférieure du limbe est verte entre les nervures. La nervure principale de la face supérieure du limbe présente près de la base une faible pigmentation anthocyanique, et les nervures de la face inférieure présentent une pigmentation anthocyanique faible à moyenne. La pigmentation anthocyanique du pétiole est moyenne.

Les fleurs de 'Miami' sont simples. Les pétales sont violet rougeâtre, sans couleur secondaire. La zone de l'œil est petite. La pigmentation anthocyanique du pédoncule est faible à moyenne, et celle de l'éperon est moyenne.

Origine génétique : 'Miami' est issue du croisement H 373N × K 127, réalisé en 1994, à Stuttgart, en Allemagne.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Miami' ont été réalisés dans une serre en plastique, à Frankton (Ontario), au printemps et à l'été 2001. Les essais ont porté sur 10 plants par variété. Tous les plants ont été obtenus à partir de boutures racinées transplantées dans des pots de 10 cm.

Tableau 65 : Tableau de comparaison pour 'Miami'

	'MIAMI'	'PAPETE' *
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	11,5	9,4
écart-type	1,1	1,3
nombre mesurés	9	9
Largeur de la plante (cm)		
moyenne	19,5	19,0
écart-type	2,1	1,3
nombre mesurés	9	9
Longueur du limbe de la feuille (cm)		
moyenne	10,2	8,6
écart-type	1,0	1,2
nombre mesurés	10	10
Couleur de la face supérieure du limbe de la feuille (RHS)	147A	139A
Couleur principale de la face supérieure du pétale (RHS)	N74A-B	N74A mais plus foncé
Couleur de la zone de l'œil (RHS)	60B	60B

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Vienna'** (voir la figure 120)
Numéro de la demande : 98-1503
Date de la demande : 1998/10/08
Requérant : Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., Ottawa (Ontario)

Variété de référence : 'Lycia'

Sommaire : *La pigmentation anthocyanique du pétiole est plus faible chez 'Vienna' que chez 'Lycia'. La couleur principale de la face supérieure des pétales est rose très pâle chez 'Vienna', tandis qu'elle est blanche chez 'Lycia'. La couleur secondaire de la face supérieure des pétales est violet rougeâtre chez 'Vienna', tandis qu'elle est orange rougeâtre chez 'Lycia'. 'Vienna' diffère également de 'Lycia' par la couleur de la zone de l'œil et de la face inférieure des pétales.*

Description : 'Vienna' est une impatiente de Nouvelle-Guinée. Les feuilles sont elliptiques, et leur face supérieure est vert foncé, sans marques. La face inférieure du limbe est verte entre les nervures, faiblement teintée de rouge. La nervure principale de la face supérieure du limbe présente une pigmentation anthocyanique de moyenne intensité, et les nervures de la face inférieure présentent une pigmentation anthocyanique forte à très forte. La pigmentation anthocyanique du pétiole est faible.

Les fleurs de 'Vienna' sont simples. Leur couleur principale est rose très pâle, tandis que leur couleur secondaire est violet rougeâtre. Cette couleur secondaire s'observe principalement sur le pétale supérieur et le long de la nervure principale de tous les pétales. La zone de l'œil est petite. La pigmentation anthocyanique du pédoncule est faible, tandis que celle de l'éperon est très faible.

Origine génétique : 'Vienna' est issue d'un croisement entre Dan 109 et un parent mâle inconnu, réalisé en 1996, à Stuttgart, en Allemagne.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Vienna' ont été réalisés dans une serre en plastique, à Frankton (Ontario), au printemps et à l'été 2001. Les essais ont porté sur 10 plants de la variété candidate et 5 plants de la variété de référence. Tous les plants ont été obtenus à partir de boutures racinées transplantées dans des pots de 10 cm.

Tableau 66 : Tableau de comparaison pour 'Vienna'

	'VIENNA'	'LYCIA' *
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	11,1	12,3
écart-type	1,7	2,0
nombre mesurés	10	5
Largeur de la plante (cm)		
moyenne	20,5	19,2
écart-type	2,8	2,3
nombre mesurés	10	5
Length of leaf blade (cm)		
moyenne	12,0	10,4
écart-type	1,5	1,4
nombre mesurés	10	5
Couleur principale de la face supérieure du pétale (RHS)	69C-D	N155C
Couleur secondaire de la face supérieure du pétale (RHS)	63B à 58C	44B, 44C-D
Couleur principale de la face inférieure du pétale (RHS)	62D	44C, N155C
Couleur de la zone de l'œil (RHS)	N57A-58C	57B, N58C

* variété de référence

LILAS
(*Syringa* L.)

Dénomination proposée : **'Bailbelle'** (voir la figure 10)
Nom commercial : **Tinkerbelle™**
Numéro de la demande : 99-1863
Date de la demande : 1999/11/22
Requérant : Bailey Nurseries Inc., St. Paul, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Jeffries Nurseries Ltd., Portage la Prairie (Manitoba)

Variétés de référence : *Syringa meyeri* 'Palibin' (type coréen nain) et *Syringa patula* 'Miss Kim'

Sommaire : *'Bailbelle' est un lilas hybride à port buissonnant arrondi et à houppier dense semblable à celui de 'Palibin' mais très différent de ceux de 'Miss Kim' et de la plupart des autres lilas. La feuille a un petit limbe arrondi chez 'Bailbelle', alors qu'elle a un limbe ové-large chez 'Palibin' et un grand limbe ové chez 'Miss Kim'. Le dessous du limbe est densément pubescent chez la variété candidate, alors qu'il a une pubescence clairsemée chez les variétés de référence. Les pédicelles sont densément pubescents chez 'Bailbelle' alors qu'ils ont une pubescence moyenne chez 'Palibin' et clairsemée chez 'Miss Kim'. Le principal caractère distinctif est la couleur des boutons floraux et des fleurs, qui sont roses chez 'Bailbelle', alors qu'ils sont plutôt violets chez les variétés de référence.*

Description : 'Bailbelle' est un lilas à port buissonnant et globuleux et à feuillage dense. Les jeunes pousses ont une pigmentation anthocyanique très forte et une pubescence dense. L'écorce des pousses de un an est brun rougeâtre et porte un nombre intermédiaire de lenticelles. Les feuilles sont petites, arrondies et lisses. Leur sommet est aigu, leur base est arrondie, et leur marge est faiblement ondulée. En coupe transversale, le limbe est fortement concave. Le dessus du limbe est vert moyen, mat, modérément pubescent, non glauque. Le dessous est vert clair, fortement pubescent, non glauque.

La floraison survient à la mi-saison. Les inflorescences sont des panicules dressées, issues de bourgeons latéraux et de bourgeons terminaux. Le pédoncule et les pédicelles sont fortement pubescents. Les fleurs sont simples. Les quatre lobes de la corolle ont un sommet arrondi. Leur section transversale est plate ou cupuliforme. Le tube de la corolle est en forme d'entonnoir et long (jusqu'à une fois et demie le diamètre). Les boutons floraux sont rose foncé, tandis que les fleurs ouvertes sont rose clair avec le tube plus foncé. Les étamines mesurent plus d'une demi-fois la longueur du tube de la corolle, et les anthères sont violettes. Les fleurs sont très parfumées.

Origine génétique : 'Bailbelle' est issue d'un croisement entre le *Syringa meyeri* 'Palibin' et le *Syringa microphylla* 'Superba'. La sélection initiale a été faite en 1985 au Dakota du Nord. Les critères de sélection étaient la rusticité et la couleur des fleurs.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Bailbelle' ont été réalisés en 2000 et 2001 dans les installations de la Jeffries Nurseries, à Portage la Prairie (Manitoba). Les essais ont porté sur 10 sujets cultivés en plein champ, espacés de 2 pieds, ainsi que sur 10 sujets cultivés dans des pots de 2 gallons. Les sujets cultivés en pots sont issus de boutures herbacées mises à raciner la première année, plantées dans des pots de 1 gallon la deuxième année et transplantées dans les pots de 2 gallons la troisième année. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures, prises chez les sujets cultivés en pots.

Tableau 67 : Tableau de comparaison pour 'Bailbelle'

	'BAILBELLE'	'PALIBIN'*	'MISS KIM'*
Longueur du limbe de la feuille (cm)			
moyenne	30,5	30,2	74,8
écart-type	3,95	1,81	12,41
Largeur du limbe de la feuille (cm)			
moyenne	28,5	28,4	40,1
écart-type	4,75	2,41	6,79
Longueur du pédoncule (mm)			
moyenne	6,9	7,4	11,2
écart-type	1,29	0,84	2,2
Diamètre de la corolle (mm)			
moyenne	9,8	8,4	6,9
écart-type	0,79	1,17	0,74
Couleur du bourgeon floral non ouvert (RHS)	60D	77B	77A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	65C à 65D	75C	76D
Couleur de la face interne des lobes de la corolle (RHS)	65C à 65D	75C	76D mais plus pâle
Couleur de la face externe du tube de la corolle (RHS)	67B	75C	84B

* variétés de références

LIN
(*Linum usitatissimum* L.)

Dénomination proposée : **'AC Nugget'** (voir la figure 9)
Dénomination antérieurement proposée : **'FP2002'**
Numéro de la demande : 98-1375
Date de la demande : 1998/05/04
Requérant : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Morden (Manitoba)
Mandataire au Canada : Golden Seed Farms, Fort Qu'Appelle (Saskatchewan)
Sélectionneur : E.O. Kenaschuk, Morden (Manitoba)

Variétés de référence : 'Flanders', 'Omega' et '989'

Sommaire : *Le sommet des filets et le sommet des styles sont bleus chez 'AC Nugget', alors qu'ils sont blancs chez 'Omega'. Les stigmates sont violet pâle chez 'AC Nugget', alors qu'ils sont blancs chez 'Omega'. Les fausses-cloisons de la capsule ne sont pas ciliées chez 'AC Nugget', alors qu'elles le sont chez '989' et 'Omega'. Les graines de 'AC Nugget' sont jaunes, alors que celles de 'Flanders' sont brunes. Les graines de 'AC Nugget' ont une faible teneur en acide linoléique et une forte teneur en acide linolénique, tandis que celles de '989' ont une forte teneur en acide linoléique et une faible teneur en acide linolénique.*

Description : 'AC Nugget' est un lin oléagineux. L'hypocotyle présente une faible pigmentation anthocyanique. La fleur est de grandeur moyenne et a la forme d'un disque aplati. Les pétales sont bleu moyen et n'ont pas de plissure longitudinale. Les sépales ne sont pas mouchetés. Les filets sont bleus au sommet et blancs à la base. Les anthères sont bleues, et le pollen est translucide. Les styles sont bleus à la base et violets au sommet. Les stigmates sont violets.

La précocité de maturation est intermédiaire. La capsule est de grosseur moyenne, demi-déhiscente, à fausses-cloisons non ciliées. Les graines sont jaunes ainsi que petites à moyennes.

'AC Nugget' est modérément résistante à la flétrissure fusarienne (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lini*) et résistante aux races nord-américaines de la rouille (*Melampsora lini*).

'AC Nugget' résiste bien à l'égrenage et à la chute des capsules, et sa résistance à la verse est passable à bonne. Sa capacité de produire des ramifications basales est moyenne.

Origine génétique : 'AC Nugget' a été mise au point à la Station de recherches de Morden, à Morden, au Manitoba. Elle est issue du rétrocroisement AFP 9007/Flanders. AFP 9007 est un spécimen d'Allemagne chez lequel la couleur jaune des graines est contrôlée par un seul gène dominant. Une lignée BC^5F_4 a été sélectionnée en 1995; chez cette lignée, la couleur jaune des graines était stable, et les caractères agronomiques ou reliés à la qualité des produits étaient semblables à ceux du parent récurrent, 'Flanders'. La lignée a été soumise à des essais préliminaires de rendement en 1996, au Manitoba, sous la dénomination M4853.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'AC Nugget' ont été réalisés au Centre de recherches de Morden, à Morden (Manitoba), en 1999 et 2000, à raison de 3 répétitions par variété. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 100 mesures par année d'essai.

Tableau 69 : Tableau de comparaison pour 'AC Nugget'

	'AC NUGGET'	'FLANDERS'*	'OMEGA'*	'989'*
Hauteur de la plante (cm)				
moyenne	60,4	56,7	60,0	66,4
écart-type	5,8	5,3	6,2	6,5
Longueur de l'axe central de la plante (cm)				
moyenne	58,9	56,6	60,0	64,9
écart-type	7,4	5,4	6,3	12,0
Longueur de la graine (mm)				
moyenne	4,9	4,8	5,0	4,9
écart-type	0,2	0,2	0,2	0,1
Largeur de la graine (mm)				
moyenne	2,5	2,5	2,7	2,,5
écart-type	0,2	0,2	0,3	0,2
Poids de la graine (g/1000 graines)	5,6	5,4	5,7	5,8
Teneur en protéine (%)	36,7	36,1	36,6	36,0
Teneur en huile (%)	45,0	43,7	43,0	41,5
Teneur en acide palmitique (%)	4,9	5,0	5,2	6,2
Teneur en acide stearique (%)	4,2	4,4	3,7	3,8
Teneur en acide oléique (%)	20,1	20,9	22,0	16,1

Teneur en acide linoléique (%)			
13,3	13,7	16,2	71,6
Teneur en acide Linolenique (%)			
57,4	56,0	52,9	2,1
Nombre d'iode			
190,5	188,1	185,5	143,5

* variétés de référence

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium* × *hortorum* L.H. Bailey)

Dénomination proposée : **'Klecona'**
Nom commercial : Arcona 2000
Numéro de la demande : 01-2563
Date de la demande : 2001/03/15
Requérant : Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'Fisgenta' et 'Fispurple'

Sommaire : *Les pédoncules de 'Klecona' sont plus courts que ceux de 'Fisgenta', et leur pigmentation anthocyanique est plus faible. La fleur de 'Klecona' compte moins de pétales que celle des variétés de référence. 'Klecona' diffère légèrement des variétés de référence par la couleur de ses fleurs et par le fait que ses pétales ne portent aucune marque, contrairement à ceux de 'Fisgenta'.*

Description : 'Klecona' est une variété de géranium commun à port intermédiaire. Les tiges sont vertes, minces à moyennes, moyennement pubescentes. Le limbe a une forme de type 1. Sa base est ouverte à fermée, ses lobes sont faiblement développés, avec des incisions peu profondes, et son bord est crénelé et moyennement ondulé. La face supérieure du limbe est moyennement pubescente. La feuille est vert moyen, sans panachure. La zone de la feuille est faiblement à moyennement distincte chez les jeunes feuilles, très faiblement distincte chez les feuilles plus vieilles. Cette zone est brun rougeâtre, en position normale. Le pétiole présente une pubescence dense.

'Klecona' produit des inflorescences violet rougeâtre, en nombre faible à intermédiaire. Le pédoncule présente une pubescence dense et une faible pigmentation anthocyanique. Les boutons floraux sont ronds, et les fleurs sont semi-doubles. Le bord des pétales est entier. Il y a une petite zone blanche à la base des pétales supérieurs. Les pétales ne portent pas de marques. Les pédicelles présentent une pubescence moyenne, et leur tiers médian est rouge moyen. Les sépales sont vert et rouge et présentent une pubescence dense.

Origine génétique : 'Klecona' est issue d'un croisement entre 'Klevette' et ZJ 099 réalisé en 1992 dans le cadre d'un programme de sélection contrôlée, à Stuttgart, en Allemagne. Les semis ont été sélectionnés en juin 1993 pour leurs fleurs doubles, la couleur de leurs fleurs, leur port compact dressé et leur floraison hâtive.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Klecona' ont été réalisés dans une serre en plastique, à Frankton (Ontario), au printemps et à l'été 2001. Les essais ont porté sur 10 plants par variété. Tous les plants ont été obtenus à partir de boutures racinées transplantées dans des pots de 10 cm. Tous les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 70 : Tableau de comparaison pour 'Klecona'

	'KLECONA'	'FISPURPLE'*	'FISGENTA'*
Longueur du pédoncule (cm)			
mean	15,8	17,4	15,2
std, deviation	1,6	2,2	1,4
Nombre de pétale			
mean	7,7	8,3	10,3
std, deviation	0,8	1,1	0,7
Couleur du pétale supérieure (RHS)			
face supérieure			
- zone marginale	N57A	N57A	N57A
- zone centrale	N57A (base 43C-D)	45B-46C (base 43C)	N57A (base 43C-D)
face inférieure	52A (avec 50A-43C vers la base)	52A (avec 58C vers la zone marginale)	52C
Couleur du pétale inférieure (RHS)			
face supérieure			
- zone marginale	N57A	N57A	N57B
- zone centrale	N57B	N57B	N57B
face inérieure	58C	52A (avec 58C et blanc)	58B-C
Colour of inner petal (RHS)			
face supérieure			
- *zone centrale*	N57A	N57A	N57B

* variétés de références

Dénomination proposée : **'Klesatha'**
Nom commercial : Samantha
Numéro de la demande : 01-2564
Date de la demande : 2001/03/15
Requérant : Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., Ottawa (Ontario)

Variété de référence : 'Fissamba'

Sommaire : *'Klesatha' donne une plante plus courte que 'Fissamba'. La zone de la feuille est moins distincte chez 'Klesatha' que chez 'Fissamba'. Le pétiole est renflé à la base chez 'Klesatha', tandis qu'il est renflé près de sa partie médiane chez 'Fissamba'. Les pédicelles de 'Klesatha' sont plus longs que ceux de 'Fissamba'.*

Description : 'Klesatha' est une variété de géranium commun à port dressé à intermédiaire. Les tiges sont vertes, d'épaisseur moyenne, moyennement pubescentes. Le limbe a une forme de type 1. Sa base est ouverte, ses lobes sont faiblement à moyennement développés, avec des incisions peu profondes à moyennement profondes, et son bord est crénelé et faiblement à moyennement ondulé. La pubescence de la face supérieure du limbe est clairsemée à moyenne. La feuille est vert clair à vert moyen, sans panachure. La zone de la feuille est très faiblement distincte, rarement présente chez les jeunes feuilles, verte, en position normale. La pubescence du pétiole est moyenne à dense.

La floraison de 'Klesatha' est hâtive. Les inflorescences sont rouges, en nombre faible à intermédiaire. Le pédoncule présente une pubescence dense et une pigmentation anthocyanique faible à moyenne. Le pédoncule est renflé à la base. Les boutons floraux sont elliptiques, et les fleurs sont semi-doubles. Le bord des pétales est entier. Il y a une très petite zone blanche à la base des pétales supérieurs. Les pétales ne portent pas de marques. Les pédicelles présentent une pubescence moyenne à dense, et leur tiers médian est rouge moyen. Il n'y a pas de renflement. Les sépales sont vert et rouge et moyennement pubescents.

Origine génétique : 'Klesatha' est issue d'un croisement entre 'Klespri' et Z1 174 réalisé en 1992 dans le cadre d'un programme de sélection contrôlée, à Stuttgart, en Allemagne. Les semis ont été sélectionnés en juin 1993 pour leurs fleurs doubles, la couleur de leurs fleurs, leur port compact dressé et leur floraison hâtive.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Klesatha' ont été réalisés dans une serre en plastique, à Frankton (Ontario), au printemps et à l'été 2001. Les essais ont porté sur 10 plants par variété. Tous les plants ont été obtenus à partir de boutures racinées transplantées dans des pots de 10 cm. Tous les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 71 : Tableau de comparaison pour 'Klesatha'

	'KLESATHA'	'FISSAMBA'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	9,7	14,1
écart-type	1,2	1,5
Couleur du pétale supérieure (RHS)		
face supérieure		
- zone marginale	44B	44B
- zone centrale	44B-41A	44B-40A
face inférieure	41A (avec 40A vers la base)	40A (avec 40B vers la base)
Couleur du pétale inférieure (RHS)		
face supérieure		
- zone marginale	44B	44B
- *zone centrale*	44B (avec 50A dans la zone centrale)	44B
face inférieure	43B (43C/50A dans la zone marginale)	43B (40A/50A dans la zone marginale)
Couleur du pétale inférieure (RHS)		
face supérieure		
- zone centrale	44B	44B
Longueur du pédicelle (cm)		
moyenne	3,4	2,6
écart-type	0,4	0,3

* variété de référence

PERVENCHE (*Vinca major* L.)

Dénomination proposée : **'Wojo's Jem'** (voir la figure 43)
Numéro de la demande : 00-2268
Date de la demande : 2000/05/17
Requérant : Joseph Wojciechowski, Ortonville, Michigan (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Variétés de référence : 'Maculata' et 'Variegata'

Sommaire : *Chez 'Wojo's Jem', les tiges sont de couleur ivoire et ont une faible pigmentation anthocyanique alors que chez 'Variegata' elles sont vert moyen et ne présentent aucune pigmentation anthocyanique. Les entre-nœuds sont plus courts chez la variété candidate que chez les variétés de référence, et les feuilles sont un peu plus grandes. Le dessus des feuilles est de couleur principale ivoire chez 'Wojo's Jem', alors qu'il est de couleur principale vert clair chez 'Maculata' et vert moyen chez 'Variegata'; il est de couleur secondaire vert foncé chez 'Wojo's Jem', alors qu'il est de couleur secondaire vert clair chez 'Maculata' et blanche chez 'Variegata'.*

Description : 'Wojo's Jem' est une pervenche à port retombant et peu ramifié. Les tiges sont lisses, glabres, non glauques, de couleur ivoire, avec une faible pigmentation anthocyanique. Leur diamètre est petit à moyen.

Les feuilles sont opposées, simples, pétiolées et ovées; leur sommet est obtus, leur base est tronquée, et leur marge est entière. Le limbe est panaché; le dessus est de couleur principale ivoire et de couleur secondaire vert foncé. La couleur secondaire occupe une superficie moyenne à grande, sur la marge du limbe.

Origine génétique : La variété 'Wojo's Jem' est issue d'une mutation somatique apparue spontanément chez le *Vinca major* 'Maculata'. Cette mutation a été découverte et sélectionnée en 1996, à Ortonville (Michigan), par Joseph Wojciechowski. La variété a été sélectionnée pour son feuillage panaché distinctif.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Wojo's Jem' ont été menés en 2000 à Oxford Station, en Ontario. Les essais ont porté sur dix sujets par variété, cultivés à l'extérieur. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 72 : Tableau de comparaison pour 'Wojo's Jem'

	'WOJO'S JEM'	'MACULATA'*	'VARIEGATA'*
Longueur de la tige entre deux point nodals (cm)			
moyenne	7.25	9.00	12.33
écart-type	0.82	0.71	0.61
Longueur du limbe de la feuille (cm)			
moyenne	4.29	3.81	3.67
écart-type	0.49	0.46	0.52
Largeur du limbe de la feuille (cm)			
moyenne	3.42	2.57	3.21
écart-type	0.38	0.35	0.39
Couleur principale de la face supérieure du limbe de la feuille (RHS)	4C/D	144C	146B
Couleur secondaire de la face supérieure du limbe de la feuille (RHS)	147A	146B	145D

* variétés de références

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

Dénomination proposée : **'SW PARADE'** (voir la figure 13)
Numéro de la demande : 99-1573
Date de la demande : 1999/03/19
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variété de référence : 'Majoret'

Sommaire : *'SW PARADE' est une variété de pois des champs semi-aphylle à cotylédons verts. Les macules des stipules sont moyennement denses chez 'SW PARADE', alors qu'elles sont clairsemées chez 'Majoret'. La gousse est très faiblement incurvée chez 'SW PARADE', alors qu'elle est très fortement incurvée chez 'Majoret'. La maturation des graines est hâtive chez 'SW PARADE', alors qu'elle est intermédiaire chez 'Majoret'. Les graines de 'SW PARADE' sont plus légères et ont une teneur en protéines moins élevée que celles de 'Majoret'.*

Description : 'SW PARADE' est une variété de pois des champs semi-aphylle à cotylédons verts et à tiges non fasciées. La plante est vert jaune et dépourvue de pigmentation anthocyanique. La tige est de longueur moyenne. Les stipules sont normales et portent une densité moyenne de macules; il n'y a pas de stipules en forme d'oreilles de lapin.

'SW PARADE' fleurit à la mi-saison. Il y a deux fleurs par nœud. L'étendard est blanc, et sa base est arquée.

La gousse est verte, entièrement parcheminée et très faiblement incurvée; la suture où sont portées les graines est concave. L'extrémité distale de la gousse est tronquée, et il y a en moyenne six ou sept ovules par gousse. À l'état immature, la graine est vert clair. À l'état sec, elle est sphérique, sa grosseur

est moyenne, ses cotylédons sont verts, et son hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses. La maturation est hâtive.

Origine génétique : La variété 'SW PARADE' a été mise au point par sélection généalogique à Svalöv, en Suède, à partir d'un croisement réalisé en 1990. Elle est issue d'un sujet unique sélectionné parmi la génération F_3. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la précocité, la résistance à la verse, la couleur des cotylédons et la vigueur des vrilles. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange de graines F_8.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés en 1998 et 1999 à Nipawin, en Saskatchewan, à raison de 2 répétitions par variété et d'environ 236 sujets par répétition. Chaque parcelle était large de 1,75 mètre et longue de 3,25 mètres et renfermait 42 plantes par m^2. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures par année d'essai.

Tableau 73 : Tableau de comparaison pour 'SW PARADE'

	'SW PARADE'	'MAJORET'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	49,4	55,7
étendue	26-71	26-99
écart-type	11,03	12,53
Longueur de la gousse (cm)		
moyenne	6,9	7,6
étendue	5,5-8,1	6,4-8,8
écart-type	0,57	0,64
Poids de la graine (g/1000 graines)	232,5	253,0
Teneur en protéines		
pourcentage	22,7	24,9

* variété de référence

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

Dénomination proposée : **'Amandine'** (voir la figure 14)
Numéro de la demande : 99-1568
Date de la demande : 1999/03/12
Requérant : Germicopa SA, Quimper (France)
Mandataire au Canada : Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Dali'

Sommaire : *Les feuilles sont vert foncé chez 'Amandine', tandis qu'elles sont vert jaunâtre chez 'Yukon Gold'. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée chez 'Amandine', tandis qu'elle est ouverte chez 'Yukon Gold'. La base de la foliole terminale et des folioles primaires est généralement asymétrique chez 'Amandine', alors qu'elle est habituellement symétrique chez les variétés de référence. 'Amandine' produit un nombre plus élevé d'inflorescences que les variétés de référence. Les fleurs de 'Amandine' sont violet rouge, alors que celles de 'Dali' sont blanches. Le tubercule est long chez 'Amandine', alors qu'il est rond chez 'Yukon Gold' et oblong chez 'Dali'. Le germe est conique chez 'Amandine', tandis qu'il est ovoïde chez 'Yukon Gold' et cylindrique large chez 'Dali'. La pubescence de la base du germe est faible chez 'Amandine', tandis qu'elle est moyenne chez 'Yukon Gold' et moyenne à forte chez 'Dali'. La pubescence du sommet du germe est faible chez 'Amandine', alors qu'elle est forte chez 'Dali'. La pigmentation anthocyanique du sommet du germe est violet rouge et forte chez 'Amandine', tandis qu'elle est violet rouge et nulle à faible chez 'Yukon Gold' et violet bleu et d'intensité moyenne chez 'Dali'. Les lenticelles sont fortement protubérantes chez 'Amandine', alors qu'elles sont peu protubérantes chez les variétés de référence.*

Description : 'Amandine' donne une plante semi-dressée, courte à moyenne et de type rameux. La tige est d'épaisseur moyenne et a une faible pigmentation anthocyanique. Les ailes caulinaires sont droites et moyennement proéminentes, et on en trouve des simples et des doubles sur le même plant. Les nœuds sont légèrement renflés et n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La tige est très fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert foncé, et leur surface inférieure présente une pubescence moyenne. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée. Le dessus du rachis est modérément pubescent, et le dessous est glabre. Le dessus et le dessous du

rachis n'ont pas de pigmentation anthocyanique. Le pétiole n'est pas anthocyané. Les stipules sont petites à moyennes. La foliole terminale est moyennement ovée; son sommet est acuminé, sa base est cordée et très asymétrique, et son bord est faiblement ondulé. Il y a cinq ou six paires de folioles primaires; ces folioles sont de grandeur moyenne et étroitement ovées, leur sommet est aigu, et leur base est cordée et fortement asymétrique.

'Amandine' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences, et celles-ci ont un nombre intermédiaire de fleurs. Le bouton floral a une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne et est persistant. Les fleurs complètement épanouies sont violet rouge. Les faces interne et externe de la corolle ont une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne. La corolle est de grandeur moyenne et forme une étoile moyennement proéminente. La pigmentation anthocyanique du calice est d'intensité moyenne, et celle du pédoncule est faible. Lorsque la fleur est complètement épanouie, les anthères sont orange et forment un cône large. Le stigmate est capité et vert moyen.

Le tubercule est long. La peau est lisse, jaune pâle, sans couleur secondaire. Les yeux, en nombre peu élevé, sont peu profonds et se trouvent surtout dans la région apicale. Les arcades sont non proéminentes. La chair est jaune pâle, sans couleur secondaire. 'Amandine' produit un nombre moyen de tubercules.

Le germe est conique. La base présente une pubescence faible et une pigmentation anthocyanique violet rouge d'intensité moyenne. Le sommet a un port intermédiaire entre fermé et ouvert, est faiblement pubescent et a une forte pigmentation anthocyanique violet rouge. La fréquence d'émergence des racines est moyenne, les lenticelles sont fortement protubérantes, et les ramifications latérales sont de longueur moyenne.

Origine génétique : 'Amandine' est issue d'un croisement 'Mariana' × 'Charlotte' réalisé en 1981 à Châteauneuf-du-Faou, en France. Les essais ont été menés de 1983 à 1991 en France, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Les critères de sélection étaient l'apparence, le rendement, la résistance aux maladies et aux ravageurs et la qualité culinaire du tubercule.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Amandine' ont été menés en 2000 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de quatre répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,5 mètres. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Sauf indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 74 : Tableau de comparaison pour 'Amandine'

	'AMANDINE'	'YUKON GOLD'*	'DALI'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires			
	15-26	16-25	10-30
Couleur RHS de la face inférieure de la corolle			
	76A (pointes blanches)	76B (pointes blanches)	155B
Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	107,3	71,9	89,2
écart-type	12,7	7,6	10,2
étendue	86-135	57-88	65-108
Largeur du tubercule (mm)			
moyenne	52,8	69,4	61,6
écart-type	4,9	6,2	6,8
étendue	42-60	57-80	50-75
Épaisseur du tubercule (mm)			
moyenne	44,5	56,3	50,1
écart-type	3,0	4,8	4,6
étendue	40-50	48-66	40-58

* variétés de références

Dénomination proposée : **'Sandy'** (voir la figure 15)
Numéro de la demande : 99-1569
Date de la demande : 1999/03/12
Requérant : Germicopa SA, Quimper (France)
Mandataire au Canada : Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Germicopa SA, Quimper (France)

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Atlantic'

Sommaire : *La tige de 'Sandy' présente une pigmentation anthocyanique plus forte que celles des variétés de référence. Les feuilles sont vert foncé chez 'Sandy', tandis qu'elles sont vert jaunâtre chez 'Yukon Gold' et vert olive à vert moyen chez 'Atlantic'. 'Sandy' produit un nombre plus élevé d'inflorescences que 'Yukon Gold'. Le bouton floral est très persistant chez 'Sandy', alors qu'il est peu persistant chez 'Yukon Gold'. Les fleurs de 'Sandy' sont violet rouge, alors que celles des variétés de référence sont violet rouge pâle avec les extrémités blanches. Le calice et le pédoncule présentent une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne chez*

'Sandy' et faible chez les variétés de référence. La peau du tubercule est havane et réticulée chez 'Sandy', tandis qu'elle est jaune pâle et lisse chez 'Yukon Gold' et chamois et squameuse à réticulée chez 'Atlantic'. Le germe de 'Sandy' est conique et sa base est glabre, tandis que le germe des variétés de référence est ovoïde et leur base est moyennement pubescente. La pigmentation anthocyanique de la base du germe est violet rouge chez 'Sandy', tandis qu'elle est violet bleu chez 'Atlantic'. Le sommet du germe a un port intermédiaire entre fermé et ouvert chez 'Sandy', et fermé chez les variétés de référence. La pigmentation anthocyanique du sommet du germe est moyenne à forte chez 'Sandy', tandis qu'elle est nulle à très faible chez les variétés de référence. La fréquence d'émergence des racines est moyenne chez 'Sandy', tandis qu'elle est faible chez les variétés de référence. Les lenticelles sont fortement protubérantes chez 'Sandy', alors qu'elles sont peu protubérantes chez les variétés de référence.

Description : 'Sandy' donne une plante dressée, haute et de type rameux. La tige est d'épaisseur moyenne et a une forte pigmentation anthocyanique. Les ailes caulinaires sont proéminentes, sinueuses et simples. Les nœuds sont légèrement renflés et n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La tige est très fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert foncé, et leur surface inférieure est la plupart du temps glabre. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée. Le dessus du rachis est très peu pubescent, et le dessous est glabre. La pigmentation anthocyanique du dessus du rachis est faible, et celle du dessous est nulle. Le pétiole est faiblement anthocyané. Les stipules sont grandes. La foliole terminale est étroitement ovée; son sommet est aigu à acuminé, sa base est obtuse à cordée et fortement asymétrique, et son bord est moyennement ondulé. Il y a six paires de folioles primaires; ces folioles sont de grandeur moyenne et étroitement ovées, leur sommet est aigu à acuminé, et leur base est cordée et fortement asymétrique.

'Sandy' produit un nombre intermédiaire à élevé d'inflorescences, et celles-ci ont un nombre intermédiaire de fleurs. Le bouton floral a une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne et est persistant. Les fleurs complètement épanouies sont violet rouge. Les faces interne et externe de la corolle ont une forte pigmentation anthocyanique. La corolle est grande et forme une étoile moyennement proéminente. Le calice et le pédoncule ont une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne. Lorsque la fleur est complètement épanouie, les anthères sont orange et forment un cône étroit. Le stigmate est capité et vert moyen.

Le tubercule est rond. La peau est réticulée, havane, sans couleur secondaire. Les yeux, en nombre intermédiaire, sont profonds et distribués uniformément. Les arcades sont non proéminentes. La chair est jaune pâle, sans couleur secondaire. 'Sandy' produit un nombre moyen de tubercules.

Le germe est conique. La base est glabre et présente une forte pigmentation anthocyanique violet rouge. Le sommet a un port intermédiaire entre fermé et ouvert, est faiblement pubescent et a une pigmentation anthocyanique violet rouge moyenne à forte. La fréquence d'émergence des racines est moyenne, les lenticelles sont fortement protubérantes, et les ramifications latérales sont courtes.

Origine génétique : 'Sandy' est issue d'un croisement 'Saturna' × 'Vakon' réalisé en 1982 à Châteauneuf-du-Faou, en France. Les essais ont été menés de 1984 à 1993 en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne et en Angleterre. Les critères de sélection étaient le rendement, la résistance aux maladies et aux ravageurs et la qualité pour la confection de frites.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Sandy' ont été menés en 2000 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de quatre répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,5 mètres. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Sauf indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 75 : Tableau de comparaison pour 'Sandy'

	'SANDY'	'YUKON GOLD'*	'ATLANTIC'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires	10-16	16-25	11-19
Couleur RHS de la face inférieure de la corolle	86C	76B (pointes blanches)	76B (pointes blanches)

* variétés de références

Dénomination proposée : **'Cynthia'** (voir la figure 16)
Numéro de la demande : 99-1570
Date de la demande : 1999/03/12
Requérant : Germicopa SA, Quimper (France)
Mandataire au Canada : Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Germicopa SA, Quimper (France)

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Morning Gold'

Sommaire : *Les feuilles sont vert moyen chez 'Cynthia', tandis qu'elles sont vert jaunâtre chez 'Yukon Gold'. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée chez 'Cynthia', tandis qu'elle est ouverte chez 'Yukon Gold'. La base de la foliole terminale est généralement asymétrique chez 'Cynthia', alors qu'elle est habituellement symétrique chez les variétés de référence. 'Cynthia' produit moins de folioles secondaires et tertiaires que les variétés de référence. Le nombre d'inflorescences est peu élevé chez 'Cynthia', tandis qu'il est intermédiaire à élevé chez 'Morning Gold'. Les fleurs de 'Cynthia' sont blanches, alors que celles de 'Yukon Gold' sont violet rouge. La corolle forme une étoile faiblement proéminente chez 'Cynthia', tandis qu'elle forme une étoile modérément à fortement proéminente chez les variétés de référence. Le tubercule est ovale à oblong chez 'Cynthia', alors qu'il est rond chez les variétés de référence. Le germe est conique chez 'Cynthia', tandis qu'il est ovoïde chez 'Yukon Gold' et cylindrique large chez 'Morning Gold'. La pigmentation anthocyanique du germe est violet rouge chez 'Cynthia', tandis qu'elle est violet bleu chez 'Morning Gold'. La pigmentation anthocyanique de la base du germe est faible chez 'Cynthia', tandis qu'elle est d'intensité moyenne chez les variétés de référence. La pigmentation anthocyanique du sommet du germe est d'intensité moyenne chez 'Cynthia', tandis qu'elle est nulle à faible chez 'Yukon Gold'. Les lenticelles sont faiblement protubérantes chez 'Cynthia', alors qu'elles sont fortement protubérantes chez 'Morning Gold'.*

Description : 'Cynthia' donne une plante semi-dressée, de hauteur moyenne et de type intermédiaire entre rameux et feuillu. La tige est d'épaisseur moyenne et a une faible pigmentation anthocyanique. Les ailes caulinaires sont moyennement proéminentes, droites et doubles. Les nœuds ne sont pas renflés et n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La tige est très fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert moyen, et leur surface inférieure présente une pubescence moyenne. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée. Le dessus du rachis est faiblement pubescent, et le dessous est glabre. La pigmentation anthocyanique du dessus du rachis est faible, et celle du dessous est nulle. Le pétiole est faiblement anthocyané. Les stipules sont de grandeur moyenne. La foliole terminale est étroitement à moyennement ovée; son sommet est aigu à acuminé, sa base est obtuse à cordée et fortement asymétrique, et son bord est faiblement ondulé. Il y a cinq paires de folioles primaires; ces folioles sont de grandeur moyenne et étroitement ovées, leur sommet est aigu, et leur base est cordée et moyennement asymétrique.

'Cynthia' produit un nombre peu élevé d'inflorescences, et celles-ci ont un nombre peu élevé de fleurs. Le bouton floral a une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne et est peu persistant. Les fleurs complètement épanouies sont blanches. Les faces interne et externe de la corolle n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La corolle est de grandeur moyenne et forme une étoile faiblement proéminente. Le calice a une faible pigmentation anthocyanique, et le pédoncule n'est pas anthocyané. Lorsque la fleur est complètement épanouie, les anthères sont orange et forment un cône piriforme. Le stigmate est capité et vert moyen.

Le tubercule est ovale à oblong. La peau est lisse, principalement jaune, sans couleur secondaire. Les yeux, en nombre intermédiaire, sont de profondeur intermédiaire et distribués uniformément. Les arcades sont non proéminentes. La chair est jaune moyen, sans couleur secondaire. 'Cynthia' produit un nombre moyen de tubercules.

Le germe est conique. La base présente une pubescence moyenne et une faible pigmentation anthocyanique violet rouge. Le sommet a un port fermé, est faiblement pubescent et a une pigmentation anthocyanique violet rouge d'intensité moyenne. La fréquence d'émergence des racines est faible, les lenticelles sont peu protubérantes, et les ramifications latérales sont de longueur moyenne.

Origine génétique : 'Cynthia' est issue d'un croisement 'Landia' × 'O'Sirene' réalisé en 1983 à Châteauneuf-du-Faou, en France. Les essais ont été menés de 1985 à 1993 en France, en Italie, en Allemagne et en Angleterre.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Cynthia' ont été menés en 2000 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de quatre répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,5 mètres. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Sauf indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 76: Tableau de comparaison pour 'Cynthia'

	'CYNTHIA'	'YUKON GOLD'*	'MORNING GOLD'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires	5-9	16-25	13-26
Couleur RHS de la face inférieure de la corolle	155B	76B (pointes blanches)	155B

Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	83,6	71,9	72,2
std. deviation	9,8	7,6	7,6
étendue	70-105	57-88	60-90
Largeur du tubercule (mm)			
moyenne	60,7	69,4	70,2
écart-type	3,3	6,2	4,7
étendue	55-68	57-80	64-80

° variétés de références

Dénomination proposée : **'Marine'** (voir la figure 17)
Numéro de la demande : 99-1571
Date de la demande : 1999/03/12
Requérant : Germicopa SA, Quimper (France)
Mandataire au Canada : Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Germicopa SA, Quimper (France)

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Dali'

Sommaire : *'Marine' a une tige épaisse et fortement anthocyanée, tandis que les variétés de référence ont une tige mince à moyenne faiblement à moyennement anthocyanée. Les feuilles sont vert jaunâtre chez 'Marine', tandis qu'elles sont vert moyen chez 'Dali'. La pigmentation anthocyanique du pétiole est d'intensité moyenne chez 'Marine', tandis qu'elle est nulle à faible chez les variétés de référence. La base de la foliole terminale est cordée et fortement asymétrique chez 'Marine', alors qu'elle est aiguë à obtuse et fortement symétrique chez 'Yukon Gold'. Le bord de la foliole terminale est moyennement ondulé chez 'Marine', tandis qu'il est faiblement ondulé chez 'Yukon Gold' et très faiblement ondulé chez 'Dali'. 'Marine' produit un nombre plus élevé d'inflorescences que les variétés de référence. Le bouton floral est très persistant chez 'Marine', tandis qu'il est moyennement persistant chez 'Yukon Gold' et peu persistant chez 'Dali'. Les fleurs de 'Marine' sont violet bleu et deviennent blanches, alors que celles de 'Yukon Gold' sont violet rouge et celles de 'Dali' sont blanches. La pigmentation anthocyanique du pédoncule est forte chez 'Marine', alors qu'elle est faible chez 'Yukon Gold' et nulle chez 'Dali'. Le tubercule est ovale à oblong chez 'Marine', alors qu'il est rond chez 'Yukon Gold'. Le germe est sphérique chez 'Marine', tandis qu'il est ovoïde chez 'Yukon Gold' et cylindrique large chez 'Dali'. La pigmentation anthocyanique de la base du germe est violet bleu et forte chez 'Marine', tandis qu'elle est violet rouge et d'intensité moyenne chez 'Yukon Gold'. Le sommet du germe est fortement pubescent chez 'Marine', alors qu'il est faiblement pubescent chez 'Yukon Gold', il a un port intermédiaire entre fermé et ouvert chez 'Marine' et fermé chez 'Yukon Gold'. La pigmentation anthocyanique du sommet est violet bleu et forte chez 'Marine', tandis qu'elle est violet rouge et nulle à très faible chez 'Yukon Gold'.*

Description : 'Marine' donne une plante semi-dressée, moyennement haute et de type intermédiaire entre rameux et feuillu. La tige est épaisse et a une forte pigmentation anthocyanique. Les ailes caulinaires sont proéminentes, sinueuses et simples. Les nœuds sont légèrement renflés et n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La tige est moyennement ramifiée.

Les feuilles sont vert jaunâtre, et leur surface inférieure présente une pubescence moyenne. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée. Le dessus du rachis est fortement pubescent, et le dessous est glabre. La pigmentation anthocyanique du dessus du rachis est faible, et celle du dessous est nulle. Le pétiole est moyennement anthocyané. Les stipules sont de grandeur moyenne. La foliole terminale est moyennement ovée; son sommet est acuminé, sa base est cordée et fortement asymétrique, et son bord est moyennement ondulé. Il y a cinq paires de folioles primaires; ces folioles sont grandes et étroitement ovées, leur sommet est aigu, et leur base est cordée et fortement symétrique.

'Marine' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences, et celles-ci ont un nombre intermédiaire de fleurs. Le bouton floral a une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne et est très persistant. Les fleurs complètement épanouies sont violet bleu et deviennent blanches. La face interne de la corolle a une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne, et la face externe présente également une pigmentation anthocyanique. La corolle est de grandeur moyenne et forme une étoile moyennement proéminente. La pigmentation anthocyanique du calice est moyenne à forte, et celle du pédoncule est forte. Lorsque la fleur est complètement épanouie, les anthères sont jaune vif et forment un cône piriforme. Le stigmate est capité et vert moyen.

Le tubercule est ovale à oblong. La peau est lisse, jaune, sans couleur secondaire. Les yeux, en nombre faible à élevé, sont peu profonds et se trouvent surtout dans la région apicale. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair est jaune moyen à foncé, sans couleur secondaire. 'Marine' produit un nombre moyen de tubercules.

Le germe est sphérique. La base présente une pubescence faible à moyenne et a une très forte pigmentation anthocyanique violet bleu. Le sommet a un port intermédiaire

entre fermé et ouvert, est fortement pubescent et a une forte pigmentation anthocyanique violet bleu. La fréquence d'émergence des racines est moyenne, les lenticelles sont fortement protubérantes, et les ramifications latérales sont de longueur moyenne.

Origine génétique : 'Marine' est issue d'un croisement 'Aminca' × 'O'Sirene' réalisé en 1981 à Châteauneuf-du-Faou, en France. Les essais ont été menés de 1983 à 1991 en France, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Les critères de sélection étaient l'apparence, le rendement, la résistance aux maladies et aux ravageurs et la qualité culinaire du tubercule.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Marine' ont été menés en 2000 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de quatre répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,5 mètres. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Sauf indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 77: Tableau de comparaison pour 'Marine'

	'MARINE'	'YUKON GOLD'*	'DALI'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires	20-33	18-25	10-30
Couleur RHS de la face inférieure de la corolle	91B	76B (pointes blanches)	155B
Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	86,4	71,9	89,2
écart-type	13,7	7,8	10,2
étendue	69-110	57-88	65-108

* variétés de références

Dénomination proposée : **'Sylvia'** (voir la figure 18)
Numéro de la demande : 99-1572
Date de la demande : 1999/03/12
Requérant : Germicopa SA, Quimper (France)
Mandataire au Canada : Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Germicopa SA, Quimper (France)

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Dali'

Sommaire : *Les feuilles sont vert foncé chez 'Sylvia', tandis qu'elles sont vert jaunâtre chez 'Yukon Gold'. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée chez 'Sylvia', tandis qu'elle est ouverte chez 'Yukon Gold'. La base de la foliole terminale et des folioles primaires est généralement asymétrique chez 'Sylvia', alors qu'elle est habituellement symétrique chez les variétés de référence. 'Sylvia' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences, alors que 'Yukon Gold' produit un nombre nul à peu élevé, et 'Dali' en produit un nombre peu élevé. Les fleurs de 'Sylvia' sont violet bleu, tandis que celles de 'Yukon Gold' sont violet rouge et celles de 'Dali' sont blanches. Le tubercule est oblong chez 'Sylvia', alors qu'il est rond chez 'Yukon Gold'; sa chair est jaune moyen chez 'Sylvia', tandis qu'elle est jaune pâle chez 'Yukon Gold'. Le germe est conique chez 'Sylvia', tandis qu'il est ovoïde chez 'Yukon Gold' et cylindrique large chez 'Dali'. La pigmentation anthocyanique de la base du germe est violet bleu et forte à très forte chez 'Sylvia', tandis qu'elle est violet rouge et d'intensité moyenne chez 'Yukon Gold'. Le sommet du germe a un port intermédiaire entre ouvert et fermé chez 'Sylvia', tandis qu'il a un port fermé chez 'Yukon Gold'. La pubescence du sommet est d'intensité moyenne chez 'Sylvia', alors qu'elle est faible chez 'Yukon Gold' et forte chez 'Dali'. La pigmentation anthocyanique du sommet du germe est violet bleu et forte chez 'Sylvia', tandis qu'elle est violet rouge et nulle à faible chez 'Yukon Gold' et violet bleu et d'intensité moyenne chez 'Dali'.*

Description : 'Sylvia' donne une plante dressée, moyenne à haute et de type rameux. La tige est d'épaisseur moyenne et a une pigmentation anthocyanique d'intensité moyenne. Les ailes caulinaires sont proéminentes, sinueuses et simples. Les nœuds sont légèrement renflés et n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La tige est très fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert foncé, et leur surface inférieure présente une pubescence moyenne. Leur silhouette est intermédiaire entre ouverte et fermée. Le dessus du rachis présente une pubescence modérément dense, et le dessous est glabre. Le dessus et le dessous du rachis n'ont pas de pigmentation anthocyanique. Le pétiole n'est pas anthocyané. Les stipules sont de grandeur moyenne. La foliole terminale est moyennement ovée; son sommet est aigu, sa base est obtuse à cordée et fortement asymétrique, et son bord est faiblement ondulé. Il y a six paires de folioles primaires; ces folioles sont grandes et étroitement ovées, leur sommet est aigu, et leur base est cordée et modérément asymétrique.

'Sylvia' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences, et celles-ci ont un nombre intermédiaire de fleurs. Le bouton floral a une forte pigmentation anthocyanique et est très persistant. Les fleurs complètement épanouies sont violet bleu.

Les faces interne et externe de la corolle ont une forte pigmentation anthocyanique. La corolle est grande et forme une étoile qui n'est pas très proéminente. La pigmentation anthocyanique du calice est forte, et celle du pédoncule est d'intensité moyenne. Lorsque la fleur est complètement épanouie, les anthères sont orange et forment un cône large. Le stigmate est capité et vert moyen.

Le tubercule est oblong. La peau est lisse, jaune pâle, sans couleur secondaire. Les yeux, en nombre peu élevé, sont peu profonds et se trouvent surtout dans la région apicale. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair est jaune moyen, sans couleur secondaire. 'Sylvia' produit un nombre moyen de tubercules.

Le germe est conique. La base présente une pubescence moyenne et une pigmentation anthocyanique violet bleu forte à très forte. Le sommet a un port intermédiaire entre fermé et ouvert, est moyennement pubescent et a une forte pigmentation anthocyanique violet bleu. La fréquence d'émergence des racines est moyenne, les lenticelles sont moyennement protubérantes, et les ramifications latérales sont courtes.

Origine génétique : 'Sylvia' est issue d'un croisement 'VK.73.3.40' × 'O'Sirene' réalisé en 1983 à Châteauneuf-du-Faou, en France. Les essais ont été menés de 1985 à 1993 en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne et en Angleterre. Les critères de sélection étaient le rendement, la résistance aux maladies et aux ravageurs et la qualité pour la confection de frites.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Sylvia' ont été menés en 2000 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de quatre répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,5 mètres. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Sauf indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 78 : Tableau de comparaison pour 'Sylvia'

	'SYLVIA'	'YUKON GOLD'*	'DALI'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires			
	18-28	16-25	10-30
Couleur RHS de la face inférieure de la corolle			
	91A	76B	155B
		(pointes blanches)	
Longueur du tubercule (mm)]			
moyenne	100,2	71,9	89,2
écart-type	11,7	7,8	10,2
étendue	64-120	57-88	65-108

* variétés de références

ROSIER (*Rosa* L.)

Dénomination proposée : **'POULdava'**
Nom commercial : **Augusta**
Numéro de la demande : 96-729
Date de la demande : 1995/03/31
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULweeto' et 'Morden Centennial'

Sommaire : *'POULdava' a un port étalé à rampant, tandis que 'Morden Centennial' a un port dressé à buissonnant. Chez 'POULdava', les tiges ont de nombreux aiguillons courts, tandis que chez les variétés de référence les aiguillons sont clairsemés. Les feuilles, les folioles terminales et les fleurs de 'POULdava' sont plus grandes que celles de 'POULweeto' et plus petites que celles de 'Morden Centennial'. Par comparaison à 'Morden Centennial', 'POULdava' a des sépales plus courts et des pétales plus petits. Les fleurs de 'POULdava' sont rose saumon pâle, tandis que celles de 'POULweeto' sont rose foncé puis rose pâle, et celles de 'Morden Centennial' sont rose bleuâtre.*

Description : 'POULdava' est un petit rosier arbustif à port étalé à rampant. Les jeunes rameaux ont une faible pigmentation anthocyanique bronze. La tige porte de nombreux aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) et un nombre moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert moyen et moyennement lustrées à fortement lustrées; elles ont 5 ou 7 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base cunéiforme à arrondie.

'POULdava' fleurit tôt, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est moyen à élevé. Le pédicelle des fleurs porte de nombreux poils ou aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus et la base aplatis. Le centre est normal, la corolle est demi-double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est rose saumon pâle. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont moyens à longs, teintés de violet et de rouge passant graduellement au blanc et glabres dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au-dessous des anthères. Le réceptacle est petit à moyen, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un très faible parfum de thé.

Origine génétique : 'POULdava' est issue du croisement de deux semis de rosiers arbustifs non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1986. 'POULdava' a été sélectionnée pour ses fleurs roses.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULdava' ont eu lieu aux pépinières Enderleine, à Lisle (Ontario), en 2001. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures.

Tableau 79 : Tableau de comparaison pour 'POULdava' et 'POULweeto'

	'POULDAVA'	'POULWEETO'	'MORDEN CENTENNIAL'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	109,2	66,6	149,2
écart-type	6,7	3,72	7,8
étendue	100-120	60-70	135-160
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	80,0	39,8	110,0
écart-type	11,3	2,9	7,8
étendue	65-95	36-46	100-120
Longueur de la foliole terminale (mm)			
moyenne	49,3	26,0	64,5
écart-type	3,03	1,73	3,59
étendue	45-55	23-28	58-70
Largeur de la foliole terminale (mm)			
moyenne	26,5	11,8	42,0
écart-type	1,89	1,06	2,51
étendue	23-28	10-13	38-45
Longueur du sépale (les extensions inclus) (mm)			
moyenne	15,3	14,0	26,8
écart-type	2,42	1,52	2,03
étendue	12-20	12-16	24-30
Diamètre de la fleure (mm)			
moyenne	53,3	41,3	77,5
écart-type	3,7	2,68	4,78
étendue	50-60	38-45	70-85
Longueur du pétale (mm)			
moyenne	19,3	20,5	42,2
écart-type	1,88	1,11	2,90
étendue	16-22	19-22	38-45
Largeur du pétale (mm)			
moyenne	20,8	15,0	39,0
écart-type	1,46	1,83	3,20
étendue	18-22	12-18	35-45
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	26B à 26C	52C	54A
face supérieure	26B	52C	63A
face inférieure	26C	52D	60D
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	36C à 36D	46D	54A à 56B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	26D	48B	54A à 56B
zone centrale	26D	46B	54A à 56B
tache à la base	12A	13B	1D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	26D	48C	54A à 56B
zone centrale	26C	46C	54A à 56B
tache à la base	12A	13B	1D

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULaew'** (voir la figure 23)
Nom commercial : **Jose Carreras**
Numéro de la demande : 98-1213
Date de la demande : 1998/01/23
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbucki Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULari' et 'POULman'

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la

multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Sommaire : *La pigmentation anthocyanique des jeunes rameaux est moins prononcée chez 'POULnew' que chez les variétés de référence. Les feuilles de 'POULnew' sont plus grandes que celles des variétés de référence. Les fleurs de 'POULnew' sont crème et doubles, tandis que celles de 'POULari' sont blanches et très doubles, et celles de 'POULman' sont rouges.*

Description : 'POULnew' est un rosier hybride de thé à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une faible pigmentation anthocyanique bronze. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et un nombre moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont concaves et sont rouge rosâtre et vert jaune. Les feuilles sont vert moyen et moyennement à fortement lustrées; elles ont 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULnew' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre d'aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus et la base convexes. Le centre est normal, et la corolle est double. La fleur est crème. Les pétales ont des petites taches basales sur la face externe et la face interne. Le bord des pétales est moyennement à fortement recourbé et moyennement ondulé. Le filet des étamines est vert jaunâtre. Les styles sont de longueur moyenne, violet rougeâtre près du sommet et blancs près de la base, et leur moitié supérieure présente une pubescence dense. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est gros, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur dégage un parfum de thé d'intensité moyenne.

Origine génétique : 'POULnew' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec 'Pensdesco', ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1988.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULnew' ont eu lieu aux Valleerose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 80 : Tableau de comparaison pour 'POULnew'

	'POULNEW'	'POULARI'*	'POULMAN'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	183,5	123,6	142,8
écart-type	13,9	11,9	8,28
nombre mesurés	10	6	8
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	125,0	119,5	118,0
écart-type	15,8	13,1	8,3
nombre mesurés	10	6	8
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	157A	155A	46A
face supérieure	158C	155B	46A
face inférieure	158D	157A	46A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	158C	155B	53A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	158C	155C	53C
zone centrale	158C	155C	53C
tache à la base	157A	1C	4A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	158C	155B	53B
zone centrale	158C	155B	53B
tache à la base	157A	1D	4A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULrijk'** (voir la figure 24)
Nom commercial : **Madison**
Numéro de la demande : 98-1239
Date de la demande : 1998/03/04
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Brouse Barbacki Morose, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULcov' et 'Bonica'

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Sommaire : *'POULrijk' a un port plus érigé que les variétés de référence. Par comparaison à 'POULcov', chez*

'POULrijk', la pigmentation anthocyanique des jeunes rameaux est plus prononcée, et les feuilles sont plus foncées. Les feuilles de 'POULrijk' sont plus longues que celles des variétés de référence. Les fleurs de 'POULrijk' sont roses, celles de 'Bonica' sont d'un rose plus pâle, et celles de 'POULcov' sont blanches.

Description : 'POULrijk' est rosier nain couvre-sol. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre forte à très forte. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont très concaves et sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé et fortement lustrées; elles ont 5 à 9 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base obtuse.

La floraison de 'POULrijk' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant 4 à 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est moyen à élevé. Le pédicelle des fleurs porte un grand nombre de glandes stipitées. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus aplati à convexe aplati et la base aplatie. La fleur a un pli central, et la corolle est double. La fleur est rose. Les pétales ont des petites taches basales sur la face externe et la face interne. Le bord des pétales n'est ni recourbé, ni ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaune, et leur moitié supérieure est glabre. Les stigmates sont un peu au-dessus des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un faible parfum floral.

Origine génétique : 'POULrijk' est issue du croisement contrôlé de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1986.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULrijk' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 81 : Tableau de comparaison pour 'POULrijk'

	'POULRIJK'	'POULCOV'*	'BONICA'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	117,16	83,2	105,0
écart-type	6,84	7,17	11,83
nombre mesurés	6	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	57,16	47,70	66,66
écart-type	6,04	7,06	6,18
nombre mesurés	6	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	58B/C	155B	56A
face supérieure	58B/C	155B	55B
face inférieure	58B/C	155B	55C
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	57D	155B	58A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	57D	155B	55C/D
zone centrale	57D	155B	55C
tache à la base	157D	155D	155C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	62D	155B	55C/D
zone centrale	62D	155B	55C
tache à la base	157D	155D	155C

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULisab'**
Nom commercial : **Isabel Renaissance®**
Numéro de la demande : 98-1268
Date de la demande : 1998/03/11
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'John S. Armstrong'

Sommaire : *'POULisab' est un grand rosier arbustif, tandis que 'John S. Armstrong' est un rosier hybride. Les feuilles de 'POULisab' sont plus courtes et plus lustrées que celles de 'John S. Armstrong'. La foliole terminale de 'POULisab' est plus large que celle de 'John S. Armstrong'. Les fleurs de 'POULisab' sont d'un rouge plus riche et plus velouté que celles de 'John S. Armstrong'. Les fleurs de 'POULisab' ont un parfum épicé prononcé, tandis que celles de 'John S. Armstrong' ont un parfum de thé de faible à moyenne*

intensité.

Description : 'POULisab' est un grand rosier arbustif à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre forte à très forte. La tige porte quelques aiguillons courts concaves et un nombre faible à moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé et fortement lustrées; elles ont 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

'POULisab' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 6 à 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont très faiblement à faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie à arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base concave. Le centre est normal, la corolle est très doublée, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est d'un rouge riche et velouté. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales n'a pas de courbure ou est faiblement recourbé et n'a pas d'ondulation ou est faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, jaunes, et leur moitié supérieure présente une faible pubescence. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur dégage un fort parfum épicé.

Origine génétique : 'POULisab' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec 'POULnorm'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1990.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULisab' ont eu lieu aux pépinières Enderleine, à Lisle (Ontario), en 2001. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures.

Tableau 82 : Tableau de comparaison pour 'POULisab'

	'POULISAB'	'JOHN S. ARMSTRONG'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	130,0	159,2
écart-type	12,25	9,3
étendue	110-150	145-170
Largeur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	54,3	43,1
écart-type	3,72	3,60
étendue	48-60	37-48
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)		
au moment de l'ouverture	46A	53A à 60B
face supérieure	46A	46A
face inférieure	53A	53A à 60B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	53A	46A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	61A	53A
zone centrale	61A	53A
tache à la base	157A	1D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	53A	53A
zone centrale	53A	53A
tache à la base	157A	1D

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULheart'** (voir la figure 25)
Nom commercial : **Julia Renaissance®**
Numéro de la demande : 98-1269
Date de la demande : 1998/03/11
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Queen Elizabeth' et 'POULari'

Sommaire : *Les feuilles de 'POULheart' sont plus petites que celles des variétés de référence. Les fleurs de 'POULheart' sont doubles, tandis que celles des variétés de référence sont très doublées. Les fleurs de 'POULheart' sont blanches, tandis que celles de 'Queen Elizabeth' sont roses.*

Description : 'POULheart' est un rosier arbustif à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre moyenne à forte. La tige porte

un petit nombre d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont très concaves à concaves et sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé et moyennement lustrées à fortement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULheart' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant 4 à 6 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde, et les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie à arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base concave à aplatie. Le centre est normal, et la corolle est double. La fleur est blanche. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est fortement recourbé et faiblement à moyennement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont longs, jaunes, et leur moitié supérieure est moyennement pubescente. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur dégage un fort parfum fruité.

Origine génétique : 'POULheart' est issue du croisement contrôlé de 'Margaret Merril' avec un semis non identifié; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1989.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULheart' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 83 : Tableau de comparaison pour 'POULheart'

	'POULHEART'	'QUEEN ELIZABETH'*	'POULARI'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	117,5	132,5	123,6
écart-type	15,22	6,89	11,9
nombre mesurés	6	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	84,83	119,16	119,50
écart-type	11,61	7,35	13,1
nombre mesurés	6	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	27B	55A	155A
face supérieure	27C	55B	155B
face inférieure	27C	55B	157A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	158B	55B-55C	155B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	155C	55C	155C
zone centrale	155C	55B	155C
tache à la base	3C	1D	1C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	155A	55C	155B
zone centrale	155A	55B	155B
tache à la base	3C	1D	1D

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULdra'**
Nom commercial : **Alexandra Renaissance®**
Numéro de la demande : 98-1270
Date de la demande : 1998/03/11
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'Morden Centennial'

Sommaire : *'POULdra' est un grand rosier hybride arbustif, tandis que 'Morden Centennial' est un petit rosier arbustif. Les jeunes rameaux de 'POULdra' ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre très intense, tandis que ceux de 'Morden Centennial' ont une pigmentation bronze de faible intensité. Les feuilles de 'POULdra' sont plus petites et plus lustrées que celles de 'Morden Centennial'. La fleur de 'POULdra' est plus grosse que celle de 'Morden Centennial', et ses sépales ont des appendices plus longs. Les fleurs de 'POULdra' dégagent un fort parfum fruité, tandis que celles de 'Morden Centennial' ont un parfum désagréable de faible intensité.*

Description : 'POULdra' est un grand rosier hybride arbustif à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une très forte pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte quelques aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) à très concaves et un nombre moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun verdâtre. Les feuilles sont vert foncé et fortement lustrées; elles ont 5 ou 7 folioles, et la foliole

terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

'POULdra' fleurit tôt, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 1 à 4 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle des fleurs porte un nombre faible à moyen de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde, et les sépales sont fortement à très fortement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie à arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus et la base convexes aplatis. Le centre est normal, la corolle est double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est d'un rose foncé soutenu. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et des taches basales de grandeur moyenne sur leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont longs, blancs avec le quart supérieur rouge violacé, et moyennement à fortement pubescents dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères ou au-dessus. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur dégage un fort parfum fruité.

Origine génétique : 'POULdra' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec la variété 'Margaret Merril'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1988.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULdra' ont eu lieu aux pépinières Enderleine, à Lisle (Ontario), en 2001. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures.

Tableau 84 : Tableau de comparaison pour 'POULdra'

	'POULDRA'	'MORDEN CENTENNIAL'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	139,2	149,2
écart-type	9,3	7,8
étendue	125-150	135-160
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	101,6	110,0
écart-type	7,45	7,6
étendue	90-110	100-120
Largeur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	58,1	42,0
écart-type	2,03	2,51
étendue	55-60	38-45
Longueur du sépale (les extensions inclus) (mm)		
moyenne	36,5	26,8
écart-type	2,56	2,03
étendue	32-40	24-30
Diamètre de la fleure (mm)		
moyenne	90,8	77,5
écart-type	3,43	4,78
étendue	85-95	70-85
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)		
au moment de l'ouverture	57B	54A
face supérieure	57B	63A
face inférieure	57B	60D
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	67B	54A à 58B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	66A à 66B	54A à 58B
zone centrale	66A à 66B	54A à 58B
tache à la base	7A	1D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	66B	54A à 58B
zone centrale	66A	54A à 58B
tache à la base	7A	1D

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULtry'**
Nom commercial : **Redwood**
Numéro de la demande : 98-1275
Date de la demande : 1998/03/11
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'Hans Christian Andersen'

Sommaire : *Les jeunes rameaux de 'POULtry' ont une pigmentation anthocyanique violette intense, tandis que ceux de 'Hans Christian Andersen' ont une pigmentation brun rougeâtre à violette très intense. Les feuilles de 'POULtry' sont plus courtes, plus lustrées et plus épaisses que celles de*

'Hans Christian Andersen'. Les boutons floraux de 'POULtry' sont globulaires, tandis que ceux de 'Hans Christian Andersen' sont ovoïdes. Les fleurs de 'POULtry' sont très doublées, tandis que celles de 'Hans Christian Andersen' sont demi-doubles à doubles. Les fleurs de 'POULtry' n'ont pas de parfum, tandis que celles de 'Hans Christian Andersen' ont un faible parfum de thé.

Description : 'POULtry' est un rosier hybride à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une forte pigmentation anthocyanique violette. La tige porte quelques aiguillons courts très concaves et un nombre moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun verdâtre. Les feuilles sont vert foncé et moyennement lustrées; elles ont 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULtry' est hâtive à intermédiaire et se poursuit presque continuellement pendant 6 à 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre élevé de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est globulaire, et les sépales sont faiblement à moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati à convexe et la base concave. Le centre est normal, la corolle est très doublée, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est rouge vif. Les pétales ont des taches basales blanc verdâtre très petites à petites sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont longs, blancs et présentent une pubescence intermédiaire. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur n'a pas de parfum.

Origine génétique : 'POULtry' est issue du croisement de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1986.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULtry' ont eu lieu aux pépinières Enderleine, à Lisle (Ontario), en 2001. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures.

Tableau 85 : Tableau de comparaison pour 'POULtry'

	'POULTRY'	'HANS CHRISTIAN ANDERSON'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	115,0	127,5
écart-type	8,2	6,3
étendue	100-125	120-135
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)		
au moment de l'ouverture	53A	53A à 60A
face supérieure	53A	46A
face inférieure	53A	60A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	46A	46A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	53A	53A
zone centrale	53A	53A
tache à la base	1D	156A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	46A	46A
zone centrale	46A	46A
tache à la base	1D	156A

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULriber'**
Nom commercial : **Grand Canyon**
Numéro de la demande : 98-1280
Date de la demande : 1998/03/20
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'Sexy Rexy'

Sommaire : *Les aiguillons de 'POULriber' sont brun rougeâtre pâle, tandis que ceux de 'Sexy Rexy' sont presque blancs. La feuille et la foliole terminale sont plus longues chez 'POULriber' que chez 'Sexy Rexy'. Les fleurs de 'POULriber' sont rose saumon vif et sont plus grosses que celles de 'Sexy Rexy', qui sont rose saumon pâle. Les sépales ont des*

appendices plus longs chez 'POULriber' que chez 'Sexy Rexy'. La fleur de 'POULriber' est double, tandis que celle de 'Sexy Rexy' est très doublée. Les pétales sont plus grands chez 'POULriber' que chez 'Sexy Rexy'.

Description : 'POULriber' est un rosier floribunda à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une faible pigmentation anthocyanique bronze à brun rougeâtre. La tige porte quelques aiguillons courts très concaves et un nombre faible à moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun rougeâtre pâle. Les feuilles sont vert moyen et moyennement lustrées; elles ont 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base obtuse à arrondie.

'POULriber' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 6 à 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre intermédiaire de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base concave. Le centre est normal, la corolle est double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est rose saumon vif. Les pétales ont des taches basales petites à moyennes sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et moyennement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, blanc verdâtre, et leur moitié supérieure est glabre. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur a un parfum fruité de faible à moyenne intensité.

Origine génétique : 'POULriber' est issue du croisement d'un semis non identifié avec 'Macrexy'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1988.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULriber' ont eu lieu aux pépinières Enderleine, à Lisle (Ontario), en 2001. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures.

Tableau 86 : Tableau de comparaison pour 'POULriber'

	'POULRIBER'	'SEXY REXY'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	115,8	108,0
écart-type	4,48	8,10
étendue	110-120	95-118
Longueur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	54,6	42,1
écart-type	5,5	2,3
étendue	45-60	40-46
Longueur du sépale (les extensions inclus) (mm)		
moyenne	30,2	21,5
écart-type	2,3	2,1
étendue	28-35	18-25
Diamètre de la fleure (mm)		
moyenne	79,1	57,0
écart-type	3,4	4,1
étendue	75-85	50-62
Longueur du pétale (mm)		
moyenne	38,3	25,3
écart-type	2,6	1,8
étendue	35-42	22-28
Largeur du pétale (mm)		
moyenne	34,3	22,6
écart-type	3,7	4,2
étendue	28-40	16-29
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)		
au moment de l'ouverture	40A à 41A	38A
face supérieure	41B	38B
face inférieure	41B à 41C	38B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	40B à 40C	38B à 38C
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	43C	38C
zone centrale	43C	38C
tache à la base	4B	1C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	40C	38B
zone centrale	40C	38B
tache à la base	4B	1C

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULsyng'** (voir la figure 26)
Nom commercial : **Clair Renaissance®**
Numéro de la demande : 98-1281
Date de la demande : 1998/03/20
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULman' et 'Queen Elizabeth'

Sommaire : *Chez 'POULsyng', la pigmentation anthocyanique des jeunes rameaux est plus faible que chez les variétés de référence. Les feuilles de 'POULsyng' sont plus petites que celles des variétés de référence. Les fleurs de 'POULsyng' sont très doublées, tandis que celles de 'POULman' sont doubles. Les fleurs de 'POULsyng' sont abricot, celles de 'POULman' sont rouges, et celles de 'Queen Elizabeth' sont roses et plus foncées.*

Description : 'POULsyng' est un rosier de massif à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et un nombre faible à moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont concaves, leur base est brun rougeâtre, et le reste est vert. Les feuilles sont vert pâle à vert moyen et faiblement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULsyng' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre moyen de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde à globulaire, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus aplati à convexe aplati et la base convexe aplatie. Le centre est normal, et la corolle est très doublée. La fleur est rose pâle. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement à moyennement ondulé. Le filet des étamines est violet rougeâtre, avec une nuance jaune verdâtre. Les styles sont longs, blanc et violet, et leur moitié supérieure est moyennement pubescente. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est moyen à gros, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur dégage un très fort parfum fruité.

Origine génétique : 'POULsyng' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec 'Radox Bouquet'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1989.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULsyng' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 87 : Tableau de comparaison pour 'POULsyng'

	'POULSYNG'	'POULMAN'*	'QUEEN ELIZABETH'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	125,0	142,8	132,5
écart-type	5,17	8,28	6,89
nombre mesurés	6	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	91,43	116,0	119,16
écart-type	4,11	6,3	7,35
nombre mesurés	6	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	27A-19B	46A	55A
face supérieure	27A-19B	46A	55B
face inférieure	27A	46A	55B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	27A-19B	53A	55B-C
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	27A	53C	55C
zone centrale	27B/C	53C	55B
tache à la base	4B	4A	1D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	27A	53B	55C
zone centrale	27B/C	53B	55B
tache à la base	9A	4A	1D

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULna'** (voir la figure 27)
Nom commercial : **Helena Renaissance®**
Numéro de la demande : 98-1282
Date de la demande : 1998/03/20
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Queen Elizabeth' et 'POULari'

Sommaire : *Chez 'POULna', la pigmentation anthocyanique des jeunes rameaux est plus faible que chez les variétés de référence. Chez 'POULna', le nombre de fleurs par rameau florifère est plus élevé que chez les variétés de référence. Les fleurs de 'POULna' sont blanches, tandis que celles de 'Queen Elizabeth' sont roses. Chez 'POULna', les styles sont blancs, tandis que chez 'Queen Elizabeth' ils sont vert et violet, et chez 'POULari' ils sont vert jaunâtre.*

Description : 'POULna' est un grand rosier arbustif à port dressé. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique bronze faible à moyenne. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont concaves et sont vert rosâtre. Les feuilles sont vert pâle à vert moyen et moyennement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie ovale.

La floraison de 'POULna' est hâtive à intermédiaire et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre moyen à élevé de glandes stipitées et de poils blancs. Le bouton floral est ovoïde à globulaire, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus et la base convexes. Le centre est normal, et la corolle est très doublée. La fleur est blanche. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est fortement recourbé et faiblement à moyennement ondulé. Le filet des étamines est blanc. Les styles sont de longueur moyenne, blancs, et leur moitié supérieure est moyennement pubescente. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir, sans aiguillons. La fleur dégage un très fort parfum floral.

Origine génétique : 'POULna' est issue du croisement contrôlé de 'Margaret Merril' avec un semis non identifié; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1989.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULna' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 88 : Tableau de comparaison pour 'POULna'

	'POULNA'	'QUEEN ELIZABETH'*	'POULARI'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	142,5	132,5	123,6
écart-type	15,08	6,89	11,9
nombre mesurés	6	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	110,83	119,16	119,50
écart-type	12,8	7,35	13,1
nombre mesurés	6	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	158D	55A	155A
face supérieure	155D	55B	155B
face inférieure	155D	55B	157A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)			
	155D avec 56D au centre	55B-C	155B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	56D	55C	155C
zone centrale	155D	55B	155C
tache à la base	1D	1D	1C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	56D	55C	155B
zone centrale	155D	55B	155B
tache à la base	1D	1D	1D

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULrim'** (voir la figure 28)
Nom commercial : **Flora Danica**
Numéro de la demande : 98-1289
Date de la demande : 1998/03/27
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULjill' et 'POULman'

Sommaire : *Chez 'POULrim', la pigmentation anthocyanique des jeunes rameaux est plus prononcée que chez les variétés de référence. Les feuilles de 'POULrim' sont plus petites que celles de 'POULman' et plus foncées que celles des deux variétés de référence. Les fleurs de 'POULrim' sont plus grosses que celles de 'POULjill'. Les fleurs de 'POULrim' sont abricot, tandis que celles de 'POULjill' sont jaunes, et celles de 'POULman', rouges.*

Description : 'POULrim' est un rosier hybride de thé à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique bronze très prononcée. La tige porte un nombre moyen d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont linéaires et concaves, et sont rouge rosâtre, avec une nuance de vert. Les feuilles sont vert foncé et moyennement lustrées; elles ont 5 folioles, parfois 7, dans le bas de la plante, ou 3, dans le haut; la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULrim' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant 6 à 10 semaines ou plus. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre faible à moyen d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales n'ont pas d'appendices ou sont très faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base convexe aplatie à convexe. Le centre est normal, et la corolle est double. La fleur est abricot. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et de grandes taches basales sur leur face interne. Le bord des pétales est moyennement recourbé et faiblement à moyennement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont moyens à longs, violet rougeâtre près du sommet et blancs près de la base, et moyennement à fortement pubescents dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est moyen à gros, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un parfum floral à fruité d'intensité faible à moyenne.

Origine génétique : 'POULrim' est issue du croisement contrôlé de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1988.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULrim' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 89 : Tableau de comparaison pour 'POULrim'

	'POULRIM'	'POULJILL'*	'POULMAN'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	128,6	116,6	142,8
écart-type	12,6	10,8	8,28
nombre mesurés	10	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	103,6	78,3	116,0
écart-type	8,8	9,3	6,3
nombre mesurés	10	6	6
Diamètre de la fleure (cm)			
moyenne	102,50	74,16	93,50
écart-type	5,59	5,84	4,37
nombre mesurés	10	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	25B-D	9C	46A
face supérieure	25A	9A	46A
face inférieure	22C	9B	46A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	30B-31B	9B-C	53A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	22B	9C	53C
zone centrale	22B	9B-C	53C
tache à la base	9A	-	4A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	25B	9C	53B
zone centrale	25A	9B	53B
tache à la base	4A	-	4A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULfiry'** (voir la figure 29)
Nom commercial : **Fiery Hit®**
Numéro de la demande : 98-1291
Date de la demande : 1998/03/27
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULmo' et 'POULsnows'

Sommaire : *Chez 'POULfiry', la pigmentation anthocyanique des jeunes rameaux est plus faible que chez 'POULmo'. Les feuilles de 'POULfiry' sont plus petites que celles de 'POULsnows'. Les fleurs de 'POULfiry' sont orange rougeâtre, tandis que celles de 'POULmo' sont rouges, et celles de 'POULsnows', blanches.*

Description : 'POULfiry' est un rosier miniature à port buissonnant. Les jeunes rameaux ont une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont linéaires et concaves et sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert moyen et moyennement lustrées; elles ont 5 ou 7 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base obtuse.

La floraison de 'POULfiry' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant 6 à 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre faible à moyen d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont faiblement à moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière à étoilée; vue de côté, elle a le dessus convexe et la base aplatie. Le centre est normal, et la corolle est double. La fleur est orange rougeâtre. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement à fortement recourbé et n'est pas ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont longs, vert jaune, et leur moitié supérieure est faiblement pubescente. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur ne dégage pas de parfum.

Origine génétique : 'POULfiry' est issue du croisement contrôlé de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1990.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULfiry' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 90 : Tableau de comparaison pour 'POULfiry'

	'POULFIRY'	'POULMO'*	'POULSNOWS'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	84,16	85,0	100,83
écart-type	13,49	10,95	7,38
nombre mesurés	6	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	54,50	48,33	64,83
écart-type	6,52	9,42	9,15
nombre mesurés	6	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	41A/B	46A-60B	155B
face supérieure	41A/B	46A-53A	159C
face inférieure	41A/B	46A-60B	155B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	40B/C	46A	155B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	41C	60B/46A	155B
zone centrale	41C	60B/46A	155B
tache à la base	22B	155A	149C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	40C	46A/53B	155B
zone centrale	40C	46A/53A	159C
tache à la base	22A	155A	149D

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULweeto'**
Nom commercial : **Monticello**
Numéro de la demande : 98-1294
Date de la demande : 1998/03/27
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'Morden Centennial' et 'POULdava' (voir le tableau 79 à la page 130)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Sommaire : *'POULweeto' a un port étalé à rampant, tandis que 'Morden Centennial' a un port dressé à buissonnant. Les tiges ont des aiguillons courts clairsemés chez 'POULweeto' et de nombreux aiguillons courts chez 'POULdava'. Les feuilles, les folioles terminales et les fleurs de 'POULweeto' sont plus petites que celles des variétés de référence. Les fleurs de 'POULweeto' ont de plus petits pétales que celles de 'Morden Centennial'. Les fleurs de 'POULweeto' sont rose*

foncé puis rose pâle, celles de 'POULdava' sont rose saumon pâle et celles de 'Morden Centennial', rose bleuâtre.

Description : 'POULweeto' est un petit rosier arbustif à port étalé à rampant. Les jeunes rameaux ont une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte quelques aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) à fortement concaves et un nombre faible à moyen d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun rougeâtre à havane. Les feuilles sont vert moyen et faiblement à moyennement lustrées; elles ont 5 ou 7 folioles, et la foliole terminale est mince et souple et a un bord denté en scie et une base obtuse.

La floraison de 'POULweeto' est hâtive à intermédiaire et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est très élevé. Le pédicelle des fleurs porte un nombre moyen de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base aplatie. Le centre est normal, la corolle est demi-double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est rose foncé, puis rose pâle. Les pétales ont des petites taches basales sur la face externe et la face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont longs, blancs, et leur moitié supérieure est glabre ou présente une très faible pubescence. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un très faible parfum de thé.

Origine génétique : 'POULweeto' est issue du croisement de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1992.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULweeto' ont eu lieu aux pépinières Enderleine, à Lisle (Ontario), en 2001. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures.

Dénomination proposée :	**'POULtika'** (voir la figure 30)
Nom commercial :	**Northern Lights**
Numéro de la demande :	98-1297
Date de la demande :	1998/03/27
Requérant :	Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada :	Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Queen Elizabeth' et 'POULsyng'

Sommaire : *Les feuilles de 'POULtika' sont plus petites que celles des variétés de référence. Les fleurs de 'POULtika' sont rose pâle, tandis que celles de 'Queen Elizabeth' sont d'un rose plus foncé, et celles de 'POULsyng' sont abricot.*

Description : 'POULtika' est un grand rosier arbustif à port buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre d'intensité moyenne. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont concaves et sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert foncé et moyennement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base obtuse.

La floraison de 'POULtika' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de glandes stipitées et de poils blancs. Le bouton floral est pointu à ovoïde, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base aplatie. Le centre est normal, et la corolle est double. La fleur est rose. Les pétales ont de très petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, jaune pâle avec une nuance rougeâtre, et leur moitié supérieure est faiblement pubescente. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un faible parfum fruité.

Origine génétique : 'POULtika' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec 'Kordes Brilliant'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1987.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULtika' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 92 : Tableau de comparaison pour 'POULtika'

	'POULTIKA'	'QUEEN ELIZABETH'*	'POULSYNG'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	85,4	132,5	125,0
écart-type	6,98	6,89	5,17
nombre mesurés	6	6	6
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	61,4	119,16	91,42
écart-type	5,02	7,35	4,11
nombre mesurés	6	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)			
au moment de l'ouverture	65B	55A	27A-19B
face supérieure	65B	55B	27A-19B
face inférieure	65A/B	55B	27A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	65B-C	55B-C	27A-19B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	65A	55C	27A
zone centrale	65A	55B	27B/C
tache à la base	155C (avec tache de 1D)	1D	4A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	65B	55C	27A
zone centrale	65C	55B	27B/C
tache à la base	155C (avec tache de 1D)	1D	4A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULnorm'** (voir la figure 31)
Nom commercial : **That's Jazz**
Numéro de la demande : 98-1302
Date de la demande : 1998/03/27
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULman'

Sommaire : *'POULnorm' a un port plus dressé que 'POULman'. Les feuilles de 'POULnorm' sont plus petites que celles de 'POULman'. Les fleurs de 'POULnorm' sont très doublées, tandis que celles de 'POULman' sont doubles. La fleur de 'POULnorm' est d'un rouge plus pâle que celle de 'POULman'.*

Description : 'POULnorm' est un rosier grimpant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre d'intensité moyenne. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts et d'aiguillons longs; les aiguillons sont très concaves à concaves et sont orange grisâtre. Les feuilles sont vert moyen et moyennement à fortement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté et une base arrondie.

'POULnorm' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 6 à 10 semaines ou plus. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre moyen d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus aplati à convexe aplati et la base concave. La fleur a un pli central, et la corolle est très doublée. La fleur est rouge. Les pétales ont de très petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaunâtre, et leur moitié supérieure est faiblement pubescente. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un parfum fruité à épicé d'intensité moyenne.

Origine génétique : 'POULnorm' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec 'Norita'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1985.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULnorm' ont eu lieu aux Valderose Gardens, à Paincourt (Ontario), en 1999. Les sujets, au moins 5 par variété, ont été cultivés au champ.

Tableau 93 : Tableau de comparaison pour 'POULnorm'

	'POULNORM'	'POULMAN'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	119,8	142,8
écart-type	7,35	8,28
nombre mesurés	6	6

Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	94.6	116.0
écart-type	5.5	6.3
nombre mesurés	6	6
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)		
au moment de l'ouverture	60A	46A
face supérieure	53A	46A
face inférieure	60A	46A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	53A	53A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	60A	53C
zone centrale	60A	53C
tache à la base	3B	4A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	53A	53B
zone centrale	53A	53B
tache à la base	3D	4A

* variété de référence

Dénomination proposée : **'JACmered'**
Nom commercial : **Crimson Knight**
Numéro de la demande : 98-1423
Date de la demande : 1998/06/05
Requérant : Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULhappy'

Sommaire : *La feuille, la foliole terminale et la fleur de 'JACmered' sont plus grandes que celles de 'POULhappy'. La fleur de 'JACmered' est d'un rouge plus foncé que celle de 'POULhappy'.*

Description : 'JACmered' est un rosier miniature à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre de faible intensité. La tige porte un nombre moyen d'aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) et un très petit nombre d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert pâle et faiblement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale est mince et souple et a un bord denté en scie et une base arrondie.

'JACmered' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 1 à 4 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base aplatie. Le centre est normal, la corolle est double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est rouge. Les pétales ont des taches basales de grandeur moyenne sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont longs, jaunes, et présentent une pubescence moyenne dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne et porte des aiguillons. La fleur dégage un très faible parfum de thé.

Origine génétique : 'JACmered' est issue du croisement contrôlé de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Somis, en Californie, en 1994. La même année, des graines ont été recueillies et semées. La variété 'JACmered' a été sélectionnée et multipliée par bouturage en 1995.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'JACmered' ont eu lieu aux Burnaby Lake Greenhouses Ltd., à Surrey (Colombie-Britannique), en 2001. De 6 à 10 sujets par variété ont été cultivés en serre, dans des pots de 15 cm espacés de 30 cm. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 9 mesures.

Tableau 94 : Tableau de comparaison pour 'JACmered'

	'JACMERED'	'POULHAPPY'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	73	60
écart-type	8	7
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	53	40
écart-type	8	4
Longueur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	36	22
écart-type	7	9

Largeur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	23	16
écart-type	3	3
Diamètre de la fleure (mm)		
moyenne	47	35
écart-type	3	3
Couleur du bourgeon floral (au quart ouvert) (RHS)		
au moment de		
l'ouverture	53A	45B
face supérieure	53A	45B
face inférieure	53A	45B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)		
	53A	45B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	53B	45C
zone centrale	53B	45C
tache à la base	150D	1D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	53A	45B
zone centrale	53A	45B
tache à la base	150D	1D

* variété de référence

Dénomination proposée : **'JACquest'**
Nom commercial : **Rudolf**
Numéro de la demande : 98-1426
Date de la demande : 1998/06/05
Requérant : Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Canan Maclean, Ottawa (Ontario)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'KORfrauma'

Sommaire : *Chez 'JACquest', les tiges sont inermes, tandis que chez 'KORfrauma' elles portent des aiguillons courts clairsemés. Les jeunes rameaux de 'JACquest' ne sont pas anthocyanés, tandis que ceux de 'KORfrauma' ont une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. Les feuilles de 'JACquest' sont plus petites que celles de 'KORfrauma'. Les fleurs de 'JACquest' sont rouge foncé, tandis que celles de 'KORfrauma' sont rose vif.*

Description : 'JACquest' est un rosier miniature à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux n'ont pas de pigmentation anthocyanique. La tige est inerme. Les feuilles sont vert pâle et faiblement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale est mince et souple et a un bord denté en scie et une base obtuse.

'JACquest' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 1 à 4 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un nombre moyen de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont fortement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base aplatie. Le centre est normal, la corolle est double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est rouge foncé. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaunâtre, et présentent une faible pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur ne dégage aucun parfum.

Origine génétique : 'JACquest' est issue du croisement d'un semis non identifié avec 'POULvic', ce croisement a été réalisé en 1993. En 1994, des graines ont été recueillies et semées à Somis (Californie). La variété 'JACquest' a été sélectionnée et multipliée en 1994.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'JACquest' ont eu lieu aux Burnaby Lake Greenhouses Ltd., à Surrey (Colombie-Britannique), en 2001. De 6 à 10 sujets par variété ont été cultivés en serre, dans des pots de 15 cm espacés de 30 cm. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 9 mesures.

Tableau 95 : Tableau de comparaison pour 'JACquest'

	'JACQUEST'	'KORFRAUMA'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	82	90
écart-type	7	9
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	42	54
écart-type	3	3

Couleur du bourgeon floral (au quart ouvert) (RHS)		
au moment de l'ouverture	45B	57B
face supérieure	45B	57B
face inférieure	45D	57B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	45B	57B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	45B	57B
zone centrale	45B	57B
tache à la base	11B	11B
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	46B	57B
zone centrale	46B	57B
tache à la base	10B	11C

* variété de référence

Dénomination proposée : **'JACpricl'**
Nom commercial : **Snow Bunny**
Numéro de la demande : 98-1427
Date de la demande : 1998/06/05
Requérant : Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'KORsailer'

Sommaire : *Les feuilles de 'JACpricl' sont plus longues que celles de 'KORsailer'. La foliole terminale est plus grande chez 'JACpricl' que chez 'KORsailer'. Les fleurs sont plus grosses et ont des pétales plus grands et des sépales plus longs chez 'JACpricl' que chez 'KORsailer'.*

Description : 'JACpricl' est un rosier miniature à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre de faible intensité. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) et un petit nombre d'aiguillons longs; les aiguillons sont brun rougeâtre. Les feuilles sont vert moyen et faiblement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale est mince et souple et a un bord denté en scie et une base arrondie.

'JACpricl' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 1 à 4 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base aplatie. Le centre est normal, la corolle est double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est blanche. Les pétales ont de très petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement recourbé et moyennement ondulé. Le filet des étamines est blanc. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaunâtre, et présentent une faible pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne et porte des aiguillons. La fleur dégage un faible parfum de thé.

Origine génétique : 'JACpricl' est issue du croisement de 'JACimin' avec 'INTERprince'; ce croisement a été réalisé en 1992 à Somis, en Californie. La même année, des graines ont été recueillies et semées. La variété 'JACpricl' a été sélectionnée en 1993 parmi les semis ainsi obtenus.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'JACpricl' ont eu lieu aux Burnaby Lake Greenhouses Ltd., à Surrey (Colombie-Britannique), en 2001. De 6 à 10 sujets par variété ont été cultivés en serre, dans des pots de 15 cm espacés de 30 cm. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 9 mesures.

Tableau 96 : Tableau de comparaison pour 'JACpricl'

	'JACPRICL'	'KORSAILER'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	85	59
écart-type	3	6
Longueur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	40	35
écart-type	3	3
Largeur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	22	17
écart-type	3	2

Couleur du bourgeon floral (au quart ouvert) (RHS)		
au moment de l'ouverture	155C	155B
face supérieure	155C	155B
face inférieure	155C	155B
Couleur générale de toute la fleure (RHS)		
	155C	155B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	155C	155B
zone centrale	155C	155B
tache à la base	1D	155B
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	155C	155B
zone centrale	155C	155B
tache à la base	1D	155B

* variété de référence

Dénomination proposée : **'JACstrip'**
Nom commercial : **Valentines Surprise**
Numéro de la demande : 98-1429
Date de la demande : 1998/06/05
Requérant : Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULracos'

Sommaire : *Les sépales sont plus longs chez 'JACstrip' que chez 'POULracos'. Les fleurs de 'JACstrip' sont bicolores, soit rose foncé et blanc, tandis que celles de 'POULracos' sont rouge foncé.*

Description : 'JACstrip' est un rosier miniature à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ne sont pas anthocyanés. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) et un petit nombre d'aiguillons longs; les aiguillons sont presque blancs. Les feuilles sont vert pâle et faiblement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale est mince et souple et a un bord denté en scie et une base arrondie.

'JACstrip' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 1 à 4 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est intermédiaire. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus et la base aplatis. Le centre est normal, la corolle est double, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est bicolore, plus précisément rose foncé et blanc. Les pétales ont de très petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaunâtre, et présentent une faible pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne et porte des aiguillons. La fleur dégage un très faible parfum fruité.

Origine génétique : 'JACstrip' est issue du croisement d'un semis non identifié avec 'SAValife'; ce croisement a été réalisé en 1993, à Somis (Californie). La même année, des graines ont été recueillies et semées. La variété 'JACstrip' a été sélectionnée en 1994 parmi les semis ainsi obtenus.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'JACstrip' ont eu lieu aux Burnaby Lake Greenhouses Ltd., à Surrey (Colombie-Britannique), en 2001. De 6 à 10 sujets par variété ont été cultivés en serre, dans des pots de 15 cm espacés de 30 cm. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 9 mesures.

Tableau 97 : Tableau de comparaison pour 'JACstrip'

	'JACSTRIP'	'POULRACOS'*
Longueur du sépale (les extensions inclus) (mm)		
moyenne	35	17
écart-type	3	2
Couleur du bourgeon floral (au quart ouvert) (RHS)		
au moment de l'ouverture	53D	59C
face supérieure	53D	59C
face inférieure	53D	59C
Couleur générale de toute la fleure (RHS)		
	53D et 155D	59C
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	53C et 155D	59D
zone centrale	53C et 155D	59D
tache à la base	1C	155D

Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	53C et 155D	59C
zone centrale	53C et 155D	59C
tache à la base	1D	155D

* variété de référence

Dénomination proposée : **'JACmello'**
Nom commercial : **Yellow Nugget**
Numéro de la demande : 98-1431
Date de la demande : 1998/06/05
Requérant : Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULpeacy'

Sommaire : *Les feuilles sont plus étroites chez 'JACmello' que chez 'POULpeacy'. La foliole terminale est plus courte chez 'JACmello' que chez 'POULpeacy'. 'JACmello' donne des fleurs jaunes très doublées dont les pétales ont le bord moyennement recourbé et moyennement ondulé, tandis que 'POULpeacy' donne des fleurs d'un jaune un peu plus foncé, doubles, dont les pétales ont le bord faiblement recourbé et faiblement ondulé.*

Description : 'JACmello' est un rosier miniature à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre d'intensité moyenne. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires (en forme d'aiguilles) et un petit nombre d'aiguillons longs; les aiguillons sont jaunes. Les feuilles sont vert moyen et moyennement lustrées; elles ont 5 folioles, et la foliole terminale est mince et souple et a un bord denté en scie et une base arrondie.

'JACmello' fleurit à la mi-saison, et la floraison se poursuit presque continuellement pendant 1 à 4 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle des fleurs porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde, et les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus et la base convexes aplatis. Le centre est normal, la corolle est très doublée, et les pièces florales sont visibles lorsque la fleur est ouverte. La fleur est jaune. Les pétales n'ont pas de taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement recourbé et moyennement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaunâtre; ils sont moyennement pubescents dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'urne et porte des aiguillons. La fleur dégage un très faible parfum de thé.

Origine génétique : 'JACmello' est issue du croisement de 'JACyim' avec 'AROyumi'; ce croisement a été réalisé en 1992. La même année, des graines ont été recueillies et semées à Somis (Californie). La variété 'JACmello' a été sélectionnée et multipliée en 1993.

sÉpreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'JACmello' ont eu lieu aux Burnaby Lake Greenhouses Ltd., à Surrey (Colombie-Britannique), en 2001. De 6 à 10 sujets par variété ont été cultivés en serre, dans des pots de 15 cm espacés de 30 cm. À moins d'indication contraire, les caractères quantitatifs sont fondés sur 9 mesures.

Tableau 98 : Tableau de comparaison pour 'JACmello'

	'JACMELLO'	'POULPEACY'*
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	43	53
écart-type	5	3
Longueur de la feuille terminale (mm)		
moyenne	25	35
écart-type	5	3
Couleur du bourgeon floral (au quart ouvert) (RHS)		
au moment de l'ouverture	150B	150A
face supérieure	150B	150A
face inférieure	150B	150A
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	9A	12A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	9A	12B
zone centrale	9A	12B
tache à la base	9A	12B
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	9A	12A
zone centrale	9A	12A
tache à la base	9A	12A

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULhilda'** (voir la figure 32)
Nom commercial : **Annette Hit®**
Numéro de la demande : 98-1511
Date de la demande : 1998/10/15
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Me Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULobe', 'POULarbso' et 'POULpollo'

Sommaire : *'POULhilda' est un rosier de culture en pot qui donne de grosses fleurs rose pâle très doublées dont la couleur ne pâlit pas avec le temps. 'POULhilda' se distingue des variétés de référence par la couleur de ses fleurs. Les fleurs de 'POULhilda' sont de la même grosseur que celles de 'POULarbso' et de 'POULpollo', mais plus grosses que celles de 'POULobe'. La feuille de 'POULhilda' est plus grande que celles des variétés de référence.*

Description : 'POULhilda' est un rosier de culture en pot à port dressé à buissonnant. Le bord des folioles, le pétiole et les pétiolules des jeunes feuilles ont une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte un petit nombre d'aiguillons linéaires orange grisâtre. Le pédicelle de la fleur porte un très petit nombre d'aiguillons ou n'a pas d'aiguillons. La feuille a 5 ou 7 folioles et est très faiblement lustrée; la foliole terminale a une texture coriace, un bord denté en scie et une base arrondie.

'POULhilda' fleurit presque continuellement. Le bouton floral est ovoïde et rose très pâle. Les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base concave. Le centre de la fleur présente un pli peu prononcé. La fleur est rose pâle, très doublée. Les pétales ont une petite tache basale blanchâtre sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement à fortement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines extérieures est vert jaunâtre. Les styles sont longs et vert jaunâtre également. Les stigmates sont bien au-dessus de l'ouverture du réceptacle et au-dessus des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur ne dégage pas de parfum.

Origine génétique : 'POULhilda' est issue du croisement de semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1994. En décembre de la même année, les graines ont été semées, et, au printemps, des sujets ont été sélectionnés. Un des semis ainsi sélectionné est devenu la variété 'POULhilda' est l'un des semis ainsi obtenus.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULhilda' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), au printemps 2000. Les sujets, 6 par variété, ont été cultivés dans des pots de 15 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 99 : Tableau de comparaison pour 'POULhilda'

	'POUL HILDA'	'POUL OBE'*	'POUL ARBSO'*	'POUL POLLO'*
Longueur de la feuille entière (mm)				
moyenne	89,4	77,5	67,6	78,6
écart-type	12,2	6,65	8,1	4,2
Largeur de la feuille entière (mm)				
moyenne	57,3	54,8	47,2	47,1
écart-type	2,0	5,74	5,1	2,3
Diamètre de la fleure (mm)				
moyenne	40,7	33,5	45,4	45,7
écart-type	3,57	4,18	3,85	2,68
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	49 C-D	46B	52D	26B à 24C
Couleur de la face externe du pétale (RHS)				
zone marginale	49C	46C	48D	29A
zone centrale	49C	57A	48D	29A
tache à la base	157A	155C	1C	3A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)				
zone marginale	49D	46C	55C	24C
zone centrale	49D	46C	55C	24C
tache à la base	157A	155C	1C	3A-6A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULsabel'** (voir la figure 33)
Nom commercial : **Isabel Hit®**
Numéro de la demande : 98-1513
Date de la demande : 1998/10/15
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)

Mandataire au Canada : Me Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULobe' et 'POULhappy'

Sommaire : *'POULsabel' est un rosier de culture en pot donnant des fleurs rouges qui diffèrent des fleurs des variétés de référence par leur couleur et par leur diamètre, qui est plus grand. Les fleurs de 'POULsabel' sont doubles et ont moins de pétales que celles de 'POULobe' et un peu plus que celles de 'POULhappy'. La feuille de 'POULsabel' est beaucoup plus grande que celles des variétés de référence.*

Description : 'POULsabel' est un rosier de culture en pot à port dressé à buissonnant. Le bord et le dessous des folioles des jeunes feuilles ont une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte un petit nombre d'aiguillons linéaires rose pâle à brun rougeâtre. Le pédicelle de la fleur porte un très petit nombre d'aiguillons ou n'a pas d'aiguillons. La feuille a 5 folioles et est fortement lustrée; la foliole terminale a une texture moyennement coriace, un bord denté en scie et une base obtuse à arrondie.

'POULsabel' fleurit presque continuellement. Le bouton floral est ovoïde et rouge. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus et la base convexes. Le centre de la fleur est normal. La fleur est double, d'un rouge moyen qui passe au violet rouge avec le temps. Les pétales ont une petite tache basale jaune pâle sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement à fortement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines extérieures est jaune pâle. Les styles sont longs et vert jaunâtre. Les stigmates sont bien au-dessus de l'ouverture du réceptacle et au niveau des anthères. Le réceptacle est petit à moyen, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un faible parfum floral à fruité.

Origine génétique : 'POULsabel' est issue du croisement de semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1994. En décembre de la même année, les graines ont été semées, et, au printemps 1995, des sujets ont été sélectionnés. Un des semis ainsi obtenus est devenu la variété 'POULsabel'.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULsabel' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), au printemps 2000. Les sujets, 6 par variété, ont été cultivés dans des pots de 15 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 100 : Tableau de comparaison pour 'POULsabel'

	'POUL SABEL'	'POUL OBE'*	'POUL HAPPY'*
Longueur de la feuille entière (mm)			
moyenne	110,3	77,5	69,3
écart-type	9,69	6,65	2,83
Largeur de la feuille entière (mm)			
moyenne	80,3	54,8	32,5
écart-type	6,26	5,74	2,06
Diamètre de la fleure (mm)			
moyenne	50,2	33,5	36,9
écart-type	2,82	4,18	1,30
Couleur générale de toute la fleure (RHS)			
53B - 53C	46B	40A - 42A	
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	61B	46C	45B
zone centrale	61B	57A	45B
tache à la base	1D	155C	1C-12A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	53B-57A	46C	40A-42A
zone centrale	53B-57A	46C	40A-42A
tache à la base	1D	155C	1C-12A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULrent'** (voir la figure 34)
Nom commercial : **Laurent Hit®**
Numéro de la demande : 98-1514
Date de la demande : 1998/10/15
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Me Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULobe', 'POULpeacy' et 'POULsun'

Sommaire : *'POULrent' est un rosier de culture en pot qui donne des fleurs d'un jaune plus pâle que celles de 'POULpeacy' et de 'POULsun'. 'POULobe' donne des fleurs rouges. La fleur de 'POULrent' est plus grosse que celles des variétés de référence. La feuille de 'POULrent' est beaucoup plus grande que celles de 'POULobe' et de 'POULsun'.*

Description : 'POULrent' est un rosier de culture en pot à port buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre moyenne à forte. La tige porte un nombre faible à intermédiaire d'aiguillons linéaires rouge vert. Le pédicelle de la fleur porte un très petit nombre d'aiguillons ou n'a pas d'aiguillons. La feuille a 5 ou 7 folioles et est faiblement à moyennement lustrée; la foliole terminale est mince et a un bord denté en scie et une base obtuse.

'POULrent' fleurit presque continuellement. Le bouton floral est pointu et jaune pâle. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base concave. Le centre de la fleur est normal. La fleur est double, jaune moyen. Les pétales ont une tache basale jaune vif petite à moyenne sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement à moyennement recourbé et faiblement à moyennement ondulé. Le filet des étamines extérieures est jaune. Les styles sont longs et vert jaunâtre. Les stigmates sont bien au-dessus de l'ouverture du réceptacle et au niveau ou au-dessus des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un faible parfum légèrement floral.

Origine génétique : 'POULrent' est issue du croisement de semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1995. En décembre de la même année, des graines ont été semées, et, au printemps 1996, des sujets ont été sélectionnés. Un des semis ainsi sélectionné est devenu la variété 'POULrent'.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULrent' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), au printemps 2000. Les sujets, 6 par variété, ont été cultivés dans des pots de 15 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 101 : Tableau de comparaison pour 'POULrent'

	'POULRENT'	'POULOBE'*	'POULPEACY'*	'POULSUN'*
Longueur de la feuille entière (mm)				
moyenne	82,9	77,5	100,9	77,7
écart-type	5,2	6,65	7,7	3,68
Largeur de la feuille entière (mm)				
moyenne	60,2	54,8	84,2	50,4
écart-type	5,4	5,74	9,67	2,05
Diamètre de la fleure (mm)				
moyenne	56,0	33,5	47,4	37,8
écart-type	5,88	4,18	4,95	5,38
Couleur générale de toute la fleure (RHS)				
6D	46B	12A-13B		12A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)				
zone marginale	3D	46C	12B	12A
zone centrale	5C	57A	12B	12A
tache à la base	6B	155C	4B	12A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)				
zone marginale	3D	46C	12B	12A
zone centrale	5C	46C	12A-B	12A
tache à la base	6B	155C	-	12A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULpeacy'** (voir la figure 35)
Nom commercial : **Peace Palace®**
Numéro de la demande : 98-1517
Date de la demande : 1998/10/15
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : M[e] Fred Braman, Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULobe', 'POULymp' et 'POULsun'

Sommaire : *'POULpeacy' est un rosier de culture en pot qui donne des fleurs jaunes, tandis que 'POULobe' donne des*

fleurs rouges et 'POULymp', des fleurs abricot. La feuille et la fleur de 'POULpeacy' sont plus grandes que celles de 'POULsun'. Les pétales de 'POULpeacy' sont plus longs et plus larges que ceux de 'POULsun'.

Description : 'POULpeacy' est un rosier de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre faible à moyenne. La tige porte un nombre faible à intermédiaire d'aiguillons linéaires roses. Le pédicelle de la fleur porte un très petit nombre d'aiguillons ou n'a pas d'aiguillons. La feuille a généralement 5 folioles et est moyennement à fortement lustrée; la foliole terminale est moyennement mince et a un bord denté en scie et une base obtuse à arrondie.

'POULpeacy' fleurit presque continuellement. Le bouton floral est pointu à ovoïde et jaune vif. Les sépales sont faiblement à moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe et la base convexe aplatie. Le centre de la fleur est normal. La fleur est double, jaune moyen à jaune foncé. Les pétales ont une petite tache basale jaune pâle sur leur face externe et n'ont aucune tache basale sur leur face interne. Le bord des pétales est moyennement à fortement recourbé et très faiblement à nullement ondulé. Le filet des étamines extérieures est orange jaune. Les styles sont courts et blancs. Les stigmates sont légèrement au-dessus de l'ouverture du réceptacle et au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un faible parfum de thé ou d'épices.

Origine génétique : 'POULpeacy' est issue du croisement de semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1995. En décembre de la même année, des graines ont été semées, et, au printemps 1996, des sujets ont été sélectionnés. Un des semis ainsi sélectionné est devenu la variété 'POULpeacy'.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULpeacy' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), au printemps 2000. Les sujets, 6 par variété, ont été cultivés dans des pots de 15 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 102 : Tableau de comparaison pour 'POULpeacy'

	'POUL PEACY'	'POUL OBE'*	'POUL YMP'*	'POUL SUN'*
Longueur de la feuille entière (mm)				
moyenne	100,9	77,5	93,5	77,7
écart-type	7,7	6,65	10,44	3,68
Largeur de la feuille entière (mm)				
moyenne	84,2	54,8	63,2	50,4
écart-type	5,4	5,74	4,51	2,05
Diamètre de la fleure (mm)				
moyenne	47,4	33,5	59,9	37,8
écart-type	4,95	4,18	3,91	5,38
Couleur générale de toute la fleure (RHS)				
12A-13B	46B	22A et 24A	12A	
Couleur de la face externe du pétale (RHS)				
zone marginale	12B	46C	31C	12A
zone centrale	12B	57A	31C	12A
tache à la base	4B	155C	4C	12A
Couleur de la face interne du pétale (RHS)				
zone marginale	12B	46C	22A-B	12A
zone centrale	12A-B	46C	22A-B	12A
tache à la base	-	155C	4B	12A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULbrez'** (voir la figure 36)
Nom commercial : **Breeze Party®**
Numéro de la demande : 99-1755
Date de la demande : 1999/08/10
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULfuna', 'POULhappy' et 'POULfio'

Sommaire : *La fleur de 'POULbrez' est de divers tons de rose, tandis que celle de 'POULfuna' est rose foncé, celle de 'POULhappy', rouge moyen, et celle de 'POULfio', rose moyen. 'POULbrez' est un micro-rosier, tandis que 'POULhappy' et 'POULfio' sont des rosiers miniatures.*

Description : 'POULbrez' est un micro-rosier de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre faible à moyenne. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires et un petit nombre d'aiguillons longs. Le pédicelle de la fleur porte

un nombre limité de glandes stipitées presque blanches. La feuille est vert moyen à vert foncé et moyennement lustrée; elle a 5 folioles, et la foliole terminale a une texture mince et souple à coriace ainsi qu'un bord denté en scie et une base arrondie.

'POULbrez' fleurit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle de la fleur porte un nombre faible à moyen de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde à globulaire. Les sépales ne sont pas appendiculés ou sont très faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati à convexe et la base aplatie. Le centre de la fleur présente un pli, et la corolle est demi-double. La fleur est de divers tons de rose. Les pétales ont de petites taches basales sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement recourbé et nullement à faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont moyens à longs, rouges, sans pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur dégage un parfum fruité d'intensité moyenne.

Origine génétique : 'POULbrez' est issue du croisement contrôlé de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1995.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULbrez' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), en 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 103 : Tableau de comparaison pour 'POULbrez'

	'POULBREZ'	'POULFUNA'*	'POULHAPPY'*	'POULFIO'*
Longueur de la feuille (mm)				
moyenne	56,3	52,7	69,3	60,1
écart-type	9,95	4,87	2,83	2,46
Largeur de la feuille (mm)				
moyenne	36,4	36,4	32,5	39,6
écart-type	4,56	4,74	2,06	2,15
Diamètre de la fleure (mm)				
moyenne	45,5	29,1	36,9	36,4
écart-type	3,4	1,04	1,30	1,80
Couleur générale de toute la fleure (RHS)	62C-D	57B-D	40A-42A	41B
Clouleur de la face externe du pétale (RHS)				
zone marginale	62B	57C	45B	52B
zone centrale	62B	57D	45B	52B
tache à la base	155C/157A	155B	1C-12A	1D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)				
zone marginale	62C	57B	40A-42A	41B
zone centrale	63C-D	57B	40A-42A	41B
tache à la base	155C/157A	155B	1C-12A	7A

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULrolyt'** (voir la figure 37)
Nom commercial : **Colour Hit®**
Numéro de la demande : 99-1759
Date de la demande : 1999/08/10
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULsabel'

Sommaire : *La fleur de 'POULrolyt' est rose foncé, tandis que celle de 'POULsabel' est de divers tons de rouge. La feuille de 'POULrolyt' est plus petite et moins lustrée que celle de 'POULsabel'.*

Description : 'POULrolyt' est un rosier miniature de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux sont très faiblement anthocyanés. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires et un petit nombre d'aiguillons longs presque blancs. Le pédicelle de la fleur porte aussi un petit nombre d'aiguillons longs presque blancs. La feuille est vert foncé et faiblement à moyennement lustrée; elle a 3 à 7 folioles, et la foliole terminale a une texture mince et souple ainsi qu'un bord denté en scie et une base obtuse.

La floraison de 'POULrolyt' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle de la fleur porte des poils ou des aiguillons. Le bouton floral est ovoïde. Les sépales ne sont pas appendiculés ou sont très faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base aplatie. Le centre de la fleur présente un pli plus ou moins prononcé ou est normal, et la corolle est très doublée. La fleur est rose foncé. Les pétales ont des taches basales très petites à petites sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est moyennement à fortement recourbé et faiblement à moyennement ondulé. Le filet des étamines est blanc à jaune. Les styles sont moyens à longs, vert jaune, sans pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères ou légèrement au-dessus. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur n'est pas parfumée.

Origine génétique : 'POULrolyt' est issue du croisement contrôlé d'un semis non identifié avec 'POULhappy'; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1995.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULrolyt' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), en 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 104 : Tableau de comparaison pour 'POULrolyt'

	'POULROLYT'	'POULSABEL'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	78,4	106,0
écart-type	7,54	8,37
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	52,0	76,0
écart-type	6,63	8,96
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart)	43A-B	46C
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	52A	57B
zone centrale	52A	57B
tache à la base	155C/1C	155C/1C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	43B	46C/57A
zone centrale	43B-C	46C/57A
tache à la base	155C/1C	1C

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULrosit'** (voir la figure 38)
Nom commercial : **Rosita Parade®**
Numéro de la demande : 99-1760
Date de la demande : 1999/08/10
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULmist'

Sommaire : *La fleur de 'POULrosit' a moins de pétales que celle de 'POULmist'. Chez 'POULrosit', les pétales sont jaunes, et leur bord est orangé rouge, tandis que chez 'POULmist' ils sont jaune foncé.*

Description : 'POULrosit' est un rosier miniature de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre de moyenne intensité. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires et un petit nombre d'aiguillons longs blanchâtres à nuance brun rougeâtre. Le pédicelle de la fleur porte aussi un petit nombre d'aiguillons longs blanchâtres à nuance brun rougeâtre. La feuille est vert foncé et moyennement lustrée; elle a 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture mince et souple ainsi qu'un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULrosit' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle de la fleur porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est globulaire. Les sépales sont faiblement à moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe et la base aplatie. Le centre de la fleur présente un pli, et la corolle est double. La fleur est de divers tons de jaune. Les pétales n'ont pas de tache basale sur leur face externe ou leur face interne. Le bord des pétales est faiblement à moyennement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont courts à moyens, vert jaune, sans pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au-dessous des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur n'est pas parfumée.

Origine génétique : 'POULrosit' est le résultat d'une mutation naturelle survenue chez la variété 'POULgold'; cette mutation a été découverte à Fredensborg, au Danemark, au printemps 1998.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULrosit' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), en novembre 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 105 : Tableau de comparaison pour 'POULrosit'

	'POULROSIT'	'POULMIST'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	65,5	68,1
écart-type	6,62	6,88
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	44,7	52,3
écart-type	5,40	5,31
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)	14A avec 34A sur la zone marginale	12A
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	34B	8A
zone centrale	14A	8A
tache à la base	s/o	n/a
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	34B	8A
zone centrale	14B	12A
tache à la base	s/o	s/o

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULnil'** (voir la figure 39)
Nom commercial : **Pernille Hit®**
Numéro de la demande : 99-1765
Date de la demande : 1999/08/17
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Brunan Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULymp'

Sommaire : *La fleur de 'POULnil' est de divers tons d'abricot avec des nuances de rose plus prononcées que chez 'POULymp', dont la fleur a des nuances tirant plus sur l'orangé. Les pétales sont moins recourbés chez 'POULnil' que chez 'POULymp'.*

Description : 'POULnil' est un rosier miniature de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre de faible intensité. Le dessous des pétioles porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires. La tige et le pédicelle de la fleur portent un petit nombre d'aiguillons longs presque blancs. La feuille est vert foncé et moyennement à fortement lustrée; elle a 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture mince et souple

ainsi qu'un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULnil' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle de la fleur porte un nombre faible à intermédiaire de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est pointu. Les sépales sont moyennement à fortement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati à convexe et la base convexe aplatie. Le centre de la fleur présente un pli, et la corolle est double. La fleur est de divers tons d'abricot. Les pétales ont des taches basales très petites à moyennes sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est faiblement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont de longueur moyenne, vert jaune, et ont une faible pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont au niveau des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur a un faible parfum musqué.

Origine génétique : 'POULnil' est issue du croisement contrôlé de deux semis non identifiés; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1995.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULnil' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), en novembre 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 106 : Tableau de comparaison pour 'POULnil'

	'POULNIL'	'POULYMP'*
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)	29A-C	32B-C et 24C-D
Couleur de la face externe du pétale (RHS)		
zone marginale	35B-C	29B
zone centrale	35B-C	29C
tache à la base	13B	13D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)		
zone marginale	19B	13B
zone centrale	22D	13B
tache à la base	13B	s/o

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULra012'** (voir la figure 40)
Nom commercial : **Carmen Parade®**
Numéro de la demande : 00-2340
Date de la demande : 2000/07/06
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Brunan Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULhappy' et 'POULra007'

Sommaire : *'POULra012' est un rosier de culture en pot dont les jeunes rameaux sont plus fortement anthocyanés que ceux des variétés de référence. La fleur de 'POULra012' a moins de pétales que celle de 'POULra007', et ces pétales sont plus grands que ceux des variétés de référence. Chez 'POULra012', les styles sont blancs, avec du rouge juste sous le stigmate, tandis que chez 'POULhappy' les styles sont vert jaune et chez 'POULra007' ils sont vert pâle.*

Description : 'POULra012' est un rosier miniature de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre de moyenne intensité. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires. La tige et le pédicelle de la fleur portent un petit nombre d'aiguillons longs brun rougeâtre. La feuille est vert foncé et faiblement lustrée; elle a 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture mince et souple ainsi qu'un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULra012' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle de la fleur porte un nombre moyen à élevé de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est pointu. Les sépales sont moyennement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati et la base concave à aplatie. Le centre de la fleur est normal, et la corolle est double. La fleur est rouge. Les pétales ont de petites taches basales blanches sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est fortement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est jaune. Les styles sont moyens à longs, blancs, avec du rouge sous le stigmate, et ont une pubescence moyenne à forte dans leur

moitié supérieure. Les stigmates sont au-dessus des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur n'est pas parfumée.

Origine génétique : 'POULra012' est issue du croisement contrôlé de 'POULsint' avec un semis non identifié; ce croisement a été réalisé à Fredensborg, au Danemark, en 1996.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULra012' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), en novembre 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 107 : Tableau de comparaison pour 'POULra012'

	'POUL RA012'	'POUL HAPPY'*	'POUL RA007'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	78,3	69,3	73,8
écart-type	8,57	2,83	4,45
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	58,0	32,5	52,1
écart-type	5,92	2,06	5,22
Longueur du pétale (mm)			
moyenne	19,1	14,6	17,5
écart-type	1,51	0,92	2,25
Largeur du pétale (mm)			
moyenne	19,8	12,8	13,6
écart-type	1,99	1,6	1,56
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)	46B	40A-42A	46B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	46B	45B	46A
zone centrale	46B	45B	46A
tache à la base	155C/1C	1C-12A	155C/157D
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	46B-C	40A-42A	46B
zone centrale	46B-C	40A-42A	46B
tache à la base	155C/1C	1C-12A	155C/157D

* variétés de références

Dénomination proposée : **'POULmona'** (voir la figure 41)
Nom commercial : **Ramona Hit®**
Numéro de la demande : 00-2342
Date de la demande : 2000/07/06

Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Brunan Barbacki Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULsabel' et 'POULobe'

Sommaire : *'POULmona' est un rosier de culture en pot qui se distingue des variétés de référence par la couleur de ses fleurs. La fleur de 'POULmona' est rose foncé, tandis que celles de 'POULsabel' et de 'POULobe' sont rouges. Les feuilles et les pétales sont beaucoup plus grands chez 'POULmona' que chez 'POULobe'. La fleur de 'POULmona' est demi-double, tandis que celle de 'POULsabel' est double, et celle de 'POULobe' est très doublée.*

Description : 'POULmona' est un rosier miniature de culture en pot à port dressé à buissonnant. Les jeunes rameaux ont une pigmentation anthocyanique brun rougeâtre de faible intensité. La tige porte un petit nombre d'aiguillons courts linéaires. La tige et le pédicelle de la fleur portent un petit nombre d'aiguillons longs blanc jaunâtre. La feuille est vert foncé et moyennement à fortement lustrée, elle a 3 ou 5 folioles, et la foliole terminale a une texture coriace ainsi qu'un bord denté en scie et une base arrondie.

La floraison de 'POULmona' est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de 10 semaines. Le nombre de fleurs par rameau florifère est faible. Le pédicelle de la fleur porte un petit nombre de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue du dessus, la fleur complètement ouverte a une forme arrondie irrégulière; vue de côté, elle a le dessus convexe aplati à convexe et la base convexe. Le centre de la fleur présente un pli, et la corolle est demi-double. La fleur est rose foncé. Les pétales ont des taches basales jaune pâle petites à moyennes sur leur face externe et leur face interne. Le bord des pétales est fortement recourbé et faiblement ondulé. Le filet des étamines est vert jaunâtre. Les styles sont moyens à longs, vert jaune, et ont une très faible pubescence dans leur moitié supérieure. Les stigmates sont un peu au-dessus des anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'urne, sans aiguillons. La fleur a un très faible parfum floral.

Origine génétique : 'POULmona' est le résultat d'une

mutation survenue chez 'POULsabel'; cette mutation a été découverte dans une serre, à Fredensborg, au Danemark, au cours de la période printemps-été 1998. Les graines ont été semées en décembre 1998 et ont germé durant l'hiver et au début du printemps. Les semis ont été sélectionnés en 1999.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULmona' ont eu lieu aux serres Aldershot, à Burlington (Ontario), en novembre 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 108 : Tableau de comparaison pour 'POULmona'

	'POUL MONA'	'POUL SABEL'*	'POUL OBE'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	102,9	106,0	77,5
écart-type	10,38	8,37	6,65
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	71,8	76,0	54,8
écart-type	4,96	8,96	5,74
Longueur du pétale (mm)			
moyenne	30,8	28,0	16,4
écart-type	1,83	4,56	1,62
Largeur du pétale (mm)			
moyenne	36,4	31,3	12,2
écart-type	4,43	4,60	1,47
Couleur du bourgeon floral (ouvert au quart) (RHS)	55A	46C	46B
Couleur de la face externe du pétale (RHS)			
zone marginale	68A	57B	46C
zone centrale	55B-C	57B	57A
tache à la base	155C/1C	155C/1C	155C/1C
Couleur de la face interne du pétale (RHS)			
zone marginale	68A	46C/57A	46C
zone centrale	55A-C	46C	46C
tache à la base	155C/1C	1C	155C/1C

* variétés de références

SOJA
(Glycine max L. Merrill)

Dénomination proposée : **'Starburst'**
Dénomination antérieurement proposée : **'T9532'**
Numéro de la demande : 97-1150
Date de la demande : 1997/09/16
Requérant : Hyland Seeds, Blenheim (Ontario)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'RCAT Angora', 'RCAT Calico', '9305' et 'Dominator'

Sommaire : *La pubescence de la plante est plus dense chez 'Starburst' que chez 'Dominator'. 'Starburst' a un port moins dressé que 'RCAT Angora', '9305' et 'Dominator'. Lors des deux années d'essai, 'Starburst' a donné une plante plus courte que '9305' et 'Dominator'. 'Starburst' parvient à maturité plus rapidement que 'RCAT Calico', '9305' et 'Dominator'. La graine de 'Starburst' est sphérique aplatie, alors que celle de 'RCAT Angora' est sphérique arrondie. Le tégument de la graine est plus luisant chez 'Starburst' que chez 'RCAT Angora'.*

Description : 'Starburst' est un soja oléagineux à croissance indéterminée. Son port est intermédiaire entre dressé et étalé. L'hypocotyle est violet. Les feuilles sont vert moyen, de texture intermédiaire, trifoliolées. La foliole terminale est ovée, de grandeur moyenne. Avant la floraison, la plante présente une pubescence dense, dressée. Les fleurs sont violettes. À maturité, la plante a une pubescence grise. La gousse mûre est brune. La graine est jaune et sphérique aplatie. Le tégument de la graine est moyennement luisant. Le hile est jaune, de grandeur moyenne. Les cotylédons de la graine mûre sont jaunes.

Origine génétique : 'Starburst' est issue du croisement 'Dominator' × 'Elgin 87', réalisé en 1988. Les générations suivantes ont été conduites selon une technique modifiée de filiation unipare jusqu'à ce qu'un sujet F_4 soit sélectionné en 1991. La sélection s'est poursuivie jusqu'à la génération F_6 en 1993. Les critères de sélection étaient le rendement élevé, la

résistance à la verse, l'aspect attrayant de la plante, le type de graine et la faible sensibilité aux principales maladies.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Starburst' ont été réalisés aux Hyland Farms, près de Ridgetown (Ontario), en 1996 et 1997. Les essais ont été effectués dans trois parcelles répétées comprenant chacune quatre rangs d'environ 3 m de longueur.

Tableau 109 : Tableau de comparaison pour 'Starburst'

	'STARBURST'	'RCAT ANGORA'*	'RCAT CALICO'*	'9305'*	'DOMINATOR'*
Hauteur de la plante (cm)					
moyenne	48,9	55,3	50,9	52,3	62,3
écart-type	3,45	4,32	5,28	4,76	12,73
Poids de la graine (g/100 graines)	15,3	15,2	16,4	16,8	16,6
Jours à la maturité	118,3	117,5	120,0	120,3	121,0
Unités thermiques	3175	3150	3225	3250	3300
Teneur en protéine (%)	40,2	40,3	42,7	40,9	40,7
Acide linolénique (en % de l'huile)	22,0	21,9	20,2	22,3	21,5

* variétés de références

Nota: Les données dans ce tableau proviennent des épreuves et essais réalisés en 1996.

Dénomination proposée : **'RCAT Staples'**
Numéro de la demande : 99-1647
Date de la demande : 1999/04/26
Requérant : University of Guelph, Ridgetown College, Ridgetown (Ontario)
Mandataire au Canada : L'Association SeCan, Nepean (Ontario)

Variétés de référence : 'RCAT Columbus' et 'Hallmark'

Sommaire : *'RCAT Staples' donne une plante plus haute que les variétés de référence. La gousse de 'RCAT Staples' est brune, tandis que celle de 'RCAT Columbus' est havane. Le hile de 'RCAT Staples' est brun foncé, alors que celui de 'RCAT Columbus' est noir. L'activité peroxydasique du tégument est faible chez 'RCAT Staples', tandis qu'elle est élevée chez les variétés de référence.*

Description : 'RCAT Staples' est un soja oléagineux à croissance indéterminée. L'hypocotyle présente une pigmentation anthocyanique. Les folioles latérales sont ovées arrondies. Les fleurs sont violettes. À maturité, la plante a une pubescence brune. La gousse mûre est brune. La couleur de fond du tégument de la graine est jaune, et le hile est brun foncé. L'activité peroxydasique du tégument est faible.

Origine génétique : 'RCAT Staples' est issue du croisement 9303 × T8508 réalisé en 1990 au Collège Ridgetown de l'Université de Guelph, à Ridgetown, en Ontario. La variété a été mise au point selon une technique modifiée de filiation unipare. La mise au point a été facilitée par l'utilisation d'une pépinière d'hiver située au Belize, en Amérique centrale. En 1993, le rang 90/101/3, constitué de la descendance d'un seul sujet, a été sélectionné pour sa précocité de maturation, sa résistance à la verse et son nombre élevé de gousses par plante. Le comportement agronomique de la lignée a été évalué pendant deux ans, puis celle-ci a été inscrite sous la

dénomination RCAT 9608 aux essais officiels de rendement des variétés de soja de l'Ontario de 1996.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'RCAT Staples' ont été réalisés à Ridgetown (Ontario), en 1999 et 2000. En 1999, les essais ont été effectués dans six parcelles répétées contenant chacune cinq rangs d'environ 5 m de longueur et espacés de 43 cm. En 2000, les essais ont réalisés dans deux parcelles répétées de dimensions similaires.

Tableau 110 : Tableau de comparaison pour 'RCAT Staples'

	'RCAT STAPLES'	'RCAT COLUMBUS'*	'HALLMARK'*
Jours à la floraison			
	48	48	49
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	105	99	99
écart-type	3.9	5.2	4.7
nombre mesurés	20	20	20
Jours à la maturité	128	127	128
Unités thermiques	3175	3175	3200

* variétés de références

Dénomination proposée : **'S25-H5'** (voir la figure 42)
Numéro de la demande : 00-2283
Date de la demande : 2000/05/24
Requérant : Syngenta Seeds Inc., Minneapolis (Minnesota), États-Unis
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada Inc., Arva (Ontario)

Variété de référence : 'S24-L2'

Sommaire : *Le hile de 'S25-H5' est noir, alors que celui de 'S24-L2' est brun. 'S25-H5' est modérément sensible au mildiou, tandis que 'S24-L2' y est résistante. 'S25-H5' est résistante à la race 3 du nématode à kystes du soja et modérément résistante à la race 14 du nématode à kystes du soja, alors que 'S24-L2' est sensible à ces deux races.*

Description : 'S25-H5' est un soja oléagineux à croissance indéterminée. L'hypocotyle est violet. La foliole terminale est ovée, de grandeur moyenne, vert moyen. La feuille est de texture intermédiaire entre lisse et plissée. Au stade de la gousse mi-remplie, la plante présente une pubescence fauve, dressée et de densité normale. Les fleurs sont violettes. La gousse mûre est havane. La graine est sphérique arrondie. Le tégument de la graine est jaune et mat. Le hile est noir, de grandeur moyenne, et son assise de séparation est normale. Les cotylédons de la graine mûre sont jaunes.

'S25-H5' est modérément sensible aux races 1 à 3 ainsi que 6 à 9 du mildiou (*Phytophthora megasperma* f.sp. *glycinea*), résistante à la race 3 du nématode à kystes du soja (*Heterodera glycines*) et modérément résistante à la race 14 de ce nématode. 'S25-H5' présente en outre une bonne résistance à l'égrenage et à la verse.

Origine génétique : 'S25-H5' est issue d'un croisement réalisé en 1991, à Washington (Iowa), aux États-Unis. Les générations F_2 à F_5 ont été conduites selon une technique modifiée de filiation unipare. Des sujets F_6 ont été récoltés et battus individuellement, et leur descendance a été évaluée durant l'été 1994 dans une pépinière d'observation par rangs. 'S25-H5', initialement désignée J40508, a été sélectionnée parmi ce groupe.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'S25-H5' ont été réalisés à Arva (Ontario), en 2000 et 2001. Les essais ont été effectués dans deux parcelles répétées contenant chacune deux rangs d'environ 4,5 m de longueur.

16. DEMANDES ABANDONEES

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1019
Date de la demande : 1997/04/07
Date d'abandon : 2001/04/10
Dénomination proposée : **'SW 02601'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 95-480
Date de la demande : 1995/03/22
Date d'abandon : 2001/04/27
Dénomination proposée : **'AU 649'**

CANOLA
(Brassica rapa L.)

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1007
Date de la demande : 1997/03/27
Date d'abandon : 2001/04/10
Dénomination proposée : **'Foothills'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1008
Date de la demande : 1997/03/27
Date d'abandon : 2001/04/27
Dénomination proposée : **'Valleyview'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1025
Date de la demande : 1997/04/21
Date d'abandon : 2001/04/27
Dénomination proposée : **'1007'**

HARICOT
(Phaseolus vulgaris L.)

➤ **Requérant :** Peas & Beans Ltd., Girton Cambridgshire (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Johnson Seeds Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 96-895
Date de la demande : 1996/07/03
Date d'abandon : 2001/04/27
Dénomination proposée : **'Prim'**

POMME DE TERRE
(Solanum tuberosum L.)

➤ **Requérant :** Monsanto Company, St. Louis, Missouri (États-Unis)
Mandataire au Canada : Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1224
Date de la demande : 1998/02/06
Date d'abandon : 2001/03/01
Dénomination proposée : **'NL20-NRK'**

➤ **Requérant :** Caithness Potato Breeders Ltd., London (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Caithness Potato Technology Inc., O'Leary (I.-P.-E.)
Numéro de la demande : 97-992
Date de la demande : 1997/03/04
Date d'abandon : 2001/04/28
Dénomination proposée : **'Maxine'**

➤ **Requérant :** Caithness Potato Breeders Ltd., London (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Caithness Potato Technology Inc., O'Leary (I.-P.-E.)
Numéro de la demande : 97-993
Date de la demande : 1997/03/04
Date d'abandon : 2001/04/28
Dénomination proposée : **'Tristar'**

SOJA
(Glycine max L. Merrill)

➤ **Requérant :** Hyland Seeds, Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 96-850
Date de la demande : 1996/05/21
Date d'abandon : 2001/04/27
Dénomination proposée : **'T9315'**

➤ **Requérant :** Hyland Seeds, Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1151
Date de la demande : 1997/09/16
Date d'abandon : 2001/04/27
Dénomination proposée : **'T9426'**

17. DEMANDES RETIRÉES

ALSTROEMÈRE
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Requérant :** Van Staaveren B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 01-2681
Date de la demande : 2001/04/20
Date du retrait : 2001/06/28
Dénomination proposée : **'Staloren'**
Nom commercial : **Lorena**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1438
Date de la demande : 1998/06/23
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2385'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1439
Date de la demande : 1998/06/23
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2479'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1441
Date de la demande : 1998/06/23
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2515'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1443
Date de la demande : 1998/06/23
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2805'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1444
Date de la demande : 1998/06/23
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2810'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1664
Date de la demande : 1999/04/29
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2684'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1665
Date de la demande : 1999/04/29
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2681'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2233
Date de la demande : 2000/05/03
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS3223'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2241
Date de la demande : 2000/05/03
Date du retrait : 2001/06/19
Dénomination proposée : **'NS2135M'**

CANOLA
(*Brassica rapa* L.)

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1369
Date de la demande : 1998/04/20
Date du retrait : 2001/06/15
Dénomination proposée : **'Spectrum'**

MAÏS
(*Zea mays* L.)

➤ **Requérant :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illnois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1747
Date de la demande : 1999/08/05
Date du retrait : 2001/06/04
Dénomination proposée : **'3DHA9'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Requérant :** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1525
Date de la demande : 1998/07/21
Date du retrait : 2001/06/04
Dénomination proposée : **'Matador Light Pink'**

PETUNIA
(*Petunia x hybrida* Vilm.)

➤ **Requérant :** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 99-2040
Date de la demande : 1999/12/21
Date du retrait : 2001/08/30
Dénomination proposée : **'Balruflav'**
Nom commercial : **Ruffle[MD] Light Lavender**

➤ **Requérant :** Ball FloraPlant, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 99-2041
Date de la demande : 1999/12/21
Date du retrait : 2001/08/30
Dénomination proposée : **'Balfufbrip'**
Nom commercial : **Ruffle[MD] Bright Purple**

18. RÉNONCIATION DES CERTIFICATS D'OBTENTION

CHRYSANTHÈME
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0150
Date de l'obtention : 1995/08/21
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Akron'**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0151
Date de l'obtention : 1995/08/21
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Imperial'**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0158
Date de l'obtention : 1995/08/21
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Apricot Blush'**
Synonyme : **Apricot Yoblush**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0658
Date de l'obtention : 1999/08/24
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Purple Yolima'**
Nom commercial: **Purple Lima**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0659
Date de l'obtention : 1999/08/24
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Yolima'**
Nom commercial: **Lima**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0660
Date de l'obtention : 1999/08/24
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Honey Yolima'**
Synonyme : **Honey Lima**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0662
Date de l'obtention : 1999/08/24
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Soledad'**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0663
Date de l'obtention : 1999/08/24
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Salmon Pomona'**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0664
Date de l'obtention : 1999/08/24
Date de la renonciation : 2001/08/20
Dénomination approuvée : **'Dark Yomonterey'**
Synonyme : **Dark Monterey**

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Titulaire :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, Brandon (Manitoba)
Mandataire au Canada : Agricore, Calgary (Alberta)
Numéro du certificat : 0522
Date de l'obtention : 1998/09/15
Date de la renonciation : 2001/08/31
Dénomination approuvée : 'AC Hawkeye'

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L. H. Bailey)

➤ **Titulaire :** Research Technologies, Inc., Tucson, Arizona (États-Unis)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 0329
Date de l'obtention : 1997/06/17
Date de la renonciation : 2001/06/25
Dénomination approuvée : 'Fantasy'

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex. Klotzsch)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0793
Date de l'obtention : 2000/08/14
Date de la renonciation : 2001/08/08
Dénomination approuvée : 'Eckabner'
Nom commercial: **Success Pink**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0798
Date de l'obtention : 2000/08/14
Date de la renonciation : 2001/08/08
Dénomination approuvée : 'Eckadali'
Nom commercial: **White Splendor**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0799
Date de l'obtention : 2000/08/14
Date de la renonciation : 2001/08/08
Dénomination approuvée : 'Eckabiel'
Nom commercial: **Pink Splendor**

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Titulaire :** Irish Potato Marketing Limited, Dublin (Irlande)
Mandataire au Canada : Potato Blossom Industries Inc., O'Leary (P.E.I.)
Numéro du certificat : 0586
Date de l'obtention : 1999/03/19
Date de la renonciation : 2001/07/31
Dénomination approuvée : 'Ambo'

➤ **Titulaire :** Irish Potato Marketing Limited, Dublin (Irlande)
Mandataire au Canada : Potato Blossom Industries Inc., O'Leary (P.E.I.)
Numéro du certificat : 0588
Date de l'obtention : 1999/03/19
Date de la renonciation : 2001/07/31
Dénomination approuvée : 'Barna'

➤ **Titulaire :** Irish Potato Marketing Limited, Dublin (Irlande)
Mandataire au Canada : Potato Blossom Industries Inc., O'Leary (P.E.I.)
Numéro du certificat : 0591
Date de l'obtention : 1999/03/19
Date de la renonciation : 2001/07/31
Dénomination approuvée : **'Rooster'**

➤ **Titulaire :** Irish Potato Marketing Limited, Dublin (Irlande)
Mandataire au Canada : Potato Blossom Industries Inc., O'Leary (P.E.I.)
Numéro du certificat : 0593
Date de l'obtention : 1999/03/19
Date de la renonciation : 2001/07/31
Dénomination approuvée : **'Tulla'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Tom Bailey, Kingsville (Ontario)
Numéro du certificat : 0465
Date de l'obtention : 1998/06/30
Date de la renonciation : 2001/07/04
Dénomination approuvée : **'Ruihonzev'**
Nom commercial: **Opal Rosamini**

➤ **Titulaire :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Tom Bailey, Kingsville (Ontario)
Numéro du certificat : 0466
Date de l'obtention : 1998/06/30
Date de la renonciation : 2001/07/04
Dénomination approuvée : **'Ruinero'**
Nom commercial: **Dainty Rosamini**

➤ **Titulaire :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Tom Bailey, Kingsville (Ontario)
Numéro du certificat : 0467
Date de l'obtention : 1998/06/30
Date de la renonciation : 2001/07/04
Dénomination approuvée : **'Ruinidan'**
Nom commercial: **Pink Rosamini**

SOJA
(*Glycine max* L. Merrill)

➤ **Titulaire :** Agriculture et agro-alimentaire Canada, Harrow (Ontario)
Numéro du certificat : 0646
Date de l'obtention : 1999/06/22
Date de la renonciation : 2001/06/04
Dénomination approuvée : **'AC 756'**

19. RÉVOCATION DES CERTIFICATS D'OBTENTION

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium x hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Titulaire :** Denholm Seeds Inc., Lompoc, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 0331
Date de l'obtention : 1997/06/17
Date de la révocation : 2001/06/17
Dénomination : **'Ritz'**
Synonyme : **Usritz**

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Walker Seeds Ltd., Tisdale (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 0571
Date de l'obtention : 1999/02/23
Date de la révocation : 2001/07/05
Dénomination : **'Supra'**

POMME DE TERRE
***(Solanum tuberosum* L.)**

➤ **Requérant :** Monsanto Company, St. Louis, Missouri (États-Unis)
Mandataire au Canada : Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 0736
Date de l'obtention : 2000/04/03
Date de la révocation : 2001/08/08
Dénomination : **'NL20-RBK'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Linsday(Ontario)
Numéro du certificat : 0738
Date de l'obtention : 2000/04/05
Date de la révocation : 2001/08/29
Dénomination : **'Matilda'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Linsday(Ontario)
Numéro du certificat : 0739
Date de l'obtention : 2000/04/05
Date de la révocation : 2001/08/29
Dénomination : **'Columbo'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Linsday(Ontario)
Numéro du certificat : 0740
Date de l'obtention : 2000/04/05
Date de la révocation : 2001/08/29
Dénomination : **'Eloge'**

20. CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

BLÉ
***(Triticum aestivum* L.)**

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 99-1652
Date de la demande : 1999/04/29
Dénomination antérieurement proposée : **'ES 4'**
Dénomination proposée : **'Amazon'**

➤ **Requérant :** Pflanzenzucht Oberlimpurg™, Schwaebisch Hall (Allemagne)
Mandataire au Canada : C. & M. Seeds, Palmerston (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2533
Date de la demande : 2001/01/30
Dénomination antérieurement proposée : **'CM97606'**
Dénomination proposée : **'Granite'**

BRACHYCOME
***(Brachycome* species Cass.)**

➤ **Requérant :** Evan Philip Clucas, Wandin North, Victora (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2006
Date de la demande : 1999/12/20
Dénomination antérieurement proposée : **'Moonlight'**
Dénomination proposée : **'Billabong Moonlight'**

FUCHSIA
(*Fuchsia x hybrida*)

➤ **Requérant :** Kieft Bloemzaden B.V., Venhuizen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2306
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Diva Rose / Blue 2548-1'**
Dénomination proposée : **'Kiecandiro'**

➤ **Requérant :** Kieft Bloemzaden B.V., Venhuizen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2307
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Diva Rose / Purple 2545-4'**
Dénomination proposée : **'Kiecandipu'**

KALANCHOË
(*Kalanchoe* species Adans.)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylavie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1846
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Maxi Rose'**
Dénomination proposée : **'Axrose'**
Nom commercial : **Maxi Rose**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylavie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1847
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Maxi White'**
Dénomination proposée : **'Axwhite'**
Nom commercial : **Maxi White**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylavie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1848
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Maxi Salmon'**
Dénomination proposée : **'Axsalm'**
Nom commercial : **Maxi Salmon**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylavie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1849
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Maxi Orchid'**
Dénomination proposée : **'Axorch'**
Nom commercial : **Maxi Orchid**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylavie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1850
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Maxi Antique Pink'**
Dénomination proposée : **'Axanpink'**
Nom commercial : **Maxi Antique Pink**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1852
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Maxi Pink'**
Dénomination proposée : **'Axpink'**
Nom commercial : **Maxi Pink**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1854
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Midi Pink'**
Dénomination proposée : **'Mipink'**
Nom commercial : **Midi Pink**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1855
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Midi Salmon Pink'**
Dénomination proposée : **'Misalpink'**
Nom commercial : **Midi Salmon Pink**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1856
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Midi Bright Pink'**
Dénomination proposée : **'Mibripink'**
Nom commercial : **Midi Bright Pink**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1859
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Midi Sunset'**
Dénomination proposée : **'Misunpink'**
Nom commercial : **Midi Sunset**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville Pennsylvie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1860
Date de la demande : 1999/11/05
Dénomination antérieurement proposée : **'Midi Pink Starlet'**
Dénomination proposée : **'Mipinkstar'**
Nom commercial : **Midi Pink Starlet**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2737
Date de la demande : 2001/05/23
Dénomination antérieurement proposée : **'Free Light Lav II'**
Dénomination proposée : **'Freelight Lav Two'**
Nom commercial: **Freestyle Light Lavender II**

PÉLARGONIUM
(Pelargonium x hortorum L. H. Bailey)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 00-2254
Date de la demande : 2000/05/10
Dénomination antérieurement proposée : **'Amri Pink II'**
Dénomination proposée : **'Amri Pink Two'**
Nom commercial : **Americana Pink II**

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 00-2255
Date de la demande : 2000/05/10
Dénomination antérieurement proposée : **'Amri Light Pink Spla II'**
Dénomination proposée : **'Amrilight Pinkspla Two'**
Nom commercial : **Americana Light Pink Splash II**

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 00-2256
Date de la demande : 2000/05/10
Dénomination antérieurement proposée : **'Amri White Spla II'**
Dénomination proposée : **'Amriwhite Spla Two'**
Nom commercial : **Americana White Splash II**

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 00-2257
Date de la demande : 2000/05/10
Dénomination antérieurement proposée : **'Clips Red II'**
Dénomination proposée : **'Clips Red Two'**
Nom commercial : **Eclipse Red II**

21. CHANGEMENT DE REQUÉRANT

CHRYSANTHÈME FRUTESCENT
***(Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz-Bip)**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries Ltd. Abbotsford (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 99-2057
Date de la demande : 1999/12/22
Dénomination proposée : **'Sugar Baby'**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries Ltd. Abbotsford (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 99-2058
Date de la demande : 1999/12/22
Dénomination proposée : **'Sugar Button'**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries Ltd. Abbotsford (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 99-2059
Date de la demande : 1999/12/22
Dénomination proposée : **'Summer Melody'**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries Ltd. Abbotsford (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 99-2059
Date de la demande : 1999/12/22
Dénomination proposée : **'Summer Pink'**

FUSAIN
(*Euonymus fortunei* (Turcz) Hand.-Mazz.)

➤ **Requérant antérieur :** The Conard-Pyle Company West Grove Pennsylvanie (États-Unis)
Requérant nouveau : CP Delaware Inc. Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2084
Date de la demande : 1999/12/23
Dénomination proposée : **'Moonshadow'**

➤ **Requérant antérieur :** The Conard-Pyle Company West Grove Pennsylvanie (États-Unis)
Requérant nouveau : CP Delaware Inc. Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2085
Date de la demande : 1999/12/23
Dénomination proposée : **'Sunrise'**

PÉTUNIA
(*Petunia x hybrida* Vilm.)

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2321
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination proposée : **'MP4'**
Nom commercial : **Tiny Tunia Burgundy**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2322
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination proposée : **'MP6'**
Nom commercial : **Tiny Tunia Violet**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2323
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination proposée : **'MP7'**
Nom commercial : **Tiny Tunia Pink**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2324
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination proposée : **'MP19'**
Nom commercial : **Tiny Tunia Plum Vein**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2325
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination proposée : **'MP20'**
Nom commercial : **Tiny Tunia Violet Vein**

➤ **Requérant antérieur :** University of Sydney, Cobbity NSW (Australie)
Requérant nouveau : NuFlora International Pty. Ltd. Sydney (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2326
Date de la demande : 2000/06/21
Dénomination proposée : **'MP21'**
Nom commercial : **Tiny Tunia White**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Requérant antérieur :** The Conard-Pyle Company West Grove Pennsylvanie (États-Unis)
Requérant nouveau : CP Delaware Inc. Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2397
Date de la demande : 2000/09/29
Dénomination proposée : **'Meinusian'**

➤ **Requérant antérieur :** The Conard-Pyle Company West Grove Pennsylvanie (États-Unis)
Requérant nouveau : CP Delaware Inc. Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2398
Date de la demande : 2000/09/29
Dénomination proposée : **'Meitelov'**

➤ **Requérant antérieur :** The Conard-Pyle Company West Grove Pennsylvanie (États-Unis)
Requérant nouveau : CP Delaware Inc. Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2399
Date de la demande : 2000/09/29
Dénomination proposée : **'Meizincaro'**

22. CHANGEMENT DU TITULAIRE

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire antérieur :** The Conard-Pyle Company West Grove Pennsylvanie (États-Unis)
Titulaire nouveau : CP Delaware Inc. Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificate : 0993
Date de l'obtention : 2001/07/06
Dénomination approuvée : **'Radrazz'**

23. ERRATA

Bulletin des variétés végétales, Juillet 2001, N° 40

Page 133

Le requérant pour les variétés de pélargonium **'Klecona'** et **'Klesatha'** devrait être Klemm & Sohn GmbH & Co. KG, Stuttgart (Allemagne).

Page 143

Le numéro de la demande pour la variété de *Brassica juncea* de type canola **'PC Arid'** devrait être 99-1685.

CFIA
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
ACIA
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

Canada